

DIE
METEORITENSAMMLUNG

DES
UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS

IN BUDAPEST.

SYSTEMATISCH ZUSAMMENGESTELLT

VON

ANDOR von SEMSEY

HON. OBERCUSTOS DES UNG. NATIONAL-MUSEUMS.



BUDAPEST.

1886.

ATHENAEUM
IRODALMI ÉS NYOMDAI
RÉSZVÉNYTÁRSULAT

M. ACADEMIA
KÖNYVTÁRA

DIE
METEORITENSAMMLUNG

DES
UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS

IN BUDAPEST.

SYSTEMATISCH ZUSAMMENGESTELLT

VON

ANDOR von SEMSEY

HON. OBERCUSTOS DES UNG. NATIONAL-MUSEUMS.



BUDAPEST.

1886.

M. ACADEMIA
KÖNYVTÁRA

Lauf. Zahl	Fallort	Datum des Fal- les oder Fundes	Gew. des Haupt- Exempl.	Ge- sammt- Gewicht	Zahl der Exemplare
			in Grammen		
I. Steinmeteoriten.					
Eukrit.					
1	Stannern, Iglau, Mähren	1808	1560	2223.5	10
2	Jonzac, Frankreich	1819	0.25	0.25	1
3	Juvinas, Ardèche, Frankreich	1821	197	219.8	5
Shergottit.					
4	Umjhiawar, Shergotty, Beaar, Ost Ind.	1865	1.5	6.7	5
Howardit.					
5	Luotolaks, Wiborg, Finnland	1813	10	10	1
6	Jasly, Bialystok, Russland	1827	101	101.5	2
7	Petersburg, Lincoln Co., Tennessee, N. Am.	1855	1.2	1.2	1
8	Frankfort, Franklin Co. Alabama, N. Am.	1868	3	3	1
9	Pawlowka, Karai, Balaschew, Russ- land.	1882	159	284.7	3
Chladnit.					
10	Bishopville, S. Karolina, N. Am. . . .	1843	10	20.1	5
11	Shalka, Bancoorah, Ost-Indien	1850	2	3.7	2
Rodit.					
12	Manbhoom, Bengalien, Ost-Indien . .	1863	—	0.6	
13	Roda, Huesca, Aragonien, Spanien. .	1871	1	1.5	2
Chassignyt.					
14	Chassigny, Haute Marne, Frank- reich	1815	3	4.8	3

Lauf. Zahl	F a l l o r t	Datum des Fal- les oder Fundes	Gew. des Haupt- Exempl.	Ge- samt- Gewicht	Zahl der Exemplare
			in Grammen		
	<i>Chondrit, howarditisch.</i>				
15	Siena, Lucignan d'Asso, Toscana,	1794	220	261.1	3
16	Borgo San Donino, Cussignano, Parma,	1808	25	29	2
17	Harrison Co., Indiana, N.-Am.	1859	4.9	4.9	1
18	Krähenberg, Zweibrücken, Pfalz . . .	1869	—	—	Splitter
19	Waconda, Mitchell Co., Kansas, N.- Am.	1872	16	31.7	4
20	Sitathali, Reapur, Ost-Indien	1875	3	3	1
	<i>Chondrit, weiss ohne Adern.</i>				
21	Mauerkirchen, Ob.-Öster	1768	130	133.1	2
22	High Possil, Glasgow, Schottland. . .	1804	—	0.4	
23	Mooradabad, Delhi, Ost-Indien	1808	1.6	2.6	2
24	Alexejewka, Bachmut, Ekaterinoszláv, Russland	1814	15.5	18.5	2
25	Zaborzika, Volhynia, Russland.	1818	6	6	1
26	Mordvinovka, Pawlograd, Ekateri- noszlav Russland.	1826	433	681.3	3
27	Drake Creek, Nashville, Tennessee, N.-Am.	1827	115	135.4	3
28	Forsyth, Monroe Co., Georgia, N.- Am.	1829	21	21	1
29	Montlivault, Loire et Cher, Frank- reich	1838	1.5	1.5	1
30	Pusinszko Szelo, Milena, Kroatien . . .	1842	121	260.5	4
31	Monte Milone, Macerata, Italien	1846	32	39.1	3
32	Kaande, Oesel, Livland, Russland. . .	1855	192.5	232.5	2
33	Tourinnes la Grosse, Tirlemont, Bel- gien	1863	107	108	2
34	Dolgowoli (Dolgaja Wolja) Volhynia, Russland	1864	2	2	1
35	Cabezzo de Mayo, Murcia, Spanien .	1870	5	7	2

Lauf. Zahl	Fallort	Datum des Fal- tes oder Fundes	Gew. des Haupt- Exempl.	Ge- samt- Gewicht	Zahl der Exemplare
			in Gramm		
	<i>Chondrit, weiss, geädert.</i>				
36	Lucé, Sarthe, Frankreich.	1768	24	25.4	2
37	Wold Cottage, Yorkshire, England . .	1795	20	70.8	6
38	Asco, Corsica	1805	—	0.45	
39	Lissa, Bunzlau, Böhmen	1808	33	33	1
40	Kikimo, Smolensk, Russland.	1809	22	22	1
41	Kuleschowka, Poltawa, Russland . .	1811	35	39.4	2
42	Politz, Gera, Deutschland	1819	6.4	10.4	3
43	Allahabad, Futtehpoore, Ost-Indien . .	1822	11.6	22.6	2
44	Honolulu, Owahn, Sandwich Inseln. .	1825	19	19	1
45	Hartford, Linn Co., Jowa, N.-Am. . .	1847	122	155.5	3
46	Schie, Akershuus, Norvegien	1848	0.3	0.3	1
47	Girgenti, Sicilien	1853	38	71	2
48	Scheikahr, Stattan, Buschhof, Kurland.	1863	126	126	1
49	Grossliebenthal, bei Odessa Russ- land	1881	18	24.5	3
50	Mócs, Kolozser Com. Mezöség, Siebenb.	1882	8465	20930	125
	<i>Chondrit, weiss, breccienartig.</i>				
51	Staartje, Uden, Holland.	1840	—	3.5	
52	Bandong, Goemoroeh, Preanger, Jáva	1871	184	192.5	3
53	Vavilovka, Cherson, Russland.	1876	78	83	2
	<i>Chondrit intermediär.</i>				
54	Charwallas, Hissar, Delhi, Ost-Indien	1834	6	9	2
55	Macao, Rio Assu, Brasilien.	1836	2.7	2.7	1
56	New Concord, Ohio, N.-Am.	1860	192	483.5	5
57	Dhurmsala, Kangra, Ost-Indien. . . .	1860	518	1165	5
58	Canellas, Villa nova, Barcelona, Spa- nien	1861	3	3	1
59	Motta di Conti, Casale, Piemont, Italien	1868	5.1	5.1	1
60	Rakowka, Tula, Russland	1878	12	12	1
61	Alfianello, Brescia, Italien	1883	4165	5014	4

Lauf. Zahl	Fallort	Datum des Fal- les oder Fundes	Gew. des Haupt- Exempl.	Ge- sammt Gewicht	Zahl der Exemplare
			in Grammen		
	<i>Chondrit, intermediär, geadert.</i>				
62	Salles, Villefranche, Rhône, Frankreich	1798	—	1.5	2
63	Agen, Let et Garonne, Frankreich . .	1814	2	7.2	4
64	Vouillé, Poitiers, Vienne, Frank- reich	1831	37	37.8	2
65	Chateau Renard, Loiret, Frankreich .	1841	2560	3679.9	6
66	Le Pressoir, Bois de Fontaine, Frank- reich	1845	50	76	3
67	Nerft, Poghel, Kurland, Russland . .	1864	2	2	1
68	Dandapur, Gorruckpur, Ost-Indien. .	1878	15	15	1
	<i>Chondrit, intermediär, breccienartig.</i>				
69	L'Aigle, l'Orme, Normandie, Frank- reich	1803	1665	3479.5	14
	<i>Chondrit grau.</i>				
70	Bjelaja Zerkow, Ukraine, Kiev, Russ- land	1797	3.6	3.6	1
71	Seres, Macedonien	1818	10	10.3	1
72	Nanjemoy, Maryland, N.-Am.	1825	91	92.7	2
73	Blansko, Brünn, Mähren.	1833	3	6	2
74	Nagy Divina, Budetin, Trencsiner Com. Ungarn	1837	10360	10360	1
75	Duruma, Wanikaland, Ost-Afrika . .	1853	60	60	1
76	Gnarrenburg, Bremervörde, Hannover.	1855	3	5	2
77	Parnalle, Madura, Ost-Indien	1857	17	47.3	5
78	Butsura, Gorruchpur, Ost-Indien. . .	1861	—	0.9	1
79	Knyahinya, Unger Com., Ungarn . . .	1866	41286	47423	14
80	Cynthiana, Harrison, Co., Kentucky, N.-Am.	1877	14	14	1

Lauf. Zahl	Fallort	Datum des Fal- les oder Fundes	Gew. des Haupt- Exempl.		Zahl der Exemplare
			in Grammen		
	<i>Chondrit grau, geädert.</i>				
81	Barbotan, Landes, Frankreich	1790	88	91.7	2
82	Saurette, Vaucluse, Frankreich	1803	4	4	
83	Darmstadt, Hessen, Deutschland	1804	9	9	1
84	Mooresfort, Tipperary, Irland	1810	48	53.3	3
85	Charsonville, Loiret, Frankreich	1810	2	2	1
86	Toulouse, Haut Garonne, Frank- reich	1812	—	0.5	
87	Limerick, Adare, Irland	1813	23	23	1
88	Lasdany, Lixna, Witebsk, Russland	1820	62	64	2
89	Kadonah, Agra, Ost-Indien.	1822	3.8	3.8	1
90	Monroe, Cabarras Co., N. Karolina, N. Am.	1849	51	63.5	4
91	Mező-Madaras, Maros-Tordaer Com. Siebenbürgen.	1852	745	1408.8	7
92	Kakova, Krassoer Com. Ungarn.	1858	1	1	1
93	Alessandria, S. Guiliamo vechio, Pie- mont.	1860	100	100	1
94	Udipi, Canara, Malabar Küste, Ost- Indien	1866	6.2	6.2	1
95	Pultuszk, Sielcze Nowy, Polen	1868	1235	5317	45
96	Slavetic, bei Agram, Kroatien	1868	6	6	1
97	Danville, Alabama, N. Am	1868	2	2	1
98	Hungen, Hessen, Deutschland	1877	10.5	12.5	2
	<i>Chondrit grau, breccienartig.</i>				
99	Krawin, Plan, Tábor, Böhmen	1753	703	762.4	4
100	Sena, Sigena, Aragonia, Spanien	1773	94	94	1
101	Chantonnay, Vendée, Frankreich	1812	40	79.5	3
102	Chandakapoor, Beraar, Ost-Indien	1838	42	48.8	2
103	Cereseto, Casale, Monferato, Italien.	1840	93	182	2

Lauf Zahl	Fallort	Datum des Fal- les oder Fundes	Gew. des Haupt- Exempl.	Ge- samt- Gewicht	Zahl der Exemplare
			in Grammen		
104	Assam, Ost-Indien	1846	1	1.3	1
105	Nulles, Catalonia, Spanien	1851	25	26	1
106	Molina, Murcia, Spanien	1858	48	130.6	3
107	Mouza Khoorna, Bubuwoly, Gorruck- pur, Ost-Indien	1865	3.9	3.9	1
108	Elgueras, Cangas de Onys, Ovideo, Spanien	1866	42	42	1
109	Castalia, Nash Co., N. Am	1874	40	40	1
110	Homestead, Amana, Jowa, N. Am . .	1875	2480	3586	9
111	Ställdalen, Nya Kopparberget, Schweden	1876	170	259	2
<i>Orvinit.</i>					
112	Orvinio, bei Rom	1872	149	226.2	3
<i>Chondrit, schwarz.</i>					
113	Renazzo, Ferrara, Italien	1824	51	99.3	3
114	Mikenskoi, Grosnaja, Kaukazus	1861	177	177	1
115	Sevrukof, Belgorod, Kurksk, Russ- land	1874	63	63	1
<i>Chondrit, kohlig.</i>					
116	Alais, Gard, Frankreich	1806	--	1.5	1
117	Cold, Bokkeveld, Capland, S. Afrika .	1838	5	15.1	5
118	Kaba, bei Debreczin, Hajduer Com. .	1857	17	27.5	4
119	Orgueil, Tarn et Garonne, Frank- reich	1864	69	72.6	1
120	Nagaya, Entre Rios, Argentinien . . .	1879	13	13	1
<i>Kugelchondrit.</i>					
121	Albareto, bei Modena Italien	1766	16	16	1
122	Wittmess, Eichstädt, Baiern	1785	84	84	1
123	Benares, Krakhut, Ost-Indien	1798	110	110	2

Lauf. Zahl	Fallort	Datum des Fal- les oder Fundes	Gew. des Haupt- Exempl.	Ge- samt Gewicht	Zahl der Exemplare
			in Gramm		
124	Timoschin, Juchnov, Smolensk Russ- land	1807	107	117	2
125	Praskoles, Zebrak, Böhmen	1824	7	7	1
126	Pine Bluff, Missouri, N. Am.	1839	4.6	4.6	1
127	Utrecht, Blaaw Capel, Holland. . . .	1843	6320	6598	4
128	Yatoor, Nellore, Madras, Ost-Indien .	1852	2	4	2
129	Borkut, an der schwarzen Theiss, Mar- maroser Com. Ungarn	1852	103	220.8	4
130	Trenzano, Brescia, Italien.	1856	116	121	2
131	Quenggouk, Pegu, Indien.	1857	2	4	1
132	Aussun, Montréjeu, Haut Garonne, Frankreich	1858	167	187	3
133	Gopalpur, Jessore, Ost-Indien.	1865	5	5	1
134	Hessle, Upsala, Schweden	1869	67	121.5	4
135	Searsmont, Walde Co., Maine, N. Am.	1871	11.3	22.3	2
136	Lancé, Authon, Orleans, Frank- reich	1872	6	6	1
137	Ihung, Dhuin Mohamed, Ost-Indien .	1873	6	6	1
138	Zsadány, Temeser Com. Ungarn . . .	1875	151	181	3
139	Rochester, Fulton Co., Indiana, N. Am.	1876	—	1	1
140	Sarbonavác, Szokobánya, Alexinác, Szerbien	1877	440	639	3
141	Tieschitz, Prerau, Mähren	1878	45	45	1
142	Gnadenfrei, Preus.-Schlesien	1879	27	51	2
<i>Kugelchondrit, geädert.</i>					
143	Sikkensaare, Tennasilmi, Esthland, Russland	1872	86	86	1
<i>Kugelchondrit, breccienartig.</i>					
144	Weston, Tairfield Co., Connecticut, N. Am.	1807	42	82.5	5
145	Les Ormes, Yonne, Frankreich	1857	2.2	2.2	1

Lauf. Zahl	Fallort	Datum des Fal- les oder Fundes	Gew. des Haupt- Exempl.	Ge- samt- Gewicht	Zahl der Exemplare
			in Gramm		
	<i>Kugelchondrit, Ornansit.</i>				
146	Ornans, Salins, Doubs, Frankreich. . .	1868	4	4	1
147	Warrenton, Missouri, N. Am.	1877	37	79	3
148	Ngawi, Djogorogo, Java	1883	105.2	105.2	1
	<i>Chondrit, krystallinisch.</i>				
149	Erxleben, Magdeburg, Preussen . . .	1812	24	29.3	2
150	Richmond, Henrico Co., Virginia, N. A.	1828	—	0.5	
151	Mainz, Hessen	1850	25	25	1
152	Segowlee, Chumparun, Ost-Indien . .	1853	2	3	2
153	Stawropol, Kaukasus, Russland . . .	1857	6	6	1
154	Menow, Alt-Strelitz, Mecklenburg . .	1862	73	113.4	3
155	Pillistfer, Aukoma, Livland, Russ- land	1863	67	67	1
156	Vernon Co., Wiscousin, Claywater, N. Am.	1865	11	11	1
157	Daniels Kuil, Griqua, Süd-Afrika . .	1868	11.7	17.7	2
158	Motecka nugla, Bhurtpur, Ost-Indien	1868	10	10	1
159	Cléguerec, Kernouve, Bretagne, Frank- reich	1869	76	183	4
160	Tjábé, Pandangan, Java	1869	470	500	3
161	Khairpur, Mooltan, Ost-Indien. . . .	1873	—	1	1
	<i>Chondrit, krystallinisch, breccienartig.</i>				
162	Ensisheim, Sundgau, Ober-Elsass . .	1492	763	962	6
	<i>Mesosiderit.</i>				
163	Hainholtz, Paderborn, Minden, West- phalen	1856	138	470	5
164	Sierra de Chaco, Mejillones, Atakama	1862	83	256.3	9
165	Esterville, Emmet Co., Jowa, N. Am.	1879	712	1675	8
166	Veramin, Karand, Teheran, Persien .	1880	31	62	3

Lauf. Zahl	Fallort	Datum des Fal- les oder Fundes	Gew. des Haupt- Exempl.		Ge- samt- Gewicht	Zahl der Exemplare
			in Grammen			
II. Eisenmeteoriten.						
<i>Siderophyr.</i>						
167	Rittersgrün, Steinbach, Schwarzen- berg, Sachsen	1847	145	309.7	6	
168	Breitenbach, Platten, Böhmen.	1861	37	109	4	
<i>Pallasit.</i>						
169	Krasnojarsk, Medwedewa, Sibirien .	1749	594	1334	7	
170	Imilac, Atakama, Bolivia, S. Amerika.	1800	2400	3810	9	
171	Albacher Mühle, Bitburg, Trier, Preussen	1802	617	1243	4	
172	Rokičky, Brahin, Minsk, Russland . .	1810	53	53	1	
<i>Oktaëderische Eisen, feinste Lamellen.</i>						
173	Butler, Bates Co., Missouri, N. Am .	1874	192	501.4	4	
174	Knoxville, Tazewell, Tennessee, N. A.	1853	177	380	3	
175	Werchne Dnjeprowszk, Ekaterinosz- lav, Russland	1876	—	8	1	
<i>Oktaëderische Eisen, feine Lamellen.</i>						
176	Victoria West. Cap Colonie, S. Afrika.	1862	4.2	4.2	1	
177	Prambanan, Soerakarta, Java	1866	85	106	3	
178	Charlotte, Dickson, Co., Tennessee, N. Am.	1835	16	16	1	
179	Putnam Co., Georgia, N. Am.	1839	10.1	15.1	2	
180	Lagrange, Oldham Co., N. Am.	1860	49	49	1	
181	Russel Gulch, Colorado N. Am.	1863	9.6	9.6	1	
182	Baird's Farm, Asheville, N. Karolina, N. Am.	1839	—	0.94		
183	Obernkirchen, Ruckeburg, Preussen.	1863	138	184.3	4	
184	Losttown, Cherokee Co., Georgia, N. Am.	1867	22.2	22 2	1	

Lauf. Zahl	Fallort	Datum des Fal- les oder Fundes	Gew. des Haupt- Exempl.	Ge- samt- Gewicht	Zahl der Exemplare
			in Gramm		
185	Elbogen, Böhmen	1400	254	454.5	6
186	Hraschina, Agram, Kroatien	1751	1	2.3	3
187	Bear Creek, Aeriote, Denver Co., Co- lorado, N. Am.	1866	80.3	80.3	1
188	Madoc, Ober-Canada, N. Am.	1854	7.4	12.4	2
189	Cambria, Lockport, N. York, N. Am.	1818	38	38	1
190	San Francisco del Mesquital, Mexiko.	1867	14.5	14.5	1
<i>Oktaëderische Eisen, mittlere Lamellen.</i>					
191	Cross Timbers, Red River, Texas, N.A.	1808	107	125	3
192	Murfreesboro, Rutherford Co., Tennessee, N. Am.	1847	63	63	1
193	Werchne Udinsk, Witim, Niro, Sibirien	1854	434	553	2
194	Ivanpah, San Bernard Co., Kalifornien	1880	8.6	8.6	1
195	Toluca, Ixtlahuca, Xiquipilco, Mexico	1784	17186	37254	13
196	Lénártó, Sároser Com. Ungarn	1814	73620	76516	6
197	Coopertown, Roberts Co., Tennessee, N. Am.	1860	19	31.5	2
198	Schwetz, Preussen	1850	584	655.8	3
199	Staunton, Augusta Co., Virginia, N. A.	1858	2570	6785	4
200	Burglington, Otsego Co., N. York, N.A.	1819	117	212.8	8
201	Trenton, Wisconsin, Washington Co., Amerika.	1858	71	71	1
202	Milwaukee, Wiscousin, Amerika . . .	1868	368	606	3
203	Juncal, Paypote, Chili	1866	77	77	1
204	La Cail, Saint Aubau, Var, Frank- reich	1600	40	72.6	2
205	Charcas, S. Louis Potosi, Mexico . . .	1804	9	9	1
206	Misteca, Oaxaca, Mexico	1804	299	317.2	3
207	Aviles, Durango, Rancho, de la Pila, Mexico	1805	81	81	1
208	Carthago, Coneyfork, Smith Co., N. A.	1840	3950	6775	6
209	Seneca Falls, Waterloo, New-York .	1850	4.8	5.8	2

Lauf. Zahl	F a l l o r t	Datum des Fal- les oder fundes	Gew. des Haupt- Exempl.	Ge- samt- Gewicht	Zahl der Exemplare
			in Gramm		
210	Ruff's Mountain, Lexington Co., S.- Carolina N. Am.	1850	276	289.3	2
211	Denton Co., Texas, N. Am.	1856	8	8	1
212	Fort Pierre, Nebraska, Missouri, N. A.	1856	12	12	1
213	Chulafinnee, Cleberne Co., Alabama, N. Am.	1873	648	1030.8	5
214	Njetschajevo, Tula, Russland	1846	18	33.4	5
<i>Oktaëdrische Eisen, grobe Lamellen.</i>					
215	Bemdego, Bahia, Brasilien	1784	123.5	249	4
216	Bohumilitz, Prachin, Böhmen	1829	635	715	3
217	Black Mountain, Ascheville, N.-Karo- lina, N. Am.	1835	44	44	1
218	Cosby's Creek, Coke Co., Tennessee	1840	53	102	4
219	Lexington, S. Karolina, N. Am.	1880	17.2	17.2	1
220	Cranbourne, Melbourne, Victoria, Australien	1854	2730	2732.1	2
221	Wichita Co., Brazos, Texas, N. Am.	1836	949	949	1
222	Árva, Magura, Szlanicza, Ungarn. . .	1840	4321	18637	14
223	Caryfort, De Kalb Co., Tennessee, N.A.	1840	138	138	1
224	Sarepta, Astrachan, Saratow, Russ- land	1854	175	254	2
225	Missouri, South-Eeast, N. Am.	1863	4.3	4.3	1
226	Duell Hill, Madis. Co., N. Karolina, N.A.	1873	29	29	1
<i>Oktaëdrische Eisen, gröbste Lamellen.</i>					
227	Seeläsger, Brandenburg, Preussen. .	1847	290	900	5
<i>Oktaëderische Eisen, breccienartig</i>					
228	Union Co., Georgia, N. Am.	1853	3.3	4.3	2
229	Nelson Co., Kentucky, N. Am.. . . .	1856	50	50	1
230	Zacatecas, Mexico	1792	251	337.4	3

Lauf, Zahl	F a l l o r t	Datum des Fal- les oder Fundes	Gew. des Haupt- Exempl.	Ge- samt- Gewicht	Zahl der Exemplare
			in Grammen		
231	Barranca blanca, Chili	1866	25	25	1
232	Sierra di Deesa, Santiago, Chili	1863	14	17.8	2
	<i>Hexaëdrische Eisen.</i>				
233	Coahuila, Mexico	1837	6160	13777	7
234	Cañada de Hierro, Tucson, Sonora, Mexico	1846	1	11	
235	Braunau, Böhmen	1847	70	177.3	7
236	Pittsburg, Alleghany Co., Pennsylvana, N. Am.	1850	4.7	4.7	1
237	Auburn, Macon C., Alabama, N. Am.	1867	17.5	20.5	2
238	Nenntmannsdorf, Pirma, Sachsen. . .	1872	48	48	1
239	Lick Creek, Davids. Co., N.-Karolina, N. Am.	1879	40	40	1
240	Santa Rosa, Neu-Granada, Columbia, S. Amerika	1810	3.8	3.8	1
241	Capland, zwischen Sontag u. Busch, S.- Afrika	1793	66050	67361.6	4
242	Babb's Mill, Greenville, Tennessee, N.A.	1818	33	33	1
243	Kokomo, Howardt Co., Indiana, N. A.	1862	35	35	1
244	Chesterville, S. Karolina, N. Am. . .	1847	64.4	98.5	2
245	Salt River, Kentucky, N. A.	1850	5	5	1
	<i>Dichte Eisen.</i>				
246	Rasgata, Neu-Granada, S. Amerika .	1810	154	157.1	2
247	Siratik, Senegal, Afrika	1763	1.5	1.5	1
248	Campo del Cielo, Tucuman, Rio de la Plata, S. Amerika	1783	38	67.5	3
249	Newstead, Boxburgshire, Schottland .	1827	21	21	1
250	Scriba, Osvego, Albany, N. York, N.A.	1834	8	15.7	2
251	Disco, Eiland, Ovifac, Grönland	1808	36625	39934	7
252	Walker Co., Alabama, N. Am.	1832	33	33	1
253	Tarapaca, Hemalga, Chili, S. Amerika.	1840	193	252	2
254	Santha Catharina, Minas geraes, Brasil.	1873	1298	1914	4

Anmerkung. Das in diesem Verzeichnisse eingehaltene System ist — abgesehen von einigen Kürzungen — dasselbe, welches Herr Dr. A. Brezina in seinem im vorigen Jahre (Mai) erschienenen Catalog der Meteoritensammlung des k. k. Mineralogischen Hofkabinetes, befolgte.

Auch die Meteoritengruppe, welche im genannten Cataloge als »intermediär« bezeichnet wurde, ist — um die daselbst gegebene Reihenfolge nicht zu stören — vorläufig beibehalten worden, wenngleich deren einzelne Glieder besser in die beiden Nachbargruppen unter zu bringen sind.

In Bezug auf Alfianello muss betont werden, dass dieser Chondrit stellenweise auch geadert ist.

Schliesslich ist zu bemerken dass die M. Rittersgrün und Breitenbach hier unter zwei Nummern angeführt sind, wenngleich dieselben einem Falle angehören. Dasselbe gilt von Trenton und Milwaukee.



Budapest.

☞ Buchdruckerei der Act.-G. „Athenaeum“ ☞

1886.

