

Magyar Flóraművek IV-V.

F 245

*37/
1943*

MAGYAR FLÓRAMŰVEK IV. FLORAE REGIONUM HUNGARIAE CRITICAE IV.

2929

A MECSEKHEGYSÉG ÉS KÖRNYÉKÉNEK FLÓRÁJA

FLORA REGIONIS MONTIUM MECSEK

AUCTORE

A. HORVÁT S. O. Cist.
PROF. GIMN.

EDITIO ABBATIAE ZIRCENSIS S. O. CIST.



PÉCS, 1942.

Separatum ex opere auctoris:
**A MECSEKHEGYSÉG ÉS DÉLI SÍKJÁNAK
NÖVÉNYZETE.**



1 B2/200 00013498
TTK KARI kv.
BIOLÓGIA Szakgy.

NYOMATOTT, TAIJS. JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁBAN.
Felelős nyomdatulajdonos: WITTELSBACH KÁROLY.
Felelős kiadó: HORVÁT ADOLF S. O. Cist.

ELŐSZÓ.

A magyar botanikai irodalom nagy nyereségéeként üdvözlöm Horvát Adolf ciszterci tanár úr értékes munkáját: a mecseki flóraművet. E sorok írója ezelőtt 15 évvel megígézve a Mecsek flórájának szépségétől és változatosságától, tervbe vette e táj növényvilágának rendszeres feldolgozását. Midőn azonban arról értesült, hogy a baranyai flóra kutatásában méltó utóda akadt a nagy úttörőknek, Kitaibel Pálnak és a Nendtvicheknek, kész örömmel bocsátotta rendelkezésére a lelkes kutatónak irodalmi összeállításának egyes adatait és kutatóútjairól készült feljegyzéseit. A bizalom nem hozott csalódást, íme előttünk fekszik a szerző 8 évi szorgos munkájának gyümölcse. Távol egyetemi növénytani intézetektől és múzeumoktól, elsősorban saját kutatásainak alapján, de egyben az idevonatkozó irodalom és herbáriumi anyag kritikai feldolgozásával, a szerző teljes és megbízható képet nyújt a mecseki flóraterület virágos és harasztféle növényeiről. Nemcsak a sokaktól kutatott Mecsekhegységet és a Harsányihegyet járja be, de lankadatlan buzgalommal tárja fel az eddig ismeretlen baranyai síkot és dombvidéket is. Kétszázhatvan kirándulás eredményét, éveken át folytatott fárasztó könyvtári és herbáriumi munka gyümölcset nyújtja most nekünk. Nemcsak a szaktudósok számára írt felsorolást ad (ez a rész, mint a szerkesztésben is megjelenő Magyar Flóraművek IV. kötete szervesen illeszkedik az előzőkhez), hanem élvezetes olvasmányt is a nagyközönségnek a Mecsek és környéke növényvilágának kincseiről. A Mecsek florisztikai növényföldrajzi jellemzése munkájának kiemelkedő értéke.

A magyar botanikai tudomány valóban őszinte hálával és elismeréssel adózik Endrédy Vendel zirci apátúr áldozatkészségének, amely lehetővé tette Horvát Adolf, a Rend érdemes és munkás tagja jeles könyvének megjelenését.

Kolozsvár, 1941. jan. 1.

Dr. berei Soó Rezső

egyetemi ny. r. tanár,
a kolozsvári tudományegyetem
Rendszeres Növénytani Intézetének,
Botanikus Kertjének és Múzeumának
igazgatója.

Bevezetés.

A Magyar Flóraművek negyedik kötete a Mecsekhegység és környékének flórája. A feldolgozott terület magában foglalja a magyar flóratartomány (*Pannonicum*) dunántúli flóravidékének (*Transdanubicum*) szoros értelemben vett mecseki flórajárását (*Mecsekicum* = *Sopianicum*), és az alföldi flóravidék (*Eupannonicum*) titeli flórajárásának (*Titelicum*) Dunántúl sarkába eső és erősen a Mecsek hatása alatt álló darabját.

A *Mecsekicum*mal határos flórajárások nyugaton a *Somogyicum* (= *Praeillyricum*), északon a *Somogyicum* és a *Praematricum*, ez utóbbi flórajárásnak csak az északkeleti szélén, keleten és délen a Nagy Magyar Alföld *Titelicum*nak nevezett flórajárása.

A feldolgozott terület, vagyis a Mecsek-hegység növényföldrajzi határait, amint a mellékelt térképen is látható, így adom meg: északon határa a Kapos egészen Högyészig (pontosan Dúzsig, illetve a Kaposmérő—Högyész-műútvonal.) Itt a határ követi a Dúzs—Högyész—Bonyhádvarasd—Bonyhád—Szekszárd műútvonalat egészen Szekszárd városáig. Bár Högyész—Szekszárd vonalon a növényföldrajzi határ egyáltalán nem éles, de az bizonyos, hogy Simontornya-környéki erdők már nem mecseki jellegűek. A nyugati határ növényföldrajzi szempontból Szigetvár és Kaposvár közt fekvő vasútvonal, mely az illatos hunyor (*Helleborus odoratus*) határa is nyugat felé.

Hegyrailag Zselic a Mecsek-hegységhez vehető és mivel bükkösei csatlakoznak a baranyaiakéhoz, ezt a somogyi tájat is, mintegy függelék-képen a *Mecsekicum*hoz veszem. A Zselic keleti határa a Szigetvár—Kaposvár közt lévő vasútvonal, nyugaton pedig talajtani határa van és ez nagyjából összeesik a Kaposmérőt Szigetvárral összekötő műúttal. A Zselicet tehát egészen a diluviumból származó, durva homokból álló somogyi tájig veszem fel. A *Mecsekicum* déli és keleti határának a megvonása már könnyű feladat. Itt érintkeznek a Mecsek déli és keleti végső domb-sorai az Alfölddel. Keleten különösen éles a határ és ez nagyjából meg-egyezik: Szekszárd—Bátaszék—Mohács—Németbóly—Nagynyárad településeket érintő műútvonallal. A déli határ pedig a trianoni országhatárnál kezdődik és Villányig jut el. Innen összeesik a Villány—Nagyharsány—Siklós—Máriagyűd—Diósviszló—Hegyszentmárton községeket érintő műúttal. Innen kezdve a határ majdnem egészen Pécsig és valamivel túl Szigetvárig követi a talajtani határt, mely a Mecsek dombjainak tövé-nél lévő lösz elválasztja a legújabb időkből származó artéri üledéktől, mely itt-ott egy kicsit szikesedésre is hajlamos. Egyébként a határ Hegyszentmártontól Pécsig nagyjából a Pécsi víz (egykor Kenézpatak) bal partján húzódik és csak Pécsbagotánál megy át a jobb partra a 142 m magasságot jelző pont körüli erdőt magába foglalva. Pécstől Kacsótán át Szigetvárig a műút a határ.

Közigazgatásilag a *Mecsekicum*hoz tartozik: Baranya vármegye hegy- és dombvidéke a maga teljes egészében, Somogy megye Kapostól délre fekvő lösszel borított része, Tolna megyéből pedig Újdombóvár—Högyész—Bonyhád—Szekszárd—Bátaszék településeken átmenő műúttól határolt kis déli terület, mely a Mecsekhegység tolnai darabjából és néhány kísérő halmából áll.

Területünknek szélét mindenütt lösz fedi. Ez a lösz-terület keleten és délnyugaton ártéri üledékkal, nyugaton pedig diluviumi homokkal találkozik, illetve érintkezik. Ezeken a helyeken tehát elég éles talajtani, illetve geológiai határok vannak. Északon csaknem egészen Högyészig a Kapos szabja meg a természetes határt. Högyésztől növényföldrajzi határ vágja át a talajtani szempontból egységes lösz-vidéket egészen Szekszárdig a fent megadott útvonal mentén. Délnyugaton a Pécsi víztől egészen Villányig ismét a lösz és az ártéri üledék között vezet a természetes határ. Villánytól kelet felé a lösz-takarón át húzódik az orográfiai megfontolások alapján készített növényföldrajzi határ. Egyébként ezt a kis darabot és a már említett Högyész—Szekszárd útdarabot leszámítva a növényföldrajzi határ talajtani, illetve vízrajzi határokkal is egybeesik.

A Mecsekhegység déli síkjának nyugati fele a *Mecsekicum* és Dráva, valamint a lösz és a durva homok által határolt területek között fekszik. Északra van a *Mecsekicum* legdélibb löszből álló halomvidéke, délre a Dráva, nyugaton a durva homok, keleten pedig a Nagyharsány—Bere-mend—Bolmány községeken átmenő útvonal a határ. Ez a terület leszámítva Siklós alatt egy kis lösz-szigetet, ártéri üledék kis szikesedéssel. Ettől keletre, a mecseki halomvidéktől pedig délkeletre fekvő síkságot a Duna és Dráva öleli át két oldalról. Ennek a területnek a szöglete a Dráva torkolatánál ártéri üledékből, a felette elterülő rész pedig löszből áll, melyet a Karasica partján lévő keskeny ártéri rész vág ketté. Karasica medre révén az Alföld mélyen benyúlik a Mecsekaljába. (Érdekes ezeknek a dombok között folyó patakoknak a növényzetét megfigyelni. Így például a Pécsi vízzel érintkező Eger-patak árterében egészen a hegy lábáig Magyarürögnél nő: *Leucojum aestivum*, közelében Szentkútnál meg Orfűnél is *Achillea asplenifolia*. Palénál és Palotabozsoknál is nő ez a faj. Mindkét említett növény jellemző alföldi faj.) Mohács mellett a lösz felett újra ártéri üledék található. Ezen a területen belül fekvő 174 m magas beremendi másod- és 243 m magas báni dombok harmadkori rétegekből állanak és még a *Mecsekicum*hoz tartoznak. Ugyancsak a *Mecsekicum*hoz veszi még Soó Rezső a Fruska Gorát is, melynek növényzetével e helyen nem foglalkozom. A *Mecsekicum*nak lösszel koronázott halomsorain belül harmad-, legbelül pedig legnagyobb magasságban másodkori geológiai rétegek vannak. A *Mecsekicum*on belül lévő tájakat növényföldrajzi, földtani, talajtani és éghajlattani alapon a következőképpen különítem el. (A mellékelt térkép vázlatos áttekintését adja tájegységeinknek, pontosabb és részletesebb térképet l. a könyv végén.)


1. A Mecsek, jele **M.** (A tulajdonképeni Mecsekhegység a kísérő dombok nélkül.) A *Mecsekicum* legjobban kikutatott része. Geológiájával és az alatta fekvő Pécs városnak éghajlatával külön monografiák foglalkoznak. Felületének jó részét régibb geológiai rétegek borítják. Déli

részen mezozoosz, északon pedig mediterrán korú rétegek vannak. Itt-ott gránit is van. Közepén és keleti felében andezit és más vulkanikus kőzetek is találhatók. Ezeken kívül nem mészkő tartalmú még a nyugati résznek legnagyobb darabja, mely a perm korból való. A hegység középső és nyugati részének kisebb darabja, valamint majdnem az egész keleti Mecsek főképp meszes kőzetekből keletkezett, tehát meszes talajú. Ezeknek a kőzeteknek a szélén többnyire lösz van. Mivel erről a területről igen sok adatunk van, ezt a részt még külön tájrészekre tagoljuk. Ezek: a) Jakabhegy, jele J. Csúcsa 602 m. Határai: délen a Mecsekalja és Szentlőrinc közt lévő műút. Mecsekaljától az abaligeti műút egészen az abaligeti v. á.-ig, innen a vasútvonal egészen Szentlőrincig. A Jakabhegy homokkőből keletkezett talaján balti jellegű flóra van, mint a somogyi homokdombokon (Boros MBL 1924 8) a következő acidiphil fajokkal: *Corynephorus canescens*, *Vulpia myuros*, *Jasione montana*. *Corynephorus canescens* nő a geresdi grániton is. Ehhez járul még a Jakabhegyen: *Asplenium septentrionale*, *Adiantum nigrum* és *Lycopodium complanatum* (újabban nem került elő). b) Tubes, jele T. A Mecsek középső része, melynek nevét a legmagasabb pontjától vettem (612 m). Nyugati határa a Jakabhegy. Délen és keleten: a Mecsekalja—Pécs—Hosszúhetény—Zobák vonalon átmenő műút. Innen a zobák—komlói műút. Komlótól Bakóca-Godisáig a vasútvonal, majd ugyancsak ez egészen Abaligetig. c) Zengővár, jele Z. Határa: nyugaton részben a Tubes, részben pedig itt és a többi világrészek irányában is Zobáktól Bonyhád és Pécsváradon át Pécs felé vivő műút. Legmagasabb pontja ennek a tájrészletnek egyúttal a Mecsek legnagyobb magasságát is megadja (682 m).

2. Villányi hegység, jele V. A Mecsekkel és a szekszárdi dombokkal együtt a legjobban kikutatott tája a *Mecsekicum*-nak. Tulajdonképpen geológiailag és florisztikailag is a Mecsekhez tartozik. Ennek a területén is sok másodkorból való kőzet van. Ide tartozik még — amint már említettem — a mezozoosz beremendi és harmadkorú szarmata, valamint kevés andezit kőzetből álló báni domb is. Legmagasabb pontja a nagyharsányi hegy (442 m). Régi magyar neve Szársomlyó volt. Ennek a hegynek a növényzete még déliesebb jellegű és még érdekesebb talán, mint a Mecseké. A csapadék itt kevesebb, mint a Mecseken. Határa Villánytól Hegyszentmártonig összeesik a *Mecsekicum*-éval. Északon Villánytól Siklósvokányig a vasútvonal mellett halad. Innen a Malom-árok a határ egészen addig, míg északra fordul. Majd Bissén át Túronyig húzódik a határ. Túronytól Szaváig megy a határ; majd a Csatorna és Hegyadó árok mentén Hegyszentmártonig jut el. Bánhegyet északról a Karasica, délről kelet-nyugat irányban a következő községek határolják: Kisköszeg, Vörösmart, Pélmonostor. Ezt a dombot botanikailag nem ismerjük. Igaz, az egész szőlőhegy. Nem igen van nyoma az ősi, eredeti növényzetnek. Marsiglinek van néhány adata Vörösmart mellől.

3. Mecsekalja, jele Ma. Határai: északon a Mecsek, nyugaton a *Mecsekicum*, keleten Bonyhád-Hidas v. á.-tól egészen a Dunáig Baranya és Tolna között lévő megyehatár. Innen egészen Villányig a *Mecsekicum* határa összeesik a Mecsekalja határával. Villánytól Hegyszentmártonig a Villányi-hegység a határ. Ezt a hatalmas területet jórészt lösz fedi, van

még itt bővebben pannóniai, kevés szarmata és mediterrán korú réteg. Igen érdekes északkeleti felében a gránit előfordulása. (Elég jelentékeny mértékben.) Ez Geresd körül van és átnyúlik Tolnába is a szekszárdi dombokra. Itt van Geresdnél a tájegység legmagasabb pontja (315 m). Ez a terület botanikailag kevésbé ismert. Kitaibel Pálnak van néhány adata innen, továbbá Janka Viktornak vannak értékes közlései Nagynyárád környékéről. Nagyobb erdőiben e sorok írója járt először. (Alapítványi erdő Erdősmecke felett, borjádi és hercegtöttösi erdő. Ezeken



A Mecsek-hegység és déli síkjának növényföldrajzi tájegységei.

az erdőkön kívül jártam: Geresd, Pécsudvard, valamint Villánykövesd—Vokány közt elterülő, továbbá Görcsöny, Baksa és Németmárok községekhez tartozó erdőkben is.) Ez a vidék a *Mecsekicumnak* jórészt szántófölddel borított tája. Régente több volt itt az erdő és délnyugati része valamikor zárt erdőség volt. A terület szélén az Alföld közelében Németbolyról értékes meteorológiai adataink vannak. Itt a hőmérséklet minden hónapban hidegebb, mint Pécsé, átlagban 0.7°C -al. A csapadék is 60 mm-el kevesebb, mint Pécsé (609 mm). Egyébként területünkön a csapadék keletről nyugat felé állandóan emelkedik egészen 700 mm-ig.

4. Hegyhát, jele **H**. Ez a terület nálam északabbra nyúlik, mint Kogutovicznál. Ahogy a Mecseket délről a Mecsekalja határolja, úgy északról a Hegyhát. Határai északon és keleten a *Mecsekicuméval* esnek egybe, hasonlóképen Szentlőrinc és Szigetvár között. Délen a Mecsek a határ, nyugaton pedig a vasútvonal Szigetvár és Kaposvár közt. Ezt a területet is lősz takarja itt-ott pannóniai rétegekkel tarkítva. Barna erdei talaja van. Csapadékviszonyai hasonlóak a Mecsekaljáéhoz és elérik a 700 mm-t. Itt már hidegebb van, mint a verőfényes Mecsekalján. Högyész-nél a hőmérséklet januáron kívül februárban is 0 alatt van. Ez a terület is alig volt ismert botanikailag. Kitaibel Pál csak futólag járt itt. Hollós Lászlónak van egy-két adata Kurd és Lengyel környékéről. Legújabban Jávorka Sándor és Zólyomi Bálint jártak a lengyeli erdőben. Ugyanott gyűjtött Filarszky Nándor is. Vannak itt nagy erdők, ahol e sorok írója járt először (vaszari, baranyajenői, szentbalázsi és nagyterecsényi, és a Hollófészek). Itt van egyébként a *Mecsekicum* dombvidékének a legmagasabb pontja (357 m).

5. Szekszárdi dombvidék, jele **SZ**. Felszíne geológiailag olyan, mint a Hegyháté. Határa keleten Mecsekalja, egyébként összeesik a *Mecsekicuméval*. Legmagasabb pontja 300 m. Itt a szekszárdi adatok szerint májusban, továbbá júliustól októberig bezárólag melegebb van, mint Pécsé. Különösen feltűnő a nyári és kora őszi meleg. (Jó szekszárdi bor!) A tele viszont valamivel hidegebb, mint Pécsé. Az évi átlag 0.1 -el magasabb, mint Pécsé. Keleti fekvésének megfelelőleg az éghajlat kissé szélsőségesebb, mint Pécsé és a csapadék is 10% -kal kevesebb. Kedvező fekvése a magyarázata annak, hogy bár legkeletibb része a *Mecsekicumnak*, mégis szép mecseki flórája van. Ezt részben Bartal Károly, de főképen Hollós László alaposan felkutatták.

6. Zselic, jele **ZS**. Ez a terület — ahogy már említettem — inkább csak hegyrajzilag, mint növényzetileg tartozik a *Mecsekicumhoz*. Talaja és felszíne hasonlít a *Hegyhátéhoz*. Evvel keletről határos is. A többi irányban határai megegyeznek a *Mecsekicuméval*. Legmagasabb pontja 267 m. A csapadék itt több, mint a Hegyháton; viszont a hőmérséklet már alacsonyabb valamivel. Itt a nádasdi és a Rapol-erdőben elsőnek kutattam edényes növények után.

A következő tájak már nem a *Mecsekicumhoz* tartoznak, hanem a *Titelicumhoz*. A Mecsek déli síkságát nyugati és keleti részre különítjük el. A nyugati részt, kiterjesztve az Ormányság néprajzi értelemben vett táját, ennek az egész területnek a nevéül veszem. A keleti résznek Drávaköz a neve. A baranyai síkság keleti határa a Duna, déli a Dráva, északi a *Mecsekicum*, nyugaton pedig a somogyi homok. Ez Szigetvártól

A flóraelemek eloszlása megfelel a magyar flóratartomány átlag értékeinek, bár keleti elem több van a Magyar Középhegységben és a Nagy Magyar Alföldön, viszont a Mecsektől nyugatra már kevesebb van. Atlantikus, balkáni (különösen illir) és főképen mediterrán elem viszont több a Mecsekben, mint a Magyar Középhegységben és a Nagy Magyar Alföldön. Atlanti és illir a Mecsektől nyugatra valamivel bőségesebben található, viszont a Mecsek a Dunántúl többi, nyugati részével szemben kitűnik a mediterrán, endemikus pannoniai és keletbalkáni elemek nagyobb számával. Melegebb korszak maradványai csak a „Mecsekicum” területén termő fajok. (1. és 12. kivételével.)

Csak a Mecsekben, a Mecsekben és a Dunántúl déli részében, a Mecsekben és a Magyar Középhegységben egyaránt termő fajokat és végül a „Mecsekicum” és „Pannonicum” közös különlegességeit, melyek a Magyar Középhegységet nem érik el és ezeknek a fajoknak a *Mecsekicum* egyes tájegységein belül való előfordulását a mellékelt táblázat tünteti fel. Ebből kitűnik, hogy a legtöbb mecseki ritkaság a Tubesen és a nagyharsányi hegyen van. Érdekes, hogy 6 délies faj már a Mecseket sem éri el. (*Colchicum hungaricum*, *Trigonella gladiata*, *Digitalis ferruginea*, *Dianthus armeriastrum*, *Verbascum pulverulentum*, *Carpesium Wulfenianum*.) Második csoportban vannak Zengővár és Jakabhegy. Ezek után jönnek sorban: Mecsekalja, Ormányság, szekszárdi dombok, Hegyhát és Zselic. Legvégére marad a már teljesen alföldies növényzetű Drávaköz. A Mecsek, Harsányhegy, Ormányság mocsarainak és a szekszárdi domboknak a növényzete eléggé ismert. Mecsekalja, Hegyhát, Zselic és az ormánysági síkság erdeinek eddig egyáltalán nem ismert növényzetéről saját kutatásaim alapján szereztem tudomást. (*A Mecsekhegység és déli síkjának...*) Szólok az Ormányság — úgy látszik — pusztuló mocsári flórájáról az irodalom és saját megfigyeléseim alapján, valamint két érdekes határterületnek: a Zselicnek és a szekszárdi domboknak a Mecsekből hiányzó, de a jelzett területekről megadott növényeiről.

A) Trianoni Magyarországon csak a „Mecsekicum” területén termő fajok.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. <i>Polysticum setiferum</i> | 7. <i>Chaerophyllum aureum</i> |
| 2. <i>Colchicum hungaricum</i> | 8. <i>Asperula taurina</i> |
| 3. <i>Orchis simia</i> | 9. <i>Digitalis ferruginea</i> |
| 4. <i>Paeonia banatica</i> | 10. <i>Inula spiraeifolia</i> |
| 5. <i>Helleborus odorus</i> | 11. <i>Doronicum caucasicum</i> |
| 6. <i>Trigonella gladiata</i> | 12. <i>Centaurea stenolepis</i> |

B) A „Mecsekicum” és Dél-Dunántúl közös különlegességei.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. <i>Ruscus aculeatus</i> | 8. <i>Genista ovata</i> v. <i>nervata</i> |
| 2. <i>Tamus communis</i> | 9. <i>Vicia lutea</i> |
| 3. <i>Gladiolus communis</i> | 10. <i>Lathyrus venetus</i> |
| 4. <i>Dianthus giganteiformis</i> | 11. <i>Galium lucidum</i> |
| 5. <i>D. armeriastrum</i> | 12. <i>Cirsium Boujartii</i> |
| 6. <i>D. barbatus</i> | 13. <i>Carpesium Wulfenianum</i> |
| 7. <i>Dentaria trifolia</i> | |

C) A „Mecsekicum“ és a Magyar Középhegység közös különlegességei.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. <i>Phleum paniculatum</i> | 17. <i>Cotinus coggygria</i> |
| 2. <i>Bromus pannonicus</i> | 18. <i>Convolvulus cantabrica</i> |
| 3. <i>B. maximus</i> | 19. <i>Onosma Visianii</i> |
| 4. <i>Orchis signifera</i> | 20. <i>Scutellaria altissima</i> |
| 5. <i>Draba muralis</i> | 21. <i>Stachys alpina</i> |
| 6. <i>Silene nemoralis</i> | 22. <i>Thymus clivorum</i> |
| 7. <i>S. viridiflora</i> | 23. <i>Scrophularia vernalis</i> |
| 8. <i>Aconitum anthora</i> | 24. <i>Digitalis lanata</i> |
| 9. <i>Hesperis matronalis</i> | 25. <i>Plantago argentea</i> |
| 10. <i>Sempervivum Schlehani</i> | 26. <i>Valerianella membranacea</i> |
| 11. <i>Sorbus domestica</i> | 27. <i>V. coronata</i> |
| 12. <i>Potentilla micrantha</i> | 28. <i>Artemisia Lobelii</i> |
| 13. <i>Waldsteinia geoides</i> | 29. <i>Xeranthemum foetidum</i> |
| 14. <i>Cytisus procumbens</i> | 30. <i>Serratula lycopifolia</i> |
| 15. <i>Lathyrus sphaericus</i> | 31. <i>S. radiata</i> |
| 16. <i>Geranium lucidum</i> | 32. <i>Crepis pulchra</i> |

D) A „Mecsekicum“ és „Pannonicum“ közös különlegességei, melyek a Magyar Középhegységet nem érik el.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. <i>Trifolium pallidum</i> | 4. <i>Verbascum pulverulentum</i> |
| 2. <i>Tilia tomentosa</i> | 5. <i>Scrophularia Scopolii</i> |
| 3. <i>Ajuga Laxmanni</i> | 6. <i>Centaurea banatica</i> |

C)-hez azt kell megjegyezni, hogy az 1, 3, 5, 15, 18, 24, 26—28, 31. sz. jelzett fajok a Magyar Középhegységnek csak a nyugati felében teremnek. 1, 19. sz. jelzettek Pozsonynál is, 8, 13, 21, 23. sz. jelzettek a Kárpátokban is, 19, 30. sz. jelzettek még Nyitránál is nőnek. Az *Ajuga Laxmanni* pedig a Bakonyt is eléri.

A „Mecsekicum“ érdekesebb növényeinek eloszlása tájegységeinkint.

1. Mecsek. a. Jakabhegy. **A.** 1, 5, 7, 8, 11, 12. **B.** 1, 2, 8, 9, 10. **C.** 5, 7, 12, 18, 20, 21, 23, 32. **D.** 2, 5, 6. Összesen: 22.
 b. Tubes. **A.** 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12. **B.** 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. **C.** 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. **D.** 1, 2, 5, 6. Összesen: 48.
 c. Zengő. **A.** 3, 4, 5, 8, 12. **B.** 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. **C.** 7, 9, 12, 20, 21, 23. **D.** 2, 3, 5, 6. Összesen: 25.
2. Villányi hg. a beremendi és báni dombokkal. **A.** 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11. **B.** 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11. **C.** 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. **D.** 2, 6. Összesen: 35.
3. Mecsekalja Geresddel. **A.** 1, 5, 8, 9. **B.** 1, 2, 8, 9, 10. **C.** 1, 2, 7, 12, 20, 24. **D.** 2, 3. Összesen: 17.
4. Hegyhát. **A.** 5. **B.** 1, 2, 6, 8, 10. **C.** 7, 12. **D.** 2, 5, 6. Összesen: 11.

5. Szekszárdi dombok. A. 5, 11, 12. B. 1, 2, 6. C. 7, 11, 12, 20. D. 2, 3. Összesen: 12.
6. Zselic. A.—B. 1, 2, 6, 8, 9, 10. C. 7, 11, 12. D. 4, 5, 6. Összesen: 12.
7. Ormányság. A.—B. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13. C. 5, 24. D. 2, 4, 6. Összesen: 13.
8. Drávaköz Mohácsszigettel. A. 9. B. 13. C.—D. 3, 6. Össz.: 4.

Az Ormányság mocsaras területeiről az Alföldhöz hasonlóan — úgy látszik — a következő fajok pusztultak ki, illetve vannak kipusztulóban: az áprilisi flórából: *Menyanthes trifolia*, a májusiból: *Zannichellia palustris*, *Acorus calamus*, *Hippuris vulgaris*, *Pedicularis palustris*, a júniusi-ból: *Aldrovanda vesiculosa*, *Sparganium simplex*, *Helleborine palustris*, a júliusiból: *Elatinék*, *Nephrodium thelypteris*, *Chrysanthemum uliginosum* stb.

Mindég érdekesek a határon fekvő növényföldrajzi tájak. Így a *Mecsekicum* keleti szélén levő szekszárdi dombokon találunk néhány ritka elemet, amely az Alföldre jellemző, de a *Mecsekicum* többi táján nem terem. (*Allium atrovioleaceum*, *Iris arenaria*, *Astragalus vesicarius*.) A magyar föld közepén endemikus *Centaurea Sadleriana* Szekszárdon kívül még a Hegyhát szélén is megjelenik Lengyelnél.

A *Mecsekicum* nyugati szélén a flórajárásunkhoz csak lazán csatlakozó Zselichen, ahol nagy bükkösök vannak és több lényegesen a csapadék, mint a szekszárdi erdőkben; azonkívül ez a táj dombos nyugati vidékek felé és nem a meleg keletre fekvő Alföldre lejt és nem is olyan meredeken, mint a szekszárdi dombok; érdekes módon csupa olyan növényt találunk a *Mecsekicum* egyéb tájairól hiányzó fajok közül, melyek európai és gyakran középeurópai erdőségekre jellemzőek; tehát inkább nyugati és nem délkeleti elemek, mint a szekszárdi dombok említett érdekes fajai. Ezek a *Mecsekicum* területéről csak a Zselicből ismert fajok a következők: *Blechnum spicant*, *Cardamine amara*, *Spiraea salicifolia*, *Geranium pratense* (van kétes adat Pécsről is), *Thymus effusus*, *Cirsium rivulare*, *C. oleraceum*. Ez utóbbi faj a Hegyhátot is eléri. Érdekes, de még megerősítésre szoruló fajai a *Mecsekicum* flórajárásának csak a zselici tájáról közölt: *Scopolia carniolica* és *Campanula lingulata*. Három szép virága Dunántúl nyugati flórájának, melyek erre a területre jellemzőek is; Somogyban csak Zselicig, a homokos terület határáig jutnak el. Ezek: *Asphodelus albus*, *Hemerocallis flava*, *Erythronium dens-canis*, *Cyclamen europaeum*. A *Cyclamen* Lipótfánál és Szennánál is nő már. Ebbe a csoportba tartozik még a *Betula pubescens* is.

A baranyai síkon, hasonlóan az Alföld más részéhez az erdőkből sok érdekes növény került elő, melyeket régebben montán elemeknek gondoltak. A baranyai dombok peremén az Alföld szegélyén legföljebb 130 m magasságban sok olyan faj él, mely a hegyekről lehúzódva az Alföld sok részén, különösen a szélein meglehetett, de az erdőirtások következtében most már jó részt kiveszett.

A baranyai síkon, főleg az Ormányságban, a következő, az Alföldön ritka vagy egyáltalán nem termő fajok élnek 100 m a tenger színe felett: *Nephrodium spinulosum*, *Athyrium filix-feminea*, *Polypodium vulgare*, *Leersia oryzoides*, *Anthoxanthum odoratum*, *Milium effusum*, *Holcus mollis*, *lanatus*, *Melica uniflora*, *Cynosurus cristatus*, *Carex silvatica*, *pendula*,

pilosa, *Luzula pilosa*, *Colchicum autumnale*, *Allium ursinum*, *Fritillaria meleagris*, *Ruscus aculeatus*, *Majanthemum bifolium*, *Paris quadrifolia*, *Galanthus nivalis*, *Tamus communis*, *Platanthera bifolia*, *Spiranthes spiralis*, *Carpinus betulus*, *Fagus silvatica*, *Quercus cerris*, *Asarum europaeum*, *Stellaria holostea*, *Moenchia mantica*, *Lychnis coronaria*, *Dianthus barbatus*, *armeriastrum*, *Helleborus odoratus*, *Anemone ranunculoides*, *Ranunculus bulbosus*, *auricomus*, *Dentaria bulbifera*, *Turritis glabra*, *Arabis hirsuta*, *Crataegus oxyacantha*, *Rosa arvensis*, *elliptica*, *dumetorum*, *dumalis*, *Cytisus capitatus*, *Medicago arabica*, *Trifolium ochroleucum*, *Dorycnium herbaceum*, *Vicia sepium*, *lutea*, *Lathyrus vernus*, *Pisum elatius*, *Geranium phaeum*, *molle*, *columbinum*, *Euphorbia amygdaloides*, *Linum trigynum*, *Mercurialis perennis*, *Tilia tomentosa*, *Malva alcea*, *Hypericum humifusum*, *hirsutum*, *Viola odorata*, *alba*, *silvestris*, *elatior*, *Daphne mezereum*, *Circaea lutetiana*, *Hedera helix*, *Sanicula europaea*, *Peucedanum carvifolia*, *Primula vulgaris*, *Gentiana cruciata*, *Vinca minor*, *Symphytum tuberosum*, *Pulmonaria officinalis*, *Ajuga reptans*, *Laxmanni*, *Galeopsis speciosa*, *pubescens*, *Lamium galeobdolon*, *maculatum*, *Stachys silvatica*, *Thymus praecox*, *chamaedrys*, *montanus*, *Salvia glutinosa*, *Satureja silvatica*, *Physalis alkekengi*, *Scrophularia Scopolii*, *Veronica officinalis*, *Digitalis lanata*, *ambigua*, *ferruginea*, *Melampyrum nemorosum*, *pratense*, *Rhinanthus crista-galli*, *Lathraea squamaria*, *Asperula odorata*, *Galium divaricatum*, *Campanula cervicaria*, *Knautia drymeia*, *Bellis perennis*, *Filago germanica*, *Carpesium cernuum*, *Wulfenianum*, *Tussilago farfara*, *Petasites hybridus*, *Cirsium Boujartii*, *Centaurea banatica*, *carniolica*, *Lengyelii*, *Hypochaeris radicata*, *Mycelis muralis*, *Lactuca viminea*, *Hieracium sabaudum*, *racemosum*. Ide tartozik még: *Rumex sanguineus*, *Cerastium silvaticum*, *Ranunculus lanuginosus*, *Genista ovata* v. *nervata*, *Viola Riviniana*, *Lonicera caprifolium*, *Euphorbia polychroma*, és még vagy 30 faj, melyek az Alföldön már meglehetősen ritkák.

A Mecsekhegység és környékének növényészövetkezetei még alaposabb felkutatásra szorulnak. Ezekről még korai lenne írni.

Flóraelemek eloszlása Máthé J. (1940) beosztása szerint:

I. Kontinentalis (keleti) elemek	—	—	—	14.7 %
II. Mediterrán (déli) elemek	—	—	—	10.8 %
III. Atlanti (nyugati) elemek	—	—	—	2.4 %
IV. Borealis (északi) elemek	—	—	—	0.1 %
V. Alpesi (havasi) elemek	—	—	—	0.2 %
VI. Balkáni elemek	—	—	—	2.1 %
VII. Kozmopolita elemek	—	—	—	6.6 %
VIII. Adventív elemek	—	—	—	3.0 %
IX. Európai elemcsoport	—	—	—	59.4 %
X. Endemikus (bennszülött) elemek	—	—	—	0.7 %
				100.0 %

A flóra kutatásának története.

Több mint 200 évvel ezelőtt indult meg területünk növényvilágának a felkutatása. Ez alatt az idő alatt számos munka jelent meg, mely több-kevesebb sikerrel szolgálta a mecseki és a mecsekalji flóra megismerését. Felmerül az a kérdés, hogy kik voltak azok a kutatók, akiknek a fáradozása folytán már meglehetősen ismert lett a flóránk?

Területünk flórakutatásának történetét vizsgálgatva önkénytelenül is négy korszakra lehet azt felosztani: 1. Az első kutatók a XVIII. században. 2. Nendtvich Tamás pécsi botanikus iskolája. 3. Országos nevű botanikusok területünkön a XIX. század második felében. 4. A XX. század botanikusai a Mecseken és déli síkján. (L. 20—1. o.)

Janus Pannoniusnak, a nagy magyar renaissance püspöknek a városa, Pécs nem lehet hálátlan a botanikusokkal szemben. Mintegy a rinascimento szellemi örökségeként hamar megindult Baranyában a természetkutató munka, sőt Baranya adta az egyik első természetrajzíróját az egyetemes magyar természettudománynak Mitterpacher Lajos János Mihály (1734—1814) személyében, aki 1734 augusztus 25-én született Bellyén Baranya vármegyében.

Mitterpacher Lajos munkái közül Piller Mátyással (1733—1788) együtt megírt *Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam* című mű fontos a mecseki flórakutatás története szempontjából. Piller Mátyás a természetrajznak volt a tanára a pesti (budai) egyetemen. 1782 júniusában Harsány mellett bőven láttak 2 növényt (*Senecio paludosus* és *Galega officinalis*), július hónapban ugyancsak ebben az évben sok növényt szedtek. (*Leersya oryzoides*, *Melica altissima*, *Diplachne serotina*, *Inula spiraeifolia*, *Cirsium eriophorum*, *Althaea cannabina*, *Peucedanum cervaria*, *Inula conyza*, *Cucubalus baccifer*, *Aconitum anthora*, *Centaurea calcitrapa*, *Serratula radiata*, *Cirsium canum*, *Artemisia Lobelii*.) Ezeket a növényeket mind Pécs mellett szedték. A pécsvidéki aszatról (*Cirsium Boujartii*) — melynek Pécs a locus classicus és melyet a Pécs alatt lévő síkságon találtak és pedig igen bőségesen — több fajjal együtt (*Artemisia Lobelii*, *Diplachne serotina*) képeket is hoznak. Hangsúlyozzák a szerzők, hogy máskor csak ősszel virágzó növényeket a nagyon száraz nyár miatt 1782-ben már július hónapban szedték. Őket megelőzőleg Marsigli Alajos Ferdinánd (1658—1730) *Danubius Pannonico Mysicus*... című 1726-ban megjelent munkájának VI. kötetében a 49—76. o. találjuk az első baranyai növénytani adatokat a dunaparti területekről. (*Achillea Neilreichii*, *Althaea hirsuta*, *Castanea sativa*, *Chrysanthemum leucanthemum*, *Eupatorium cannabinum*, *Lathyrus tuberosus*, *Linum flavum*, *Rosa gallica*, *Centaurea banatica* [Gombocz E.: *A magyar botanika története* c. munkájában Marsiglinek ezt a növényt *C. pannonicának* fejté meg, én azonban *banaticának* gondolom, mert ez sokkal gyakoribb a területünkön], *Helle-*

borus odorus, Polygonatum officinale, Senecio paludosus, Staphylea pinnata, Verbascum phoeniceum.)

Csapó József (1734—1799) Debrecen városának az orvosa megemlíti *Új füves és virágos magyar kert* című munkájában, hogy Baranyában bőven terem a Marti-lapu (*Tussilago farfara*).

Kitaibel Pál (1757—1817) sok adatot nyújtott területünk flórájához, de ezeknek jó része csak akkor jelent már meg, amikor ezeket a növényeket pécsi botanikusok tőle függetlenül újra megtalálták. (L. *Kitaibel Pál Baranyában* című művét a szerzőnek a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos gimnáziumának 1939. Évkönyvében, a tolnai és somogyi Mecsekre vonatkozó adatokat pedig az 1940. éviben.) *Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungariae* című Waldstein gróf nevét is szerzőként említő munkájában Baranyából sok adatot hoz. (*Seseli leucospermum, Hesperis runcinata, Rubus hirtus, Tilia tomentosa, Ajuga Laxmanni.*) A Nagyharsányhegyről 3 fajt közöl (*Asyneuma canescens, Plantago argentea, Serratula radiata*). Ez utóbbi fajt a pécsi hegyek napos dombjain is szedte. Pécssett a Mecsekben is (*Waldsteinia geoides* és *Spiraea oblongifolia*) gyűjtött. Hosszúheténynél is járt. (*Sanguisorba minor* v. *muricata* és a *Silene dichotoma*, valamint az általa ritkának tartott *Geranium divaricatum*ot szedett itt.) Pécsvaradról is van adata. (*Vicia sordida* és *Scutellaria altissima*ot hozza.) Kitaibel Pál 2 fajt (*Hesperis runcinata* és a *Spiraea oblongifolia*at) Baranyában fedezett fel. Az említett növények közül Kitaibel óta 2 fajt (*Seseli leucospermum*ot és *Asyneuma canescens*et) Baranyából, illetve a Harsányi hegyről nem közöltek. Különösen érdekes a Magyar Középhegységre igen jellemző magyarföldi gurgolya (*Seseli leucospermum*), mely mint endemikus növény igen fontos adatot nyújtana a pannoniai és baranyai flóraterek kapcsolatahoz.

Nagy kára a magyar botanikának, hogy Kitaibel Pál nem tudta gazdag gyűjtésének eredményét még életében egy kis résztől eltekintve a nyilvánosságra hozni. Ha ez megtörténhetett volna, Baranya vármegye növényvilágából sokkal több adatot tudtak volna már a pécsi kutatók, akik minden jel szerint semmit sem tudva Marsigli Alajos, Piller Mátyás, Mitterpacher Lajos és Kitaibel Pál megjelent munkáiról, illetve az azokban lévő baranyai vonatkozású adatokról és Kitaibel Pál kéziratairól, teljesen előről kezdték a XIX. században a baranyai flóratérület felkutatását.

A XIX. század első felében pécsi botanikusok kutatták fel Baranya vármegye növényvilága jelenleg ismert növényeinek legnagyobb részét. Egészen jelentéktelenek azok az adatok, melyeket ebben az időben nem pécsi botanikusok közöltek. Schultes József Agoston (1773—1831) hoz pécsi adatokat (a pécsi szőlőkből a *Marrubium remotum*ot, a rétekről a *Thrinia taraxacoides*et). Schultes József Agostont 1809-ben május 28-tól augusztus 17-ig Pécssett internálták politikai okokból, de az udvariás bánásmód a botanizálást lehetővé tette számára. Itt említem meg azt is, hogy Hoffmansegg János gróf (1766—1849) is egy ideig Pécssett volt kénytelen tartózkodni útlevelének rendezése végett. Az esetleg gyűjtött növényeit a drezdai múzeumban kellene keresni. Reichenbach Henrik (1793—1879) Pécsről hoz adatokat. (*Peucedanum arenarium*ot,

és Sadler herbariuma nyomán, — de abban nem találták meg, — a *Malaxis monophyllost* [?] említi Pécsről.)

Néhány szórványos adattól eltekintve a baranyai flórakutató munka kizárólag pécsi botanikusok és pedig Nendtvich Tamás és tanítványai kezében van.

Nendtvich Tamás (1782—1858) életrajzát megírta és emlékét fellelevenítette Róna Jenő. Itt csak annyit említek meg, hogy élete végéig szorgalmasan gyűjtögette a Mecsek virágait, de inkább csak Pécs környékén. Így tehát Nendtvich Tamás első sorban Pécs városának és a szorosabb értelemben vett Mecsekhegységnek a botanikusa. A Róna Jenőtől közölt adatokhoz pótlólag megemlítem, hogy tanulmányait részben Debrecenben, Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály városában végezte és hogy az átutazó botanikusokat mindég szívesen fogadta, így 1818-ban a bécsi Kollárt és a göttingai Murrayt, akik Mehádiába mentek, szintén lekötelező szeretettel vette körül. Kerner Antal nagyon értékesnek találja a botanikai munkásságát és dicséri lelkiismeretességét. Összeköttetésben állott az ország botanikusaival és sok növényt küldött nekik. (V. ö. még: Hölgyfutár. 1858. 182. sz. és Vasárnapi Ujság. 1858. 33. sz.) Különösen a baranyai érdekességek iránt érdeklődtek nála. A növényeit részben Sándor József pesti botanikus nézte át, akivel élénk levelezésben volt. Küldött növényeket Hanák János piarista tanárnak és még sok más botanikusnak.

Nendtvich Tamás maga keveset írt, de az ő támogatásával és adatainak felhasználásával készült el fiának, Nendtvich Károlynak (1811—1892) a Pécs környékén vadon termő növényekről írt latin nyelvű doktori értekezése. Kerner Antal Nendtvich Károly értekezését igen kiválónak és kimagaslónak találja. Sadler József az 1845-ben Pécsen tartott orvosok és természetvizsgálók gyűlésén is kiemeli a Nendtvich család kiváló botanikai munkásságát.

Nendtvich Károly értekezésében betűszerinti sorrendben hozza Pécs környékén vadon termő növényeket. (nem egész 900 fajt!)

Nendtvich Tamás segédje, Balek Rudolf több Nendtvich Károly értekezésében nem szereplő növényt hoz Pécs környékéről. (Így hogy csak az érdekesebbeket említsem, *Scrophularia Scopolii*-t és *Potentilla micranthata*.) Balek Rudolf 1852-ben Majer Mórival Balatonfüreden járt botanizálni és Majer Mórinak Pécsről való távozása után a pécsi gimnázium szertárának növényeket gyűjtött. Majer Móríc az ő jegyzékét is felhasználta, amikor elkészítette értekezését a pécsi flóraterrületről.

Nendtvich Tamásnak Vilmos fiát (1821—93) Simonkai Lajos értekezésében gyakran emlegeti. A pécsi gimnáziumban lévő herbárium a több érdekes adatot tartalmaz Baranya vármegye flórájához.

Nendtvich Tamásnak Pécs és környékének viránya című műve felhasználásával készültek a Pécsen tartott 1845-ik évi vándorgyűlés alkalmával Haas Mihálynak (1810—66) és Hölbling Miksának, Baranya vármegye főorvosának (1811—1900) munkáiban megjelent florisztikai vonatkozású részek.

Majer Móríc (1815—1904) életével és munkásságával bőven foglalkoztam. *Die Flora des Fünfkirchner Pflanzengebietes* 1859-ben megjelent

értekezése már (a kritikai átrostálás után) 1000 vadon termő edényes növényt sorol fel a pécsi flóraterületről. Ez a terület, akár csak Nendtvich Károlynál Baranya vármegyét jelenti. Tévesen szokták tehát Nendtvich és Majer adatait egyszerűen csak így: „Pécs” hozni, bár adatainak jó része Pécs tágabb értelemben vett környékéről való. Nálam adataik általában Baranya, Pécs „környéke”, kifejezetten hegyi növények Pécs „Mecsek”, síkságiak pedig Ormányság (O): Pécs szerepelnek. Kár, hogy értekezése csak kellő kritikával használható, de viszont megbízhatóságát erősen emeli herbariuma aránylag kevés téves határozással és az a tény, hogy több mint egy évtizedet szentelt a baranyai flórakutatásnak. Latzel Baranya mohairól szóló értekezésében hasonló eredményre jut ebben a kérdésben. Majer Móríc növénymeghatározásai általában igen jók, de a növények termőhelyére vonatkozó megállapításai bizonytalan értékűek, épen ezért feltűnőbb adatait törölni kellett. Majer Móríc növényadatai csak fenntartással fogadhatók el. Ilyen értelemben kell az enumeratióban szereplő Majer adatokat értékelni. Itt jegyzem még meg azt is, hogy Nendtvich Károly értekezéséből hiányoznak az edényes virágtalanok és általában a Nendtvichek nem kutatták ki — saját bevallásuk szerint — a baranyai síkságot. Ezt pótolta Majer Móríc, aki 175 új adatot közöl.

A baranyai provinciális botanikai iskola korszakát lezárja Kerner Antalnak 1863-ban megjelent kritikai és kiegészítő értekezése. Kerner, Nendtvich Károly és Majer értekezéseinek a bírálata után Nendtvich Tamástól gyűjtött növényeket ismerteti és végül sok növénynek a pontos lelőhelyét hozza Nendtvich Tamás herbariuma nyomán. A régi pécsi gyűjtők csak a növények nevét hozták értekezéseikben. Ezen próbál legalább is részben Kerner Antal segíteni.

Evvel a munkával le is zárul a pécsi botanika közel félévszázados aranykora, amikor is több, mint 1100 növényt kutattak fel szorgalmas pécsi gyűjtők, akiknek kivétel nélkül Nendtvich Tamás volt a mesterük.

Ahogy a baranyai flóra felfedezésében Kitaibel a XVIII. században és Nendtvich Tamás a XIX. század első felében játszott nagy szerepet, úgy a XIX. század második felében Simonkai Lajos és Janka Viktor munkássága nagy jelentőségű.

Ebben az időben jelent meg Neilreich Agoston összefoglaló munkája a magyar flóráról, aki (Kanitztól kiadott *Reliquiae Kitaibelianae*, *Kitaibelii Additamenta* és Kitaibel kézirateinak a felhasználásával, továbbá az előző fejezetben már említett művek) az irodalom figyelembe vételével közölte munkájában a baranyai vonatkozású florisztikai adatokat. (*Lathyrus venetust* és *Digitalis lanatát* Balek Rudolf, *Rumex pulchert* pedig Majer Móríc exsiccatura nyomán hozza.) Knapp József Armin *Zwei Tage im Baranyaer Comitate* című munkájának és Janka Viktor baranyai vonatkozású cikkeinek az adatait is hozza. Sok florisztikai közleményt kapott levél útján is Janka Viktortól különösen Nagynyárád környékére vonatkozólag.

Janka Viktor legnagyobb felfedezése Baranyában a magyar kikerics (*Colchicum hungaricum*) nagyharsányi lelőhelyének a feltalálása volt.

Baranyából sok kisebb terjedelmű florisztikai közleménye is van, melyek értékes adatokat szolgáltatnak a megye növényvilágához, főképen Nagynyárad, de Pécsvárad környékéről is.

Simonkai Lajos 1873 márc. 1-én, április, július és augusztus hónapokban járt Baranyában. Növényeket gyűjtött a Jakabhegyen, Makáron, Zengön, Nagyharsányhegyen, a Dráva partján, Pécs városa felett a Mecseken és Baranyának sík területein is. Ennek a kutató munkának az eredménye volt: *Adatok Magyarhon edényes növényeihez* című, jórészt baranyai adatokat tartalmazó munkája. (E mű bevezetésében a baranyai flóratérület különlegességeit a következő növényekben látja: *Paeonia officinalis*, *Ruscus aculeatus*, *Ruscus hypoglossum*, *Colchicum hungaricum*, *Doronicum caucasicum*, *Digitalis ferruginea*, *Lonicera caprifolium*, *Trigonella gladiata*, melyet ő fedezett fel a Nagyharsányhegyen.) A bevezetés után kevés kivételtől eltekintve a baranyai növényeknek mind a mai napig legmegbízhatóbb jegyzékét hozza bőséges lelőhelyi utalásokkal. Simonkai alaposságára jellemző, hogy egy év alatt, amelynek csak töredékét töltötte Baranyában, kb. 1.000 fajt irt le területünkről (Ebből 120 egészen új adat!) és ebből csak 2% bizonyult később tévesnek.

Kiváló munkáját Degen Árpád a róla írott nekrológban a következőkben méltatja: Értekezése egész sorát tartalmazza a növénygeográfiailag fontos adatoknak. Így ez alkalommal fedezte fel a *Trigonella gladiatát*, melynek hazánk belső részében való előfordulása rendkívül feltehető.

Simonkai Lajosnak a baranyai flórakutatásban korszakalkotó munkássága tulajdonképpen lezárja lényegileg a baranyai flórakutatást. Néhány adat került még elő az ő kutató munkássága után és még van kilátás arra, hogy a jelenleg ismert növények száma egy párral megszorodik, de nagy vonalakban a flórakutató munka lezártnak tekinthető.

Borbás Vince 1873-ban, 1879-ben és 1894-ben járt Baranyában, (Érdekes, hogy Degen nem említi Borbás 1873-iki nagyharsányi útját.) amikor is megtalált több érdekesebb növényt, melyek közül egy-kettőt ő közül elsőnek a mecseki hegyekből. A *Balaton flórája* című kiváló munkájában a Mecsek különlegességeiből arra következtet, hogy a baranyai növényvilág a balkáni flóra szigetjének tekinthető. Borbás Vince igen sok munkájában találunk elszórtan baranyai adatokat; főképen monográfiáiban (*Rosa*, *Inula*, *Thymus*, *Galeopsis*, *Acer*, *Hesperis*, *Melilotus*, *Quercus* stb...), eredeti adatai főképen Rónádfa (azóta Gyöngyfa), Gusztáv-műve és Mecske (nem Mecsek, hanem Magyarmecske község) környékéről valók. Kortársának, Simonkai Lajosnak is vannak baranyai adatai monográfiáiban (*Quercus*, *Cytisus*, *Ulmus*, *Helleborus* stb.).

Vizsgálgatva a XX. század elmúlt részének baranyai vonatkozású flórairodalmát, azt kell megállapítanunk, hogy ebben az időben csak elszórt adatokat találunk az irodalomban és néhány kisebb ismeretterjesztő értekezést.

Fekete-Blattny munkája hozza elsőnek Baranyából az itt igen ritka nyírfát (*Betula pendula*), és többek között különösen bőven foglalkozik a *bükk* baranyai elterjedési viszonyaival egyéb erdészeti szempontból jelentős fákknak hasonló természetű vizsgálata mellett.

Várady Ferenc *Baranya flórája* a megye monográfiájában sajnos nem nyújt semmi érdemleges adatot, sőt nagyon sok kívánni valót hagy hátra.

Róna Jenő *Pécs és környékének flórájáról és annak tanulmányozóiról* szóló értekezésben Majer Móric és Agh Timót nyomán ismerteti a baranyai flórát és annak történetét kevés kivételtől eltekintve csak Pécssett megjelent munkák alapján adja. Pelóriás gyujtoványfüvet talál a Mecseken.

Mankó-büki Balog Károly (1848—1920), a pécsi ítélő tábla elnökének, Madách Imre nőtestvére fiának „*A virágos Mecsek*”-e még a legnagyobb munka ebből az időből. Balog Károly a gyűjtött növényekről aquarelleket festett és így sok kétes adat tisztázása vált lehetővé. Fel-tűnőbb új adatai mind téveseknek bizonyultak. A Mecsek virágait a virág-zásnak megfelelőleg havonként felosztva ismerteti.

Az utolsó húsz évben legtöbbet járt Baranyában a pesti botanikusok közül Boros Ádám, aki a Mecsekben és a baranyai síkon 17 alkalom-mal fordult meg, 29 napig kutatott és 30 kirándulást tett. Sok és részben a megye flórájára nézve új adatot közöl a Dráva mellékéről és a mo-hácsi Dunaszigetről. Gayer Gyula kiváló növényföldrajzi cikke nyomán, melyben a praenoricum mediterrán elemeit a szerző a Mecsekből népe-síti be, a pannonicum és a praeylliricumnak nevezett mecseki flóravidék kapcsolatait kutatja. A Nagyharsányhegy feltűnő módon gazdag medi-terrán flóráját érdekes népszerű cikkben ismerteti.

A Mecsekben Soó Rezső több ízben járt és monográfiáiban is közöl mások gyűjtéséből bennünket érdeklő adatokat. (*Consolida, hydatophyták, adventivek, Rhinanthus, Melampyrum, Orchidaceae, Aster, Alchemilla.*) Gayer (*Aconitum és Rubus*), Moesz (*Elatine*), Jávorka (*Onosma*), Tuzson (*Potentilla rupestris, Arabis hirsuta*), Zahn (*Hieracium*), Szabó (*Knautia*), Wagner (*Tilia és Centaurea*), Egey (*Centaureum*), Pénzés (*Bromus*), Zólyomi (*Spiraea*), Máthé (*Gladiolus és Arctium*), Lyka (*Thymus*), Degen (*Rosa*), Kümmerle (*Equisetum Moorei*), Rechinger és Bihari (*Rumex*), Beck (*Orobanche*), Keller (*Veronica*) stb. ... mono-gráfiák is tartalmaznak még adatokat területünkhöz. Jávorka Sándor *Magyar Flórájának* a megjelenése természetesen a mecseki flórakutatás történetében is határkövet jelentett.

Csapody Vera egyik cikkében a mecseki tavasz ébredést jelenté-kenyen korábbinak találja a budai hegyekénél. Ezt azért említem meg, mert már ez volt Borbás Vincének a véleménye Simonkai Lajossal szemben.

Kovács Ferenc *Pécs és vidékének növényzetéről* írt cikkében az irodalom alapján ismerteti a baranyai flórát.

Stitz János önálló vizsgálatai alapján közli a *Mecsek mézelő növényeinek a pollenjeit* sikerült mikrofotografiákkal kísérve.

Földváry Miksa a *Mecsekalji gesztenyéseket* ismerteti meg a ter-mészettudományok iránt érdeklődő nagyközönséggel és természetvédelmi értekezést ír a Mecsek növényvédelme érdekében.

Bartha Albert és Visnya Aladár a szegletes veseharasztot (*Dryopteris setiferát*) írják le a Mecsekből. A pécsi Rotary Club német nyelvű ismeretterjesztő cikket közöl a Mecsek néhány ritka virágáról.

Gayer Gyula, Szita Istvánnak († 1934), — aki sokat gyűjtött 1914-ben és 1915-ben a Mecseken — az exsiccatura alapján *Doronicum Sopianae* néven írja le a Mecsekből a *Doronicum caucasicum* és *hungaricum* hybridjét.

Kárpáti Zoltán körtikéket közöl a Mecsekből (*Pirola rotundifolia*t és *minort*, melyet töle függetlenül már előtte én is megtaláltam.) Az eddig említett magyar botanikusokon kívül jártak még területünkön: Vajda László, aki újra megtalálta Nagyharsánynál a *Trigonella gladiatát* (1931), Györffy István, Kőfaragó-Gyelnik Vilmos, Bánhegyi J. stb.stb.

Végig tekintve Baranya vármegye növényvilága felfedezésének a történetén megállapítható, hogy a mecseki és mecsekalji növényvilágot Kitaibel Pál, Nendtvichék, Majer Móric, Simonkai Lajos és Janka Viktor munkája nyomán ismerjük első sorban.

A szerző növényföldrajzi tájegységünk felkutatása végett 260 kiránduló úton vett részt közel egy évtized alatt. A már előzőleg is jól kikutatott területről flórajárásunkon körülbelül 97 új fajt, illetve 200 alfajt és formát (ebből a tudományra nézve is egészen új 20) sikerült kimutatnia a kritikus nemzetségek kivételével, melyek még mindég új anyagot nyújthatnak. (Ezekből 110 formát közöl.)

Az egyes fajok első közlöit az enumeratióból meg lehet állapítani. A közönségesnek jelzett fajokat elsőnek kevés kivétellel Nendtvich Károly közölte. Mitterpacher-Piller (*Galega officinalis*), Csapó (*Tussilago farfara*) és Kitaibel (*Vicia sordida*, *Tilia tomentosa*) már említett fajain kívül, elsőnek hozták a következő közönségesnek jelzett fajokat: Nendtvich T. (*Eragrostis pilosa*, *Carpinus betulus*, *Gypsophila muralis*, *Crataegus monogyna*), Majer (*Nephrodium filix-mas*, *Equisetum arvense*, *palustre*, *Typha latifolia*, *Poa trivialis*, *Bromus tectorum*, *Brachypodium silvaticum*, *Carex vulpina*, *acutiformis*, *Lemna minor*, *Juncus articulatus*, *Urtica urens*, *Erysimum erysimoides*, *Lavatera thuringiaca*, *Veronica persica*, *Scabiosa ochroleuca*, *Pulicaria vulgaris*, *Cirsium canum*, *Leontodon autumnalis*, *Picris hieracioides*, *Crepis biennis*, *Hieracium Bauhini*), Simonkai (*Polygonum lapathifolium*, *Viola arvensis*, *Myosotis micrantha*, *Knautia drymeia*), Bartal (*Camelina microcarpa*), Lyka (*Thymus glabrescens*), Horvát (*Fumaria Schleicheri*).

A Mecsekhegység és a baranyai sík flórájának 1480 fajából és keverékfajtaból elsőnek közöltek:

(1. Régi kutatók az első pécsi flóra megjelenéséig [1836-ig]:)

Marsigli A. (1726)	— — — — —	14
Piller M. és Mitterpacher L.	— — — — —	16
(Waldstein W. F. és) Kitaibel P.	— — — — —	14
Mások (Schultes J. 2, Reichenbach H. 1, Csapó J. 1)	— — — — —	4

• 1726—1836 összesen 48

(Kitaibel már feljegyzett 530 fajt ebben az időben, de nem közölte az adatait.)

(2. *Nendtvich T. pécsi botanikus iskolája* [1863-ig]:)

Nendtvich K.	—	—	—	—	—	—	—	—	874
Nendtvich T.	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Balek R.	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Majer M.	—	—	—	—	—	—	—	—	175
Kerner A. (Nendtvich T. herbariuma nyomán)	—	—	—	—	—	—	—	—	30
Kanitz A. (Kitaibel adatok)	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1836—1863 összesen									1125

(3. *Simonkai L. kutatásának korszaka* [1900-ig]:)

Janka V.	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Neilreich A. (Janka és Kitaibel adatai)	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Simonkai L.	—	—	—	—	—	—	—	—	120
Borbás V.	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Mások (Uechtritz R. 1, Knapp J. A. 2, Beck G. 1)	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1863—1900 összesen									163

(A XX. század kutatói [1940-ig]:)

Boros A.	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Jávorka S. (exsiccat. nyomán)	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Horvát A. (40 exsiccat. nyomán)	—	—	—	—	—	—	—	—	96
Mások (5: Zahn K., 3: Bartal K., Hollós L., 2: Kárpáti Z., Lengyel G., Rechinger K., 1: Bihari Gy., Fekete-Blattny, Kümmerle J. B., Lyka K., Máthé I., Palik P., Tuzson J.)	—	—	—	—	—	—	—	—	24
1900—1940 összesen									144

Itt mondok köszönetet mindazoknak, akik e mű megírásában segítségemre voltak. Dr. Soó Rezső egyetemi ny. r. tanár mecseki gyűjtéseinek anyagát és a monografiákból kiírt irodalmi adatait, dr. Boros Adám egyetemi magántanár, dr. Kárpáti Zoltán egyetemi magántanár, dr. Zólyomi Bálint egyetemi magántanár, dr. Zsák Zoltán kísérletügyi főadjunktus gyűjtéseik eredményeit önzetlenül bocsátották rendelkezésemre, Bihari Gyula középiskolai tanár a *Rumexeket*, dr. Lengyel Géza egyetemi magántanár, kísérletügyi igazgató *Rosákat* és *Hieraciumokat*, Trautmann Róbert okleveles mérnök néhány *Menthát* voltak szívesek meghatározni. Dr. Gombocz Endre múzeumi igazgató pedig Kitaibel Pál területünkön tett utazásairól szóló naplóit fejtette meg. Dr. Visnya Aladár múzeumigazgató néhány adatot szolgáltatott. Hálás köszönet illeti meg a Magyar Nemzeti Múzeum Növény-tárát (Igazgató: dr. Jávorka Sándor egyetemi ny. r. tanár, aki legtöbbet segített munkám elkészítésénél), a budapesti, debreceni és pécsi egyetem számos segítő munkatársát.

A *Mecsekhegység és környékének flórája a Magyar Flóraművek IV. köteteként* is megjelenik, éppen ezért dr. berei Soó Rezső egyetemi ny. r. tanár tollából sajtó alá került eddigi három kötet jól bevált beosztását és rendszerét követi, hogy a Flóraművek egyes kötetait forgató olvasók az egységes szerkesztés és beosztás előnyei révén könnyebben tudják munkámat tanulmányozni. B. Soó Rezső a készülő könyvet átnézte. Ezért hálás köszönetet mondok neki.

Praefatio auctoris.

Iis, qui non utuntur lingua nostra hungarica haec notantur. In introductione (Bevezetés) habetur descriptio partium territorii geobotanici montium Mecsek circuitusque ejusdem. Hanc vide germanice in opere auctoris Borbásia II 1940 no. 1—2. In introductione habetur adhuc p. 10—1. tabella plantarum catalogus in Hungaria tantum in Mecsekico (A), ibidem et Trandanubio meridionali (B), ibidem et Matrico (C) crescentium, p. 12—3. vero catalogus plantarum, quae ex montibus pervenerunt ad planitiem meridionalem Mecsek. (A. s. m. 100 m) Postea legitur historia botanicae in territorio nostro. Hac in parte magni meriti sunt: *Kitaibel*, familia *Nendtvich*, *Majer*, *Simonkai*. Opera eorum vide in litteratura! Postea habetur litteratura et enumeratio secundum systema seriei „Florae Regionum Hungariae Criticae.” Auctor ipse per decennium laboravit in opere suo litteraturam et herbaria scrutando praeprimis autem per autopsiam 260 excursiones faciendo jam cognitam regionem montanam et incognitam collinam silvasque incognitas planas studendo.

Pécs, 1941. jan. 1.

Horvát Adolf
S. O. Cist.

Irodalom. — Litteratura.

(A rendszertani monográfiák mellőzésével.)

- Andrasovszky J.*: Magyarország Orchidea-flórájához. MBL. 1917. 111.
Balek R.: Correspondenz. ÖBW. 1852. II. 14.
— — Zwei Pflanzen von Fünfkirchen in Ungarn. ÖBW. 1853. III. 180.
Balog K.: A virágos Mecsek. MEE. 1918. 5.
Bartal K.: Adatok Szekszárd környékének flórájához. BK. 1910. 33.
Bartha A.: Jkv. BK. 1933. 115.
Borbás V.: Correspondenz. ÖBZ. 1874. XXIV. 252.
— — Dr. Haynald L. érsek herbáriumának harasztféléi. MTK. 1876. XIV. 437.
— — A magyar Nagy-Alföld tölgyei. EL. 1887. 710.
— — A pécsi Knautia (Scabiosa) ciliátáról. MOTV. 1894. XXVII. 277.
— — A magyar flórából. TTK. 1896. 337.
— — Florisztikai adatok. TTK. 1897. 208.
— — A Balaton flórája. 1900.
Boros Á.: Ujabb adatok Közép-Magyarország flórájához. BK. 1920. 39.
— — Jegyzetek a Mohácsi sziget flórájáról. MBL. 1922. 71.
— — Florisztikai közlemények. I. BK. 1923. 70.
— — A drávabalsparti síkság flórájának alapvonásai, különös tekintettel a lápokra. MBL. 1924. 1.
— — A tengerpartvidéki növényzet szigete a baranyai Harsányhegyen. TTK. 165.
— — A Pannonicum és Praeillyricum flóraidékének kapcsolata. MBL. 1928. 51.
— — A páfrányok alföldi előfordulásához. BK. 1930. 77.
— — Jkv. 1933. 116.
— — Néhány ritkább Potamogeton-faj hazai elterjedéséhez. BK. 1934. 156.
— — Adatok Somogy vármegye flórájának ismertetéséhez. VSZ. 1936. 79.
— — Magyarországi hévizek felsőbbrendű növényzete. BK. 1937. 99.
— — Florisztikai közlemények. II. BK. 1938. 310.
Csapody V.: A tavasz ébredése. Ifjúság és Élet. 1931. 355, 379.
— — A cserkészek növénygyűjtő napjának eredményei. BK. 1935. 195.
Csapó J.: Új füves és virágos magyar kert. 1775.
Degen Á.: Deétéri dr. Borbás Vince. MBL. 1905. 165.
— — Bartal Kornél: Adatok Szekszárd környékének flórájához. MBL. 1910. 379. (Bírálat Bartal cikkéről.)
— — Simonkai Lajos. MBL. 1910. 2.
Fekete L. és Blattny T.: Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén. 1913.
Földvály M.: Mecsekalji gesztenyések. TTK. 1937. 567.
— — Természeti emlékek a Mecseken és környékén. EL. 1932. Különlenyomat.

- Gayer Gy.: Phytographische Notizen. MBL. 1932. 44.
- — Vas vármegye fejlődéstörténeti növényföldrajza és a praenorikumi flórasáv. 1925.
- Gombocz E.: Az első hatóságilag védett növény hazánkban. TTK. 1934. 106.
- — A magyar botanika története. 1936.
- Hollós L.: Tolna vármegye flórájához. BK. 1911. 89.
- — *Ruscus aculeatus*ról. MBL. 1912. 279.
- — Tolna vármegye flórájához. MBL. 1914. 57.
- Horvát A.: Egy elfelejtett pécsi botanikus. MEÉ. 1934. 12.
- — Vad pünkösdi rózsza a Mecsek-hegységben. TTK. 1934. 66.
- — A baranyai flóraterület különlegességei. PCGE. 1934.
- — A Mecsek-hegység és a Mecsekalja növényvilága. I. Tavasszal. II. Nyáron. Ifjúság és Élet. 1934—5. III. Ősszel. U. o. 1935—6.
- — Virágzó növények a Mecseken 1934 decemberében. TTK. 1935. 43.
- — Képek a Mecsek és a Mecsekalja növényvilágából. MEÉ. 1935. 5.
- — Ex Flora Baranyaënsi. 1. PMK. 2. 1935.
- — A baranyai növényvilág kutatásának irodalma. PK 12. 1935.
- — Analysis Florae Comitatus Baranya. PMK. 4. 1936.
- — Ex Flora Baranyaënsi. 2. PMK. 4. 1936.
- — Mediterrán elemek a baranyai flórában. PK 28. 1936.
- — Száz éves pécsi botanika. Dunántúl. 1936. máj. 31.
- — A Mecsek és a Magyar Középhegység közös különlegességei. PCGE. 1937.
- — Színes mozgófényképek. Jkv. BK. 1937. 166.
- — Balog Károly mecseki virágaquarelljei. Jkv. 1937. 236.
- — A Mecsek ritka virágai. 1938.
- — Kitaibel Pál Baranyában. KCGÉ. 1939.
- — Ex Flora Baranyaënsi. Borbásia. 1939. I. 94.
- — Képek Baranya vármegye erdőéletéből. BK. Jkv. 1939. 173.
- — A Mecsek növényélete. A Mecsek részletes kalauzában. 1939. 35.
- — Gehört das Hügelland von Simontornya zum Mecsek-Gebirge? Borbásia. 1939. 148.
- — A Mecsek-hegység és déli síkjának növényföldrajzi tájegységei. KPCG. 1940.
- — A pécsi piac vadvirágai. Búvár. 1940. 257.
- — Additamenta ad Floram Baranyaensem. Borbásia 1940. II. 26.
- — Die pflanzengeographische Giedering des Mecsekgebirges. Borbásia. 1940. II. 12.
- — Additamenta ad geobotanicam Baranyaensem. Borbásia. 1941. II. (Jam non citatur.)
- Hunfalvy J.: A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. III. 1865.
- Janka V.: Correspondenz. ÖBZ. XVI. 1866. 398., 1867. XVII. 56, 82, 127, 161, 231, 232, 404., 1870. 319. — XVII. k. gyakran Janka l. c. idézem.
- — Neue Standorte ungarischen Pflanzen. ÖBZ. XVI. 1866. 65., XVII. 1867. 169.
- — Zwei ungarische für die Flora des oesterreichischen Monarchie neue Pflanzenarten. ÖBZ. 1867. XVII. 102.

- — Megjegyzések Boissier *Flora orientalis*a ötödik kötetének első füzetéhez. Magyar Növénytani Lapok. 1882. 117.
- Jávorka S.: Magyar Flóra. 1924—5.
- — A magyar flóra képekben. 1934. (*Csapody Verával.*)
- — Újabb florisztikai adatok. MBL. 1930. 140.
- — Kisebb közlemények. BK. 1934. 258.
- — Kitaibel herbariuma. AMNH. 1926. 428, 1929. 97, 1934. 147, 1935. 55, 1936. 7.
- Kitaibel P.: *Additamenta ad Floram Hungaricam*. ed. Kanitz. Linnaea. 1863.
- — *Reliquiae Kitaibelianae*. ZBG. 1862. XII. 558, 1863. XIII. 57, 507.
- Kanitz A.: Versuch einer Geschichte der Botanik in Ungarn. 1863.
- Karl J.: Herbarium Hanakianum. BK. 1922. 152.
- Kárpáti Z.: Adatok Magyarország flórájához. BK. 1935. 199.
- Kerner A.: Nachtrag zu C. M. Nendtvich' enumeratio plantarum territorii Quinque-ecclesiensis ZBG. 1863. XIII. 561.
- Kiss A.: A pécsi gimnázium története. Különlenyomat. 1914.
- Knapp J. Á.: Zwei Tage im Baranyaer Comitate. ÖBZ. 1866. XVI. 117.
- Kovács F.: Pécs és vidékének növényzetéről. Kalocsai-pécsi Diákszemle. 1927. 5.
- Lengyel G.: A magyar lucernamag származási vizsgálata. Kísérletügyi Közlemények. 1929. Különlenyomat.
- — A *Serratula lycopifolia* (Vill.) Kern. Csonka-Magyarországon. BK. 1932. 155.
- Majer M.: Die Flora des Fünfkirchner Pflanzengebietes. Pécsi kath. főgymnasium programja. 1859. 23.
- Marsigli A. F.: Danubius Pannonico Mysicus... VI. 1726.
- Neilreich A.: Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefäßpflanzen. 1867. Nachträge 1870.
- Nendtvich K.: Dissertatio inaug. historico-naturalis exhibens enumerationem plantarum in territorio Quinque-Ecclesiensi sponte crescentium. 1836.
- Nendtvich T.: Baranyának fanemei. MOTV. 1846. VI. 325.
- — Pécs és környékének viránya. u. o. 288.
- Nendtvich V.: Correspondenz. ÖBW. 1855. V. 14.
- Piller—Mitterpacher: Iter per Poseganam. 1783.
- Róna J.: Pécs és környékének flórájáról és annak tanulmányozóiról. PBME. 1908. 131.
- — *Doronicum Nendtvichii*. U. o. 1909. 89.
- — Emlékezés Nendtvich Tamásról. BK. 1909. 61.
- — A pelóriás gyujtoványfű előfordulása Pécssett. PTTK. 1909. 124.
- — A virágzás kezdete Pécssett 1910-ben. PBME. 1911. 108.
- — Növényfenológiai megfigyelések Pécssett 1911-ben. 1912. 64.
- — U. a. 1912-ben. U. o. 1913. 37.
- Reichenbach H. G.: *Flora germanica excursoria*. 1830.
- — *Iconographia*... XIII. 1851.
- Seymann V.: A *Colchicum hungaricum* Janka rendszertani helye. MBL. 1909. 61.
- Schultes J. A.: *Oesterreichs Flora*. 2. k. 1814.
- Schultz Bip. K. H.: Über *Doronicum Nendtvichii* Sadler. ÖBW. 1854. IV. 410.

- Simonkai (Simkovics) L.*: Adatok Magyarhon edényes növényeihez. MTK. 1876. XI. 157.
- — Új növények leírásai. Természettajzi Füzetek. 1877. 103.
- — Bánsági és hunyadmegyei utazásom 1874-ben. MTK 1878. XV. 479.
- Skofitz A.*: Flora austriaca. ÖBW. 1853. III. 131.
- Soó R.*: A magyar vizek virágos vegetációjának rendszertani és szociológiai áttekintése. MBIM. 1928. 46, 1934. 135, 1935/6. 223.
- — Beiträge zu einer kritischen Adventivflora des historischen Ungarns. Bot. Archiv. 1927. 349.
- — Északi relikturnövények Magyarország flórájában. Tisia. 1939. Separatum.
- Stitz J.*: A Mecsek mézelő növényeinek pollenje. Mezőgazdasági Kutatások. 1930. Különlenyomat.
- Szilády Z.*: Az ősdíófa nálunk és a Balkánon. BK. 1933. 129.
- — Adatok a díófának ősi elterjedéséhez. BK. 1935. 193.
- Szinnyei J.*: Magyar írók élete és munkái. IX. 1903.
- Tatár M.*: A pannoniai flóra endemikus fajai. Tisia. 1939. Separatum.
- Tuzson J.*: Jegyzetek a magyar flóra néhány növényéről. BK. 1914. 138.
- Uechtritz R.*: Bemerkungen über einige Pflanzen der ungarischen Flora... ÖBZ. 1886. 287.
- Waldstein X. F. A. et Kitaibel P.*: Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungariae. I—III. 1802—12.
- — — — —
 ** Einiges über die Flora des Mecsek-gebirges. 1934. Brief aus Pécs. Bericht des Rotary Club.
- — Nendtvich-ünnepély. PBME. 1910. 10.

Mellőzendőnek vélt irodalmi források. — Litteratura omittenda.

- Agh T.*: Pécs és környékének flórája a szerző Emléklapok c. munkájában 1894.
- Haas M.*: A tenyészet a szerző Baranya c. munkájában 1845.
- Hölbling M.*: Baranyának viránya a szerző Baranya vármegyének orvosi helyirata c. munkájában 1845.
- Várady F.*: Baranya flórája a szerző Baranya multja és jelene c. munkájában 1908.

Exsiccata-kiadványok.

FEH: Flora Exsiccata Hungarica. — *MAN*: Tuzson: Magyar Alföld Növényei. — *Gram. Hung.* et *Cyp. Hung.*: Degen: Gramina Hungarica, Cyperaceae Hungaricae.

Kéziratok, jegyzetek. — Manuscripta.

Balog Károly pécsi egyetem tulajdonában lévő mecseki növényfestményein lévő feljegyzések, Boros, Adám, Jávorka Sándor, Kárpáti Zoltán jegyzetei, Majer Móric: Pécs környékén vadon termő növények jegyzéke, Soó Rezső, Zólyomi Bálint, Zsák Zoltán jegyzetei.

Növénygyűjtemények. — Herbaria.

*Magyar Nemzeti Múzeum Herbárium*a, első sorban Simonkai Lajos és Nendtvich Tamás gyűjtéséből, de másokéból is.

*Budapesti Egyetem Növényrendszertani Intézetének Herbárium*a, Borbás Vince néhány növénye.

*Pécsi Ciszterci Gimnázium Herbárium*a, Majer Móric, Nendtvich Vilmos és mások gyűjtéséből.

*Budapesti Piarista Gimnázium Herbárium*a, Nendtvich Károly néhány növénye.

*Győri Bencés Gimnázium Herbárium*a, Ballay Valér néhány baranyai növénye pécsi gyűjtőktől. Polgár Sándor szíves közlése.

*Pécsi Városi Múzeum Herbárium*a, Szita István és régi gyűjtők növényei.

Boros Adám, Kárpáti Zoltán és Soó Rezső adatait levélben közölte.

A szerző *Herbárium*a 5.000 lap területünkön termő növényekből.

Rövidítések: — Abbreviationes:

1. Területfelosztás. — Divisio geobotanica.

M = Mecsekhegység, hegyei: J = Jakabhegy

T = Tubes

Z = Zengővár

V = Villányi hegység

Ma = Mecsekalja

H = Hegyhát

Sz = Szekszárdi dombvidék

Zs = Zselic

O = Ormányság

D = Drávaköz

O, D = a Mecsekből hiányzó síksági fajok baranyai előfordulását jelzi.

2. Irodalom. a) Folyóiratok — Ephemerides:

AMNH = Annales Musei Nationalis Hungarici

BBC = Beihefte zum Botanischen Centralblatt

BK = Botanikai Közlemények, Jkv. = jegyzőkönyv

EL = Erdészeti Lapok

MBIM = Magyar Biológiai Intézet Munkálatai

MEÉ = Mecsek Egyesület Évkönyve

MTE = Matematikai és Természettudományi Értesítő

MTK = Matematikai és Természettudományi Közlemények

MOTK = Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének Munkálatai

ÖBW = Österreichische Botanische Wochenschrift

ÖBZ = Österreichische Botanische Zeitschrift

PK = Pannonia Könyvtár

PBME = Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Évkönyve

PCGÉ = Pécsi Ciszterci Gimnázium Értesítőjéből különlenyomat
 PM = A Pécsi Városi Múzeum kiadványai
 TTK = Természettudományi Közlöny, PTTK = Pótfüzetek a TTK-höz
 VSz = Vasi Szemle
 ZBG = Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft

b) Könyvek, cikkek — Libri, dissertationes:

Bartal: B.: Adatok Szekszárd környékének flórájához
 BK = Balog Károly: A virágos Mecsek és A = aquarell!
 Horv. É. = Horvát: A Mecsek-hegység és déli..
 Hollós = Hollós L.: Tolna vármegye flórájához
 K.-Nendtv. = Kerner: Nachtrag zu C. M. Nendtvich...
 Kit. 1. = Horvát: Kitaibel Pál Baranyában
 Kit. 2. = Kitaibel a somogyi és tolnai Mecsekben in Horv. É.
 Knapp = Knapp: Zwei Tage im Baranyaer Komitate
 Maj. = Majer: Die Flora des Fünfkirchner Pflanzengebietes
 N I és N II = Neilreich i. m. és Nachträge
 Nendtv. = Nendtvich K. i. m.
 NT = Nendtvich T. i. m.
 PM. It. = Piller et Mitterpacher: Iter Poseganam...
 RK = Reliquiae Kitaibelianae
 Simk. = Simonkai: Adatok Magyarhon edényes növényeihez
 WK Ic. = Waldstein et Kitaibel: Descriptiones et Icones...

3. Gyűjtők — Collectores:

Bs. = Boros (jegyzetei)
 Jáv. = Jávorka (jegyzetei)
 KH! = Kaposvári fiúgimnázium herbariuma!
 Kárp. = Kárpáti (jegyzetei)
 Maj. K. = Majer: Pécs környékén vadon termő növények jegyzéke
 (katalog.)
 NV! = Pécsi ciszterci gimnázium herbáriuma, főképp Nendtvich Vilmos
 gyűjtése!
 Soó = Soó (jegyzetei)
 Sz! = Szita István gyűjteménye!
 Zóly. = Zólyomi (jegyzetei)
 ! helynév után = magam gyűjtöttem vagy láttam
 ! személynév után = a gyűjtő példányát láttam, illetve irodalmi utalá-
 soknál a szerző látta.

Virágtalanok irodalmából. — (Az edényesek kivételével.)

(Cryptogamarum litteratura exceptis Pteridophytis.)

I. Nyálkagombák (*Phytosarcodina*). Bánhegyi J. közölt néhány adatot a pécsi Mecsekből és a Zselicből. (Borbásia I.) (12 faj.)

II. Gombák. (*Fungi*). Szekszárd környéke az ország gombászatilag legjobban kikutatott területei közül való. (Hollós L.: *Szekszárd vidékének gombái*. MTK. XXXVII. 2. sz. 1933.) (1386 faj.) Ezeknek egy része azonban már az Alföldről való. Kaposvár környékéről Lojka H. gyűjtéséből H. Rehm közölt tömlős gomba adatokat. (*Ascomycetes Lojkani lecti in Hungaria, Transsylvania et Galicia*. Budapestini. 1882.) Mohács környékéről Schulzer István közölt adatokat. (L. Moesz G.: *A hazai gombakutatás multja és jelene*. TTK. 1934. márc. 1—15. sz. és írásbeli közlése.) Majer M. Pécs környékéről közölt 47 gombát. (*Die Flora des Fünfkirchner Pflanzengebietes*. Pécs, 1859.) Ehhez járul még 2 faj a herbariumából, összesen tehát 49 faj Pécs környékéről.

III. Zuzmók (*Lichenes*). Tevel környékéről, területünk északi határáról Sántha László: *Adatok Tolna vármegye zuzmóflórájának ismeretéhez* c. értekezésében (BK 1924 47) közöl 110 fajt. L. még S.: *Physcia félék monografiája*. Folia Cryptogamica. 1928. 6. n. Továbbá: v. Räsänen: *Ad distributionem Lichenum Usneacearum praecipue in Hungaria*. AMNH. 1940. 104. Pécs környékéről Majer i. értekezése 15 fajt említ; ezeken kívül még 15 faj van herbariumában, összesen: 30 faj. Köfaragó—Gyelnik Vilmos többször gyűjtött területünkön, anyaga feldolgozása alatt van és csak kis részben került nyilvánosságra. Folia Cryptogamica. 1928. p. 578—603. 18 faj, ezekből 5 Majernél. Összesen a Mecsekből és a Harsányhegyről kb. 50 faj.

IV. Mohok (*Bryophyta*). Latzel A.: *Beitrag zur Kenntnis der Moose des Komitates Baranya* c. (MBL 1934 160—191) értekezésében 250 fajt közöl a megye területéről. 1934 óta Boros Ádámnak vannak részben már kiadott és még nem közölt adatai. Van Kitaibel Pál naplójában is egy-két virágtalanokra vonatkozó adat.

Kb. 1700 fajra tehetjük flórajárásunkból közölt virágtalan növényeknek a fajsámát. A moszatok (*Algae*) felkutatása terén még jóformán semmi sem történt. Így is aránylag elég jól felkutatott területe hazánknak a virágtalanok szempontjából flórajárásunk.

Enumeratio plantarum vascularium.

Edényes növények jegyzéke.

Filicales. Harasztok.

Polypodiaceae. Páfrányfélék.

1. *Cystopteris filix-fragilis* (L) Borb. (Hólyagharaszt)

Formae: **a. cynapiifolia** Koch — **b. anthriscifolia** Koch

J: Abaliget „barlang”, Petőc (**a.** Horv. Borbásia II 26), Mecsekalja (!prope Pécs), Magyarürög „Égervölgy” (**b.** l. c.), Orfű „Vízfő” (**a.**!) — T: Pécs (!Simk. 211) — Z: (!RK 590), Hosszúhetény (K.-Nendtv. 573), Püspöknádasd (Simk. 211), Zobák „Hidasi völgy” (!) — V: Harsány (!Simk. 211, **b.**!), Máriagyűd „barlang” (Bs.) — ZS: Kaposújlak (Bs.)

2. *Dryopteris Linnaeana* Christens. (= *Phegopteris dryopteris* (L) Fée) (Tölgyes buglyos-páfrány)

M: Pécs „környéke” (Maj. 41, K.-Nendtv. 574)

3. *D.* (= *Ph.*) *Robertiana* (Hoffm.) Christens. (Mirigyes buglyos-páfrány)

M: Pécs „környéke” (Maj. 41) — Z: Püspöknádasd (Simk. 211)

4. *D.* (= *Nephrodium*) *thelypteris* (L) A. Gray (Mocsári páfrány)

O: Pécs „környéke” (Maj. 41), Sellye „Kápolnapusztá” (K.-Nendtv. 573, NV! Hic frustra quaesivi. Hiába kerestem.) — D: Dárda (Simk. 210)

5. *D.* (= *N.*) *filix-mas* (L) Schott — **a. crenatum** Milde (Erdei pajzsika)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges.

O: Páprád „Tilos erdő”, Sellye „Mocsárerdő”, Marócsa, Baranyahídvég (!), Páprád „Szilas erdő” (Horv. É. 16), Szentegát (**b. deorsolobatum** Milde!), Alsószentmárton (**c. heleopteris** Milde!)

6. *D.* (= *N.*) *spinulosa* (Müll.) O. Ktze. (Szálás pajzsika)

J: Petőc (Visnya apud Horv. PM4 15), Orfű „Szuado” (!) — T: Pécs „Mecsek” (Simk. 210) — Z: Zobák (!) — H: Nagytrecsény (!) — ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 24), Kaposújlak (Bs.) — O: Marócsa (!)

7. *Polystichum lobatum* (Huds.) Chevall. (Karélyos veseharaszt)

J: (Simk. 210), Orfű „Vízfő” (!), „Szuado” (!Visnya BK 1933 115) — T: Pécs „környéke” (Maj. 41), Mánfa „Mélyvölgy” (!K.-Nendtv. 573), „Melegmányi” (!), „Zsidóvölgy” (Visnya l. c.) — Z: Zobák „Hidasi völgy” (!Visnya apud Horv. PM4 15) — V: Máriagyűd „barlang” (Bs.) — H: Nagytrecsény (!), Bakóca (Horv. É. 13)

8. *P. setiferum* (Forsk.) Moore ex Woynar (Díszes veseharaszt)
J: Orfű „Szuado” (!Visnya 1. c.) — T: Pécs „környéke” (Sadler apud Kümmerle Fol. Crypt. I 981), Mánfa „Nagymély-” (!Bartha BK 1933 115), „Melegmányi”, „Zsidóvölgy” (Visnya 1. c.) — Ma: Lovászhétyén (Visnya!)
9. *P. Luerssenii* (Dörtl.) Margittai (*P. lobata* × *P. Braunii*)
J: (Simk.! Determinavit: Kümmerle)
10. *Athyrium filix-feminea* (L) Roth (Hölgyharaszt)
Formae: **a. fissidens** (Döll) Milde — **b. multidentatum** (Döll) Milde
J: (!Simk. 210), Bükkösd (**a.** Horv. Borbásia I 95), Mecsekalja (!, **a.** Soó) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 41, K.-Nendtv. 573) — Z: Szászvár „Dobogó” (**a.** Horv. 1. c.), Zobák „Hidasi völgy”, Zengő (! — H: Bakóca (Horv. E. 13), Nagytrecsény (**a.**, **b.**!) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (**b.**!) — O: Czinderybogád (Horv. E. 15. **b.**), Baranyahídvég (**a.**), Sellye „Mocsár-erdő (**a.**!), Siklós (Horv. E. 16)
11. *Phyllitis scolopendrium* (L) Newm. (Gímharaszt)
J: Abaliget (!Simk. 211), Orfű „Szuado” (!) — T: Pécs „Mecsek” (Maj.! 26, 41), Mánfa „Mély-” (!K.-Nendtv. 574), „Melegmányivölgy”, Pécs „Lámpás” (!) — Z: Óbánya „Kisújbánya” (Visnya ! apud Horv. PM4 15) — Ma: Fazekasboda (!) — O: Siklós „in puteo”, kútban (Boros BK 1930 77)
12. *Asplenium septentrionale* (L) Hoffm. (Északi fodorka)
M: Pécs „környéke” (Balek ÖBW 1852 14, NV!) — J: (K.-Nendtv. 573, Maj.!), Kövágószőlős (Maj. K. apud Horv. PM2 10), Mecsekalja (Visnya!) — Z: Hosszúhetény (Simk. 211)
13. *A. trichomanes* L. (Aranyos fodorka)
J: Magyarürög „Égervölgy” (!), Abaliget (Kit. 1. 16), „barlang” (!), Orfű „Vízfő”, Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 26, 41.), „Bertalan szikla” (Horv. PK 28. 6), „Mélyvölgy”, „Szkokó” (!) — Z: „Zengővár” (Kit. 1. 18.), Zobák „Hidasi völgy”, Pécsvárad, Püspöknádas (!) — V: Harsány (Kit. 12), Siklós, Máriagyűd „barlang” (Bs.!) — Ma: Geresd (!) — ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 24)
14. *A. ruta-muraria* L. (Kövi fodorka)
T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 26, 41), „Bertalan szikla” (PK 28. 6), „Szaniszló pihenő” (!) — Z: Zobák „Hidasi völgy” (!) — V: Harsány (! Simk. 210), Siklós, Máriagyűd „barlang” (Bs.)
A. Forsteri Sadl. — M: (K.-Nendtv. 573) = *adiantum-nigrum* (Simk. 210)
15. *A. adiantum-nigrum* L. (Fekete fodorka)
J: (!K.-Nendtv. 573, **b. variegatum** Wollaston. Legit: Filarszky), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 41), „Mélyvölgy” (!K.-Nendtv. 573 = **c. argutum** (Kaulf.) Heufl. Borbás MTK 1876 442), „Istenkút” (Horv. PM4 18) — Z: Szászvár „Dobogó” (**c.** Horv. Borbásia I. 95)
16. *Ceterach officinarum* Lam. et DC. (Pikkelyharaszt)
T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 26, 41), „Dömörkapu” (Horv. PCGE 34. 7) — V: Harsány (!RK 590), Máriagyűd (Visnya!), „barlang” (Bs.)
Blechnum spicant (L) Sm. — Ad limites territorii — ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 24), Kaposvár (KH! apud Horv. E. 15.)
17. *Pteridium aquilinum* (L) Kuhn (Ölyvharaszt)
J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj.! 26, 41), Somogy (Bs.) — Z: Máza (!Kit. 1. 25), Hosszúhetény, Püspöknádas (Simk. 211) — Ma: Erdősmecske (Horv. E. 12) — H: Nagytrecsény, Szentbalázs (!) — ZS: Kaposmérő

(Jáv. apud Boros MBL 1924 24), Kaposújlak (Bs.), Kaposvár „Nádasdi erdő”, „Tótfalui erdő”, Töröcske „Rapol” (!) — O: Alsószentmárton (Horv. É. 16), Sellye (!)

18. **Polypodium vulgare** L. (Édesgyökerű páfrány)

J: (!), Orfű „Szuado” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 26. 41.), „Mélyvölgy” (!K.-Nendtv. 574), „Bertalan szikla” (Horv. PK 28. 6) — Z: (Kit. 1. 18) — V: Harsány (Horv. PCGE 34. 7) — Ma: Geresd, Erdősmecske (!) — O: Harkány (Simk. 211)

Osmundaceae — *Osmunda regalis* L. — *Tantum culta!* — Pécs (PM2 3, PCGE 34. 3, 4, 13)

Marsileaceae. Métélyfűfélék.

19. **Marsilea quadrifolia** L. (Métélyfű)

Baranya (Maj. 41, K.-Nendtv. 574) — D: Veresmart (NV! apud Simk. 210), Laskó (l. c.)

Salviniaaceae. Rucaörömfélék.

20. **Salvinia natans** (L) All. (Rucaöröm)

Baranya (!Maj. 41, K.-Nendtv. 574) — O: Gordisa, Harkány, Sellye (Simk. 210), Sellye „Kápolnapusztá” (!) — D: Földvári-tó (Boros MBL 1922 71), Riha-tó (!)

Equisetales. Zsurlók.

Equisetaceae. Zsurlófélék.

21. **Equisetum arvense** L. (Mezei zsurló)

Vulgaris. Közönséges. — **b. ramulosum** Rupr. — O: Lakócsa (!)

22. **E. maximum** Lam. (Óriás zsurló)

Baranya (!Maj. 41) — J: Abaliget, Magyarürög, Szatina (!) — T: Pécs (!Simk. 211), „Lámpás”, Komló, Mánfa „Sikonda”, Magyaregregy, Istenkút (!) — Z: Hosszúhetény (Simk. 211), Váralja-Püspöknádasd (!) — V: Máriagyűd (!) — Ma: Feked (Horv. É. 12), Geresd (!) — H: Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.), Kisvaszar (l. c.), Palé, Högyész (!) — ZS: Kaposújlak (Bs.), Kaposvár (KH!, l. c. 15)

23. **E. palustre** L. (Mocsári zsurló)

Vulgaris. Közönséges. — **b. polystachyum** Vill. — T: Mánfa „Sikonda” (!) — O: Pécs (Maj.!), Dráva (!)

24. **E. limosum** L. (Íszap zsurló)

Baranya (Maj. 41)

25. **E. hiemale** L. (Téli zsurló)

T: Pécs (!Maj. 41), Mánfa „Nagymélyvölgy” (Horv. Borbásia I. 95, f. *fallax* (Milde) Küm. Boros apud Kümmerle MBL 1931 147) — ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Kümmerle MBL 1931 153)

26. **E. ramosissimum** Desf. **b. pannonicum** Kit. (Hosszú zsurló)

Baranya (b. K.-Nendtv. 574) — Z: Hosszúhetény (l. c. 573) — O: Sellye (b. Simk. 211), Harkány (b. Zsák)

Lycopodiales. Korpafűképűek.*Lycopodiaceae.* Korpafűfélék.

27. **Lycopodium clavatum** L. (Kapcsos korpafű)

Ma: Apátvarasd (Horv. Borbásia II 26)

28. **L. complanatum** L. (Lapított korpafű)

J: „Pálirtás” (Simk. 210) — T: Pécs „környéke” (Maj. I 41, NV!), „Kis-rét” (Maj. apud Horv. PM2 11)

Gymnospermae. Nyitvatermők.*Abietaceae.* Fenyőfélék.

29. **Juniperus communis** L. (Közönséges boróka)

Vulgaris in regione montana collinaque. Domb- és hegyvidéken közönséges.

Angiospermae. Zárvatermők.**Monocotyledones.** Egyszikűek.*Typhaceae.* Gyékényfélék.

30. **Typha angustifolia** L. (Keskenylevelű gyékény)

Ma: Villány (Simk. 201) — O: Pécs (Maj. I 39, K.-Nendtv. 568), Gordisa (Simk. 201), Pellérd, Hegyszentmárton, Egerszeg (Kit. 1. 14, 26), Gordisa (**b. media** Schleich. Simk. 201) — D: Dárda, Harsány (Kit. 1. 26, 13)

31. **T. latifolia** L. (Széleslevelű gyékény)

Vulgaris in stagnis. Álló vizekben közönséges.

Sparganiaceae. Békabuzogányfélék.

32. **Sparganium minimum** (Hartm.) Fr. (Lápi békabuzogány)

D: Kopács (Kit. apud N I. 73)

33. **S. erectum** L. (Ágas békabuzogány)

Baranya (Nendtv. 32) — Pécs „környéke” (Maj. I 39, Sz!) — J: Abaliget (!) — Ma: Nagypárad (K.-Nendtv. 572), Palotabozsok (Bs.) — O: Páprád „Bükkhát”, „Kigyós erdő” (!) — D: Dráva (Simk. 201), Riha-tó (!)

34. **S. simplex** Huds. (Egyszerű békabuzogány)

O: Pellérd (Maj. I apud Horv. PM2 6)

Potamogetonaceae. Békaszőlőfélék.

35. **Potamogeton coloratus** Vahl (Színes békaszőlő)

D: Dályok (Janka apud N II 23)

36. **P. natans** L. (Uszó békaszőlő)

Baranya (!Maj. 39) — J: (Simk. 202, Maj. I, Simk. planta secundum

Soó = **b. ovalifolius** Fieb. — **lancifolius** Fieb. MBIM 1934 142), Abaliget (Kit. 1. 16) — ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 25) — O: Kistapolca (Kit. 1. 14) — D: Mohács „Mohácssziget” (Boros MBL 1922 71)

37. **P. nodosus** Poir. (Imbolygó békaszőlő)

O: Kistapolca (Boros! BK 1934 156)

38. **P. perfoliatus** L. (Hinár békaszőlő)

J: (Maj.! apud Horv. PM4 15) — D: Kopács (Simk. 202, **b. cordatus** Rchb., **c. densifolius** Mey. Soó MBIM 1935/6. 225)

39. **P. crispus** L. (Fodros békaszőlő)

J: Jakabhegy (Maj.!) — Ma: Palotabozsok (Boros apud Soó 1. c. 226), Villánykövesd ad Villány (!) — O: Drávasztára, Gordisa (Simk. 202)

40. **P. gramineus** L. ssp. **heterophyllus** Fr. (Felemáslevelű békaszőlő)

D: Kopács (Simk. 202), Dályok (Janka apud N II 23), Mohács „Mohácssziget” (Horv. Borbásia I. 95)

41. **P. lucens** L. (Üveglevelű békaszőlő)

O: Kemse, Drávasztára (**b. acuminatus** (Schum.) Fr. Simk. 202) — D: Mohács „Mohácssziget” (Boros MBL 1922 71), Kácsfalva (Janka apud N II 23), Dályok (**b. l. c. 24**)

42. **P. pectinatus** L. (Fésűs békaszőlő)

Ma: Villány (Simk. 202) — O: Gordisa (Maj.! apud Horv. PM4 15) — D: Kopács (Simk. 202), Kopács „Ódráva” (Simk. apud Soó 1. c. 237)

43. **P. acutifolius** Lk. (Hegyeslevelű békabuzogány)

D: Dályok (Janka apud N II 24)

44. **Zannichellia palustris** L. (Tófonal)

O: Gordisa (Maj.! apud Horv. PM2 6)

Najadaace. Tüskéshinárfélék.

45. **Najas marina** L. (Nagy tüskéshinár)

O: Gordisa (Boros MBL 1924 25) — D: Riha-tó (Boros MBL 1922 71)

46. **N. minor** All. (Kis tüskéshinár)

O: Gordisa, Drávasztára (Simk. 202), Sellye (!) — D: Riha-tó (!Boros MBL 1922 71)

Juncaginaceae. Hutszafélék.

47. **Triglochin palustre** L. (Hutsza)

Baranya (Nendtv. 33, Maj. 39)

Alismataceae. Hidőrfélék.

48. **Alisma plantago-aquatica** L. (Vízi hidör)

Vulgaris. Közönséges.

49. **A. gramineum** Gmel. (Uszó hidör)

O: Sellye (Simk. apud Soó MBIM 1938 139) — D: Laskó, Bélye (1. c.), Kisdárda, Jenőfalva (Zsák)

50. **A. lanceolatum** With. (Lándzsás hidör)

J: Abaliget (Soó) — O: Pécs (Sz!), Harkányfürdő (!) — D: Dárda, Laskó (Simk. 205), Vörösmart (NV!)

51. *Sagittaria sagittifolia* L. (Nyílfü)

O: Pécs „környékén” (Nendtv. 30), Drávaszabolcs (Simk. 205), Gordisa (!), „Ódráva” (Boros MBL 1924 25), Sellye „Kápolnapusztá”, Kákics, Sámod „Bükkhát” (!) — D: Földvári-tó (Boros MBL 1922 71)

Butomaceae. Virágkákafélék.52. *Butomus umbellatus* L. (Virágkaka)

Vulgaris. Közönséges.

Hydrocharitaceae. Békatutajfélék.

Vallisneria spiralis L. — Subspontanea — D: „Mohácssziget” (Horv. Borbásia I 94)

53. *Stratiotes aloides* L. (Kolokán)

O: Pécs „környéke” (NT), Harsány, Gordisa „Ódráva” (!Simk. 203), Sellye „Görü” (Boros MBL 1924 25)

54. *Hydrocharis morsus-ranae* L. (Békatutaj)

Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 203), Villánykövesd (!) — O: Harkány (!), Gordisa (Simk. 203, Maj.!), Sellye „Kápolnapusztá” (!)

Gramineae. Pázsitfűvek.55. *Andropogon ischaemum* L. (Fenyérfű)

Vulgaris. Közönséges.

56. *Chrysopogon gryllus* (L.) Trin. (Élesmosófű)

J: (b. *eriocaulis* (Borb.) Jáv. Horv. Borbásia I. 95) — T: Pécs (!Nendtv. 28) — V: Harsány (!Kit. 1. 12), Beremend (Kit. 1. 28) — Ma: Geresd (Kit. 1. 20) — H: Hőgyész (!) — SZ: „Csatár”, „Bat” (Hollós 93)

57. *Tragus racemosus* (L.) All. (Tövisperje)

T: „Mecsek” (Kit. 1. 23, K.-Nendtv. 567, 671) — V: Harsány (Janka apud N II 5, Simk. 210), Máriagyűd „Tenkes” (Bs.!) — SZ: Bonyhád (Kit. 2. 14)

58. *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Mühlb. (= *humifusa* Rich.) (Apró ujjasmuhar)

T: Pécs „kert” (Maj.!) apud Horv. PM4 13) — O: Sellye, Harkány (!)

59. *D. sanguinalis* (L.) Scop. (Veres ujjasmuhar)

T: Pécs „környéke” (Nendtv. 21), „Lámpás” (Kit. 1. 10) — Z: Pécs-várad (Zsák) — Ma: Nagyrápád „Üszög” (Kit. 1. 7) — H: Bükkösd, Jágónak (Zsák) — SZ: Bonyhád (Hollós 92) — O: Siklós (Zsák) — D: Mohács (Knapp, Zsák)

60. *D. ciliaris* (Retz.) Koel. (Pillás ujjasmuhar)

O: Sellye (!) — (Maj.!) 40. = *humifusa*!)

61. *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. (Kakaslábfű)

Vulgaris. Közönséges. — b. *oryzoides* (Ard.) Fritsch — Ma: Palotabozsok (Boros apud Horv. Borbásia I. 95) — O: Pécs (Boros apud Horv. 1. c.), Sósvertike (Horv. 1. c.), Kákics (!)

62. *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. (Ragadós muhar)

Vulgaris. Közönséges.

63. *S. glauca* (L. p. p.) P. Beauv. (Veres muhar)
Vulgaris. Közönséges.
64. *S. viridis* (L) P. Beauv. (Zöld muhar)
Vulgaris. Közönséges.
- S. italica* (L) P. Beauv. — Culta et subspontanea — Pécs (!Nendtv. 31)
65. *Leersia oryzoides* (L) Sw. (Durca)
J: Abaliget (Kit. apud N I 9) — Z: Váralja (Zóly.) — ZS: Patosfa (Kit. 1. c.) — O: Pécs (PM. It. 142), Nagypeterd (Kit. 1. c.), Kistapolca (Boros BK 1937 99), Drávasztára (Simk. 209) — D: Kisdárda (Knapp), Dárda (Simk. 209)
- Phalaris canariensis* L. — Culta, raro subspontanea — T: Pécs (Maj. 40)
66. *Baldingera arundinacea* (L) Dum. (Pántlikafű)
T: Pécs „környéke” (Nendtv. 28, Maj.! 40) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Villány (Simk. 209) — O: Dráva (!) — D: Laskó (Simk. 209)
67. *Anthoxanthum odoratum* L. (Borjúpázsit)
In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges.
O: Sellye (!Simk. 207), Kákics (!)
68. *Hierochloë odorata* (L) Whlbg. (Máriafü)
T: Pécs (Sz!)
- H. australis* (Schrud) R. et Sch. (= *hirta* (Schrk.) Hay. rectius Borb.)
T: Pécs (Maj.! 40, ex horto Maj.!)
69. *Stipa capillata* L. (Kunkorgó hajka)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 32), „Lámpás”, „Szigeti szőlő” (Kit. 1. 7, 10), „Havihegy” (!) — V: Harsány (!Kit. 1. 12, Simk. 210)
70. *S. pennata* L. (= *Joannis* Cel.) (Arvalányhaj)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 32, Simk. 210) — Z: Pécsvárad (ex verbis Agárdi ornithologi)
71. *Milium effusum* L. (Kásafű)
J: (!Maj.! apud Horv. PM2 11) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj.! 40), „Kisrét”, „Lapis”, Vágot, Komló, Mánfa, Mecsekszabolcs „Árpádtető” (!) — Z: Pécsvárad, Zobák (!) — V: Villány (Simk. 209) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11), Erdősmecske „Alapítványi erdő” (Horv. É. 12), Geresd (!) — H: Palé, Kisvaszar (Horv. É. 13), Lengyel (Jáv.-Zóly.), Nagytterecsény, Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 35), „Csatár”, „Bat” (Hollós 92) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)
72. *Crypsis aculeata* (L) Ait. (Szúrósbajuszfü)
O: Pécs „Megyer” (Maj.! apud Horv. PM2 6)
73. *Heleochoa alopecuroides* (Pill. et Mitterp.) Host (Keskeny bajuszfü)
Ma: Túrony, Szalánta (Kit. 1. 22.) — ZS: Szigetvár „Csértő” (Kit. 2. 14) — O: Gyűd „Büdös tó” (Kit. 1. 14), Drávaszabolcs, Siklós (1. c. 22), Virágos (1. c. 27), Nagypeterd (1. c. 31), Sellye (K.-Nendtv. 567. 570, Simk. 208), Kistapolca-Siklósnagyfalu (Bs.) — D: Beremend (Kit. 1. 27), Bolmány (1. c. 29), Kisdárda (Knapp)
74. *H. schoenoides* (L) Host (Vastag bajuszfü)
O: Kistapolca-Siklósnagyfalu (Bs.), Siklós (Kit. 1. 14) — D: Harsány, ad Dráva (Kit. apud N I 10), Beremend (Kit. 1. 13)

75. *Phleum pratense* L. (incl. *b. nodosum* (L) Schreb.) (Mezei lóperje)
Vulgaris. Közönséges.
76. *Ph. phleoides* (L.) Karsten (Karélyos lóperje)
T: Pécs (!Nendtv. 28), „Szkokó” (!) — V: Harsány (!Kit. 1. 12, Simk. 209) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 92)
77. *Ph. paniculatum* Huds. (Érdes lóperje)
T: Pécs (Simk.! 209) — V: Harsány (Simk.! 209) — Ma: Nagynyárád (Janka apud N II 5)
78. *Alopecurus pratensis* L. (Réti ecsetpázsit)
Vulgaris. Közönséges. — D: Kölked „Beda-erdő” (*b. glaucus* Sond. Horv. Borbásia II 26)
79. *A. geniculatus* L. (Gombos ecsetpázsit)
Baranya (Maj. 40., K.-Nendtv. 566) — O: Sellye (K.-Nendtv. 569) — D: Dárda (Kit. 1. 26)
80. *A. aequalis* Sobol. (Mocsári ecsetpázsit)
Ma: Villány (Simk. 207) — O: Marócsa (!)
81. *Agrostis canina* L. (Ebtippan)
Baranya (Nendtv. 16) — Z: Zengővárkony (!) — V: Kistótfalu-Mária-gyűd (!) — O: Bükkhát (Kit. 1. 16) — D: Mohács (!)
82. *A. capillaris* L. (= *tenuis* Sibth.) (Cérna tippan)
Baranya (Nendtv. 16) — J: Mecsekalja (!) — T: Pécs (Simk. 207) — Z: Püspöknádasd (l. c.) — V: Villány (l. c.) — Ma: Geresd (!) — O: Páprád, Sósvertike (!), Sellye (Nendtv. apud Simk. 207)
83. *A. alba* L. (Fehér tippan)
Vulgaris. Közönséges. — *b. silvatica* Host (= *gigantea* (Gaud.) Mey.) — V: Villány (Simk. 207) — *c. coarctata* (Hoffm.) Rchb. — T: Pécs (Simk. 207) — V: Villány (Simk. 207) — *d. prorepens* Koch — J: Abaliget (Boros apud Horv. Borbásia I. 95) — Z: Szászvár „Dobogó” (Horv. 1. c.)
A. Schultesii Kunth — Baranya (NT) = *capillaris* et *alba* (secundum exemplar originale de Sellye Simk. 207)
A. verticillata Villars. — Pécs „környéke” (NT) erroneo publicata (Horv. PM4 18)
84. *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth (Siska nádtippan)
Vulgaris. Közönséges.
85. *C. canescens* (Web.) Roth (Dárdás nádtippan)
Pécs „környéke” (Maj.! apud Horv. PM2 6)
86. *C. pseudophragmites* (Hall. f.) Koel. (Parti nádperje)
D: Mohács „Cigánysziget” (Palik in MAN 54)
87. *Apera spica venti* (L) Beauv. (Széltippan)
T: Pécs „környéke” (Maj.!) — V: Villány (Simk. 207) — H: Baranya-jenő (!) — O: Siklós, Magyarbóly, Alsócún (Zsák) — D: Jenőfalva (Zsák)
88. *Holcus mollis* L. (Lágy selyemperje)
Baranya (Maj. 40) — Z: Hosszúhetény (Simk. 209) — O: Pécs „Megyer” (Maj.!)
89. *H. lanatus* L. (Pelyhes selyemperje)
J: Kővágószőlős (Simk. 209), Abaliget (!) — T: Pécs (!Nendtv. 24), „Lámpás” (Kit. 1. 7), „Istenkút” (!) — Z: Szászvár „Dobogó”, Zobák „Hidasi völgy” (!) — V: Villány (Simk. 209) — Ma: Nagyárpád (!) — O: Pécs „Megyer” (Maj.), Harkány (!)



90. *Aira caryophylla* L. (Szegfűs nápic)
Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 566) — J: Kővágószőlős (Simk. 207),
Mecsekalja (!) — O: Sellye (K.-Nendtv. 569), Harkány (Simk. 207) — D:
Mohács (Knapp)
91. *A. capillaris* Host (Hajszálvékony nápic)
J: (!FEH Jávorka et Kümmerle 699), Magyarürög (Sz!), Mecsekalja (!)
— T: Pécs (Simk. 207, Maj.!) — Z: Zengővárkony, Szászvár „Dobogó” (!)
— V: Harsány, Máriagyüd (Simk. 207) — Ma: Erdősmecske (!)
92. *Corynephorus canescens* (L) Beauv. (Pákhordó)
Baranya (Nendtv. 16. Maj.!) — J: (Maj. K. apud Horv. PM2 11) — Z:
Zengővárkony (!) — Ma: Geresd (!)
93. *Deschampsia flexuosa* (L) Trin. (Sédbúza)
Baranya (Maj. 40)
94. *D. caespitosa* (L.) Beauv. (Imolafű)
In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken kö-
zönséges.
95. *Trisetum flavescens* (L) P. Beauv. (Aranyzab)
Baranya (Nendtv. 18) — V: Máriagyüd (Simk. 208)
96. *Ventenata dubia* (Leers) F. Schltz. (Vékony zab)
Baranya (Maj. 40.) — T: Pécs (Kit. apud N I 17) — Z: Kárász (Kit.
1. 26) — Ma: Birján, Hidas (Janka apud N II 6) — SZ: Zsibrik, Palatinca
(Hollós 92) — SZ: Szentlászló (Kit. 2. 14)
97. *Avena fatua* L. (Héla zab)
Baranya (Nendtv. 18)
98. *Avenastrum pubescens* (Huds.) Jess. (Pelyhes zabfű)
Baranya (Nendtv. 18) — T: Mánfa (Soó)
99. *A. pratense* (L) Jess. (Réti zabfű)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 18, Maj.!, Simk. 207, Kit. 1. 7) — V:
Máriagyüd (Simk. 207) — Ma: Nagyárpád (Simk. 207)
- A. versicolor* (Vill.) Fritsch — Baranya (Maj. 40) erroneo publicatum
(K.-Nendtv. 564)
100. *Arrhenatherum elatius* (L) Presl. (Francia perje)
T: Pécs (!Maj! 40) „Lámpás”, „Istenkút”, Mánfa (!) — Ma: Fazekas-
boda, Áta (!) — SZ: Szekszárd, Bata (Hollós 92) — D: Mohács (!)
101. *Cynodon dactylon* (L) Pers. (Csillagpázsit)
Vulgaris. Közönséges.
102. *Phragmites communis* Trin. (= vulgaris (Lam.) Crép.) (Fedő nád)
Vulgaris. Közönséges.
103. *Sieglingia decumbens* (L) Bernh. (Háromfog)
J: Kővágószőlős (Simk. 208)
104. *Diplachne serotina* (L) Lk. (Kései perje)
J: Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!PM. It. 143) — V: Harsány (!Kit.
1. 23, Simk. 208), Máriagyüd „Tenkes” (Bs.)
105. *Molinia coerulea* (L) Mnch. (Kék perje)
O: Siklós (Kit. 1. 14) — b. major Roth — T: Pécs (Simk. 209, Maj.!) —
O: Sellye (Simk. 209)
106. *Eragrostis pilosa* (L) Beauv. (Szörös tőtippán)
Vulgaris. Közönséges.

107. *E. minor* Host (Apró tötippan)

J: (Kit. 1. 6), Abaliget (Bs.) — T: Pécs (!Kit. 1. 15., Maj. 40), „Szkoko” (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17.) — Ma: Túrony (1. c. 15), Nagypall, Kozármisleny (1. c. 20, 10) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 92) — ZS: Szigetvár „Turbék” (Kit. 1. 4.) — O: Beremend (1. c. 27), Bolmány (1. c. 29), Drávaszabolcs (1. c. 14), Magyarbóly (Zsák) — D: Mohács (Knapp)

108. *E. cilianensis* (All.) Vignolo-Lutati (= *megastachya* (Koel.) Lk.) (Nagy tötippan)

J: Kővágószőlős (Simk. 208), Boda (!) — T: Pécs „környéke” (Maj.!) — V: Máriagyűd (Bs.!) — Ma: Somberek (Zsák), Olasz, Németbóly (!) — H: Vásárosdombó (RK. 591, Kit.!) apud Jáv. AMNH 1935 62) — O: Sellye (Simk. 208), Siklós (RK. 591, Kit.!) apud Jáv. 1. c.)

109. *Koeleria glauca* (Schk.) DC. (Deres fényperje)

V: Máriagyűd „Tenkes” (Horv. PM2 7)

110. *K. gracilis* Pers. (Karcú fényperje)

Vulgaris. Közönséges. — T: Pécs „Mecsek” (a. *colorata* Heuff. Horv. PM4 13) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (b. *pallida* Uechtritz Bartal 35)

K. phleoides (Vill.) Pers. — Baranya (Maj. 40) erroneo publicata (Horv. PM4 16)

111. *Catabrosa aquatica* (L.) Beauv. (Forrásperje)

J: Kővágószőlős (Simk. 209) — T: Pécs (!Simk. 209, Maj.!), „Istenkút” (!)

112. *Melica ciliata* L. (Prémes gyöngyperje)

J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 10 25, Kit. 1. 6.) — V: Harsány (!Kit. 1. 12, Simk. 209)

113. *M. transsilvanica* Schur (Erdélyi gyöngyperje)

T: Pécs (Horv. PM2 7), „Tettye” (Soó) — Z: Zengővárkony, Pécsvárad (!) — V: Harsány (!) — SZ: Szekszárd „Remete” (Bartal 35)

114. *M. altissima* L. (Magas gyöngyperje)

Baranya (Maj. 25, 40, Kit.!) apud Jáv. AMNH 1934 158) — J: Mecsekalja (!), Magyarürög (Bs.) — T: Pécs (PM. It. 142, NV!), „Makár” (!Maj.!, Horv. PM4 15), „Lámpás” (Kit. 1. 7.) — Z: Pécsvárad (!Janka ÖBZ 1867 64) — Ma: Püspöklak (Kit. 1. 21), Geresd (1. c. 23), Nagynyárad (Janka apud N II 7)

115. *M. uniflora* Retz. (Egyvirágú gyöngyperje)

J: (!) — T: Pécs (!Nendtv. 26., Kit. 1. 7) „Lapis” etc. (!) — Z: Pécsvárad, Váralja-Püspöknádasd (!) — V: Harsány (!) — Ma: Görcsöny (!), Villánykövesd, Erdősmecske „Alapítványi erdő” (Horv. É. 11, 12) — H: Bakóca, Palé, Kisvaszar (Horv. É. 13), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.), Szentbalázs (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 92), „Sötétvölgy” (+ b. *autumnalis* A. et G. Bartal 35), „Gurovica” (Bs.) — ZS: Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O: Marócsa (!)

116. *M. nutans* L. (Bókoló gyöngyperje)

T: Pécs (Maj. 40, Maj.!) = *uniflora*, Simk. 209, Kit. 1. 7 = *uniflora*) — Z: Zobák „Hidasí völgy” (!) — SZ: Szekszárd „Bat” Hollós (MBL 1914 57) — ZS: Szenttamás „Cserhegy” (Kit. 2. 14)

117. **Briza media** L. (Rezgőpázsit)
Vulgaris. Közönséges.
B. maxima L. — Pécs (NT) = *media* (secundum exemplar originale NT, Janka apud N II 7)
118. **Dactylis glomerata** L. (Csomós ebir)
Vulgaris. Közönséges. — **ssp. Aschersoniana** Gräbn. — J: (!Horv. Borbásia I 95), Abaliget (Bs. Horv. I. c.) — Ma: Feked (Horv. E. 12) — H: Kisvaszar (I. c. 13), Högyész (!) — O: Alsószentmárton (Horv. Borbásia I 95)
119. **Cynosurus cristatus** L. (Cincor)
J: (!), Kővágószőlős (Simk. 208), Vöröshegy, Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 21) — Z: Püspöknádasd (Simk. 208), Máza (Kit. 1. 25) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — O: Sellye (Simk. 208), Kákics (!)
120. **Sclerochloa dura** (L.) Beauv. (Kőperje)
T: Pécs „környéke” (Maj. 40), „Szkokó (!) — Z: Hosszúhetény (!)
121. **Poa pratensis** L. et **v. angustifolia** (L.) Sm. (Réti perje)
Vulgaris. Közönséges.
122. **P. trivialis** L. (Sovány perje)
Vulgaris. Közönséges.
123. **P. annua** L. (Nyári perje)
Vulgaris. Közönséges.
124. **P. compressa** L. (Laposszárú perje)
J: (!Kit. 1. 8.) — T: Pécs (!Nendtv. 28), „Kantavár” (Kit. 1. 9), „Szkokó” (!) — Z: (!) — V: Villány (Simk. 305), Harsány (Bs.) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14)
125. **P. bulbosa** L. (incl. **b. monstr. crispa** Thuill.) (Gumós perje)
Vulgaris. Közönséges.
126. **P. nemoralis** L. (Ligeti perje)
J: Mecsekalja (!, **b. agrostoides** A. et G. Soó) — T: Pécs (!Nendtv. 28), „Kantavár” (!Kit. 1. 9), „Lapis” (**b.** Soó) — Ma: Geresd (**b.** Horv. Borbásia II 26), Erdősmecske (Horv. E. 12), Hercegszabar (!) — H: Kisvaszar (I. c. 13), Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (**c. tenella** Rchb. Bartal 36) — ZS: Kaposvár (KH!)
127. **P. palustris** L. (Mocsári perje)
Baranya (Nendtv. 28) — Ma: Villány (Simk. 209) — O: Sellye (I. c.) — D: Mohács (MAN 253)
128. **Glyceria maxima** (Hartm.) Holmbg. (= **aquatica** (L.) Wahlbg.) (Vízi harmatkása)
Vulgaris. Közönséges.
129. **G. fluitans** (L.) R. Br. (Parti harmatkása)
T.: Pécs (Nendtv. 23, Simk. 209) — O: Drávaszabolcs (!Kit. 1. 14), Páprád „Bükkhát”, Czinderybogád (!) — D: Dárda (Simk. 209)
130. **G. plicata** Fr. (Fodros harmatkása)
T: Komló, Mecsekrákos-Orfű (!) — Ma: Fazekasboda (Horv. Borbásia I 94)
131. **Puccinellia distans** (Jacq.) Parl. (Mézpázsit)
O: Pécs „környéke” (Maj. I apud Horv. PM2 6) Olim. Egykor.
132. **Festuca glauca** Lam. (Deres csenkesz)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22, Kit. 1. 6) — V: Harsány (I. c. 12)

133. **F. valesiaca** Schleich. (Vékony csenkesz)
J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (Maj.! apud Horv. PM2 6)
134. **F. pseudovina** (Hack.) Nym. (Juhcsenkesz)
T: Pécs „Mecsek” (Maj.! apud Horv. PM2 6) — SZ: Mórágý (Hollós 92), Szekszárd „Remete” (**b. angustiflora** A. et G. Bartal 36)
135. **F. sulcata** (Hack.) Richt. (Barázdás csenkesz)
T: Pécs „Mecsek” (!Kit. 1. 6, PCGE 37. 19, **b. rüpicola** Heuff. Maj.! apud Horv. PM4 16, **c. hispida** Hack. Horv. Borbásia II 26) — V: Harsány (!) — Z: Hosszúhetény, Püspöknádasd (!) — Ma: Feked (Horv. É. 12), Baksa (!) — SZ: Szekszárd (Bartal 36)
136. **F. heterophylla** Lam. (Felemás levelű csenkesz)
Baranya (!Maj. 40) — T: Pécs „Mecsek”, „Lámpás” (!) — Z: Hosszúhetény (Simk. 208) — Ma: Geresd (!) — H: Högyész, Bakóca (!)
137. **F. rubra** L. (Pirosló csenkesz)
Baranya (Nendtv. 22) — T: Pécs (Simk. 209) — Z: Püspöknádasd, Hosszúhetény (1. c.) — O: Pécs „Megyer” (Maj.!)
138. **F. gigantea** (L.) Vill. (Óriás csenkesz)
J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj.! 40), „Kantavár” (Kit. 1. 9, Maj. K.), „Daindol” (Kit. 1. 8) — Z: (Kit. 1. 18) — V: Harsány (Simk. 209) — Ma: Borjád (Horv. É. 11), Feked „Alapítványi erdő” (1. c. 12) — H: Kisvaszar (1. c.) — SZ: Szekszárd „Haramia-kút” (Hollós MBL 1914 57) — O: Alsószentmárton (!)
139. **F. arundinacea** Schreb. (Nádképű csenkesz)
J: (!), Kővágószőlős (Simk. 208), Abaliget, Mecsekalja, Bükkösd, Magyarürög „Égervölgy”, Vöröshegy (!) — T: Pécs (Maj. K., Simk. 208) — Z: Püspöknádasd (Simk. 208), Szászvár „Dobogó” (!) — V: Villány, Harsány (Simk. 208) — H: Kisvaszar, Palé (Horv. É. 12, 13) — SZ: Szekszárd (Hollós MBL 1914 57) — O: Siklós (RK 591, Kit.! apud Jávorka AMNH 1929 135)
140. **F. pratensis** Huds. (Réti csenkesz)
Vulgaris. Közönséges.
141. **F. drymeia** M. et K. (= **montana** M. B.) (Hegyi csenkesz)
J: Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 208), „Kantavár” (1. c.) — Z: (1. c.), Püspöknádasd (1. c.) — Ma: Erdősmecske (!)
F. aspera Mutel. — Introducta. — Pécs (Horv. PM2 9)
?? *F. amethystina* L. — ZS: Csertő (Kit. apud N I 24)
F. ovina L. — Pécs „környéke” (Nendtv. 22, Maj.! 40) = *valesiaca* et *pseudovina* (Horv. PM2 6)
F. duriuscula L. — Pécs „környéke” (Nendtv. 22, Maj.! 44, Simk.! 209) = *sulcata* et *valesiaca* (!)
F. geniculata Willd. — Baranya (NT) erroneo publicata (Horv. PM4 18)
142. **Vulpia myurcs** (L.) Gmel. (Egércsenkesz)
Baranya (Kit. apud N I 23, K.-Nendtv. 565) — J: (!Simk. 209, Kit. 1. 8), Abaliget (1. c. 16), Kővágószőlős, Mecsekalja (!) — T: Pécs (!Maj. 40), „Szkokó” (!) — Z: Szászvár (!) — V: Harsány, Máriagyűd (Simk. 209) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36) — O: Kákics (!)

143. **Bromus secalinus** L. (Gabonarozsnok)
T: Pécs „környéke” (Nendtv. 18), „Makár” (Maj.!) — V: Villány (Simk. 208) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15) — O: Páprád (!)
144. **B. arvensis** L. (Mezei rozsnok)
T: Pécs (!Nendtv. 18, Maj.!) — V: Harsány, Villány (Simk. 208) — Ma: Feked (!) — SZ: Bonyhád (Hollós 92) — O: Szigetvár (Kit. 1. 4), Sellye (Simk. 208)
145. **B. racemosus** L. (Fürtös rozsnok)
Baranya (Nendtv. 18) — J: Abaliget (!)
146. **B. mollis** L. (= **hordeaceus** L.) (Puha rozsnok)
Vulgaris. Közönséges. — **b. simplicissimus** A. et G. — SZ: Szekszárd (Bartal 36)
147. **B. commutatus** Schrad. (Réti rozsnok)
Baranya (NT, K.-Nendtv. 566) — J: Abaliget (Bs.) — Z: Hosszúhetény (Simk. 208) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15)
148. **B. squarrosus** L. (Berzedt rozsnok)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 18, Maj.!, Kit. 1. 7.) — V: Harsány (!Kit. 1. 12., Janka apud N II 9, Simk. 208) — **ssp. typicus** Pén. — V: Harsány (Pénzes BK 1936 129) — **ssp. danubialis** Pén. — V: Harsány (Pénzes 1. c. 131, **b. wolgensis** Jacq. Simk. 208)
149. **B. japonicus** Thung. (Japán rozsnok)
T: Pécs „Mecsek” (Horv. PM2 7) — Ma: Fazekasboda (!) — **ssp. sub-squarrosus** (Borb.) Degen — V: Harsány (Pénzes 1. c. 119)
150. **B. ramosus** Huds. (Erdei rozsnok)
T: Pécs „Mecsek” (!), „Daindol”, „Lámpás” (Kit. 1. 7, 8) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Harsány (!Simk. 208) — Ma: Borjád (Horv. É. 11), Hercegszabar (!), Hercegtöttös, Erdősmecske „Alapítványi erdő” (Horv. É. 11, 12) — H: Högyész (!), Kisvaszar (Horv. É. 13) — SZ: Szekszárd „Haramia-kút” (Hollós MBL 1914 57) — ZS: Szentlászló, Gálosfa (Kit. 2. 14, 15), Kaposszerdahely „Rapol” (!)
ssp. Benekeni (Lge.) Hay. — J: Mecsekalja-Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (Soó apud Horv. PM4 13) — V: Harsány (Soó) — SZ: Szekszárd „Óriás-h.” (Bs.)
151. **B. inermis** Leyss. (Árva rozsnok)
J: Mecsekalja (!) — T: Pécs (!Maj.!, 40, K.-Nendtv. 566), „Istenkút” (!) — V: Harsány (Simk. 208) — Ma: Fazekasboda (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 92) — O: Sellye (!) — D: Mohács—Riha-tó (!)
152. **B. erectus** Huds. (Sudár rozsnok)
T: Pécs „Mecsek” (!Kit. 1. 7, 23, Nendtv. 22, **b. reptans** Borb. Horv. Borbásia II 26) — Ma: Áta (!) — V: Harsány (!, **c. villosus** M. et K. Simk. 208) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 92)
ssp. pannonicus (Kumm. et Sendtn.) A. et G. — T: Pécs „Mecsek” (!Jávorka: Magyar Flóra 108) — V: Harsány (!Bs.)
153. **B. rigidus** Roth **ssp. maximus** Desf. (Óriás rozsnok)
Baranya (Soó in Jávorka: A magyar flóra kis határozója 2. k. 38) — V: Harsány (**b. Gussonei** Parl. cum typo Soó)
154. **B. sterilis** L. (Meddő rozsnok)
Vulgaris. Közönséges.

155. **B. tectorum** L. (Fedél rozsnok)

Vulgaris. Közönséges.

156. **Brachypodium silvaticum** (Huds.) R. et Sch. saepius **b. villosum** Lej. et Court. (= **dumosum** (Vill.) Beck) (Erdei szálkaperje)

Vulgaris in regione montana collinaque. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Páprád „Bükkhát”, „Kígyós, Cseri erdő”, Sellye (!)

157. **B. pinnatum** (L) Beauv. (Tollas szálkaperje)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 33, **b. rupestre** Host R. et Sch. Simk. 208, **c. caespitosum** Host R. et Sch. NT, K.-Nendtv. 566) — V: Villány, Vokány „Terentás” (**c.** Simk. 208)

Nardus stricta L. — M: (Maj. 41) erroneo publicata ex Baranya (K.-Nendtv. 564)

158. **Lolium perenne** L. (Angol perje)

Vulgaris. Közönséges. — **b. tenue** (L) Schrad. — O: Harkány (Simk. 209)

159. **L. multiflorum** Lam. (= **aristatum** (Willd.) Lag.) (Olasz perje)

T: Pécs „Kismélyvölgy” (Simk. 209) — V: Villány (1. c.) — Ma: Palotabozsok (Bs.) — H: Ujdombóvár (Lengyel: A magyar lucernamag . . 49)

160. **L. temulentum** L. (Szédítő vadóc)

T: Pécs „környéke” (Nendtv. 25) — H: Bükkösd (Zsák)

161. **Agropyron cristatum** (L) Gärt. (Taréjos búza)

Baranya (Maj. 41)

162. **A. repens** (L) Beauv. (Tarackbúza)

Vulgaris. Közönséges. — SZ: Szekszárd (**b. arvense** Rchb. Bartal 36)

163. **A. caninum** (L) R. et Sch. (Bolond búza)

T: Pécs „Daíndol” (Kit. 1. 8), „Szkokó” (!) — V: Villány (Simk. 210) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14)

164. **A. intermedium** (Host) Beauv. (Deres tarack)

T: Pécs „Mecsek” (NT, Kit. apud N I 28, Simk. 210, **b. arenicolum** (Kern.) Jáv. Horv. Borbásia I 95), „Tettye” (Soó) — V: Harsány (Simk. 210, Soó) — SZ: Szekszárd (Hollós 92) — O: Kákics (!)

A. junceum (L) Beauv. — Baranya (Nendtv. 33) = **repens** (K.-Nendtv. 407)

A. elongatum (Host) Beauv. — Baranya (Nendtv. 33) erroneo publicatum (Horv. PM4 16)

?? **Secale silvestre** Host — Baranya (Nendtv. 31)

165. **Hordeum murinum** L. (Egérárpa)

Vulgaris. Közönséges. — **b. intermedium** Beck — SZ: Szekszárd „Remete” (Bartal 36 secundum Degen MBL 1910 379)

Hordeum nodosum L. — Introductum — Pécs (Balek apud Skofitz ÖBW 1853 131, Maj. 41 apud Horv. PM2 3)

? **H. maritimum** Wiht. — D: Dályok (Janka apud N II 10) transiens in **H. Gussoneanum**?

166. **Elymus europaeus** L. (Európai hajperje)

J: Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (Maj. 41), „Remeterét” (Simk. 208) — Z: Szászvár „Dobogó” (!) — SZ: Szigetvár-Szenttamás (Kit. 2. 14)

• *Cyperaceae*. Sásfélék.

167. *Pycnus flavescens* (L) Rchb. (Sárgás palka)
O: Pécs (Nendtv. 21, Maj!), Sellye (Simk. 206) — D: Dárda, Petárda (Kit. 1. 26, 29), Kisdárda (Knapp)
168. *Duvaljouvea serotina* (Rottb.) Palla (Őszi palka)
Baranya (K.-Nendtv. 566, 567, Kerner injuste dubitat) — D: Kisdárda (Knapp), Dárda (Simk. 206), Jenőfalva (Zsák!)
169. *Cyperus fuscus* L. (Barna palka)
O: Pécs „környéke” (Nendtv. 21), Pellérd (Maj!), Máriagyüd, Sellye (Simk. 206), Gordisa „Ódráva” (Boros MBL 1924 27) — D: Dárda, Petárda (Kit. 1. 26, 29), Kisdárda (Knapp), Jenőfalva (Zsák!)
170. *Chlorocyperus glomeratus* (L) Palla (Csomós palka)
O: Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 566, 567 Kerner injuste dubitat), Gordisa (Boros 1. c. 27, NV!), Harkányfürdő (Boros BK 1937 98) — D: Dárda (Kit. 1. 29), Kisdárda (Knapp), Laskó (Simk. 206)
171. *Ch. longus* (L) Palla (Hosszú palka)
O: Máriagyüd „Büdös-tó” (Boros! BK 1937 98), Pécs „Balokány” (!)
Trichophorum austriacum Palla — Baranya (Nendtv. 31) = *Heleocharis palustris* (K.-Nendtv. 565)
172. *Eriophorum latifolium* Hoppe (Széleslevelű gyapjúsás)
Baranya (Nendtv. 22) — J: Abaliget (!) — Ma: Áta (!)
173. *E. polystachyon* L. (Keskenylevelű gyapjúsás)
ZS: Cserénfa (!) — O: Pécs „környéke” (!Maj. 39), „Megyer” (Maj.), „Jankovich-telep” (!), Komló (!)
E. vaginatum L. — Pécs (Maj.!) est, ut scheda demonstrat de Pécs? (Horv. PM2 3)
174. *Schoenoplectus supinus* (L) Palla (Henyé káka)
O: Sellye (Simk. 207), Magyarürög (!) — D: Dárda (Simk. 207), Mohácssziget (Boros MBL 1922 71)
175. *Sch. lacustris* (L) Palla (Tavi káka)
Vulgaris. Közönséges.
176. *Sch. mucronatus* (L) Palla (Szúros káka)
O: Sellye „Kenderrét” (Simk. 206) — D: Dárda (1. c.)
177. *Sch. triqueter* (L) Palla (Háromélű káka)
Ma: Villány (Simk. 207) — O: Pécs „környéke” (Maj. 39), Sellye (Simk. 1. c.) — D: Karapancsa (Tuzson BK 1914 139)
178. *Holoschoenus vulgaris* Lk. (Szürke káka)
O: Pécs „környéke” (Maj. 39) — D: Dárda, Baranyavár (Simk. 207)
179. *Dichostylis Micheliana* (L) Nees. (Iszap káka)
O: Pécs „környéke” (NT), Dráva (NV!), Gordisa (Boros MBL 1924 27, Maj.!), Sellye (Simk. 207) — D: Laskó (1. c.), Dárda, Petárda (Kit. 1. 26, 29), Mohácssziget (Boros MBL 1922 27), Jenőfalva (Zsák!)
180. *Scirpus silvaticus* L. (Erdei káka)
J: Hetvehely (!) — T: Pécs „környéke” (!Nendtv. 31), „Kismélyvölgy” (Simk. 207), „Kantavár” (Kit. 1. 9), Mánfa, Istenkút, Mánfa „Sikonda” (!) — Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 207) — H: Palé (!) — O: Pécs „Megyer” (Maj.!), Máriagyüd (!)

181. *Bulboschoenus maritimus* (L) Palla (Zsióka)
Baranya (Nendtv. 31, Maj.!) — J: Abaliget (!) — O: Páprád (! **b. laxiflorus** A. et G.) — D: Dárda (Simk. 207)
182. *Heleocharis acicularis* (L) R. Br. (Apró csetkáká)
Dráva (Simk. 206) — O: Pécs „környéke” (Maj. 39), Gordisa (Boros MBL 1924 28) — D: Mohácssziget (l. c. 1922 71)
183. *H. soloniensis* (Dubois) Mansf. (= **ovata** (Roth) R. Br.) (Tojásdad csetkáká)
O: Sellye „Kápolnapusztá” (Simk. 207)
184. *H. palustris* (L) R. Br. (Árva káká)
Vulgaris. Közönséges.
185. *Carex appropinquata* Schum. (= **paradoxa** Willd.) (Rostostövű sás)
O: Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 566), Sellye (Horv. Borbásia I 98)
186. *C. paniculata* L. (Buglyos sás)
T: Pécs „Kismélyvölgy” (Simk. 205)
187. *C. vulpina* L. (Róka sás)
Vulgaris. Közönséges. — **b. tenuior** Ledeb. — Ma: Villány (Simk. 206)
— O: Pécs „környéke” (*C. cuprina* Nendtv. (NT) = **b.** Sellye „Endespusztá” (Simk. 206)
188. *C. muricata* L. (= **contigua** Hoppe) (Sulymos sás)
J: (Simk. 205) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 19) — V: Harsány (!Bs.) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 93), „Haramia-kút” (idem MBL 1914 58) — O: Magyarbóly (Zsák)
189. *C. Pairaei* F. Schlitz. (Berzedt sás)
T: Pécs „Mecsek” (Soó) — Ma: Ata (Horv. PM2 7)
190. *C. divulsa* Stokes (Zöldes sás)
J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 40, Simk. 205, 206), „Mélyvölgy” (Maj. 1 apud Horv. PM4 15), „Kozárvadászház”, Mánfa „Sikonda” (!) — Z: (!), Pécsvárad (!) — V: Harsány (!), Villány (Simk. 205, 206) — Ma: Baksa, Szalánta-Túrony, Görcsöny (!), Villánykövesd, Erdősmecske (Horv. É. 11, 12) — H: Kisvaszar (l. c.), Bakóca, Nagytrecsény, Hőgyész (!), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36) — ZS: Töröcske „Rapol” — O: Harkány (!)
191. *C. praecox* Schreb. (Korai sás)
Vulgaris. Közönséges.
192. *C. brizoides* L. (Rezgő sás)
Ma: Hercegszabar (!) — O: Marócsa, Magyarmecske (!)
193. *C. leporina* L. (Nyúl sás)
J: Kővágószőlős (Simk. 205) — T: Pécs „környéke” (Maj.!) — Z: Püspöknádasd (Simk. 205)
194. *C. remota* L. (Ligeti sás)
J: Kővágószőlős (Simk. 206), Abaliget, Mecsekalja (!) — T: Pécs „környéke” (Maj. 40), „Kantavár” (Kit. 1. 10) — Z: Szászvár „Dobogó” (!) — H: Kurd-Lengyel (Jáv.-Zóly.), Palé (Horv. É. 13) — SZ: Szekszárd „Haramia-kút” (Hollós MBL 1914 57) — ZS: Szenttamás „Cserhegy” (Kit. 2. 14) — O: Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 16), Sámod, Harkány, Marócsa (!)
(*C. echinata* Murr. — Harkány (Horv. PM4 13) = *divulsa*)

195. *C. gracilis* Curt. (Éles sás)
Baranya (Nendtv. 19) — T: Komló (!) — O: Pécs „Megyer” (Maj.!)
196. *C. elata* Bell. (= *Hudsonii* A. Benett) (Zsombék sás)
Baranya (Maj. 40., K.-Nendtv.) — D: Kölked (!)
197. *C. flacca* Schreb. (= *glauca* Murr.) (Deres sás)
J: Orfű „Szuado”, Kővágószőlős (!), Mecsekalja (!, *b. melanostachya* Uechtr.) — T: Pécs „Mecsek” (!K.-Nendtv. 566, Maj.!, Cyp. Hung., *b. Horv. Borbásia* I. 95, *c. dinarica* Heuff.), Szentkút (!) — Z: Váralja-Püspöknádasd (!) — Ma: Nagypárad (Simk. 205) — H: Bakóca, Kisvaszar (*b. Horv. É. 13, 12*) — SZ: Szekszárd (*d. erythrostachys* Schur Hollós MBL 1914 57) — O: Szentegát (!)
198. *C. pallescens* L. (Sápadt sás)
Baranya (Nendtv. 19) — J: (Simk. 205), Orfű „Szuado” (!) — T: Pécs „Mecsek” (Simk. 205)
199. *C. tomentosa* L. (Molyhos sás)
Pécs „környéke” (Nendtv. 19, Maj.!, Simk. 206) — V: Villány (1. c.) — O: Marócsa, Gilvánfa (!)
200. *C. montana* L. (Hegyi sás)
T: Pécs (Maj. 39, Simk. 205) — V: Harsány (1. c.) — Ma: Baksa (!)
201. *C. liparicarpos* Gaud. (= *nitida* Host) (Fényes sás)
V: Harsány (Simk. 205, Soó) — SZ: Szekszárd, Szálka (Hollós 93) — O: Harkány (!)
202. *C. pendula* Huds. (Lecsüngő sás)
J: (!Bs.), Magyarürög „Égervölgy” (!) — T: Pécs „Mecsek” (Maj. 39, Simk. 205, NV!), „Mélyvölgy” (Maj.!, apud Horv. PM4 15), „Jezervölgy” (Maj. K. apud Horv. PM2 11), „Kantavár” (Kit. 1. 10) — Z: Hosszúhetény, Püspöknádasd (Simk. 205), Zobák, Püspökszentlászló (!) — Ma: Fazekasboda (!) — H: Kisvaszar, Palé (Horv. É. 12, 13), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — O: Páprád „Tilos erdő”, „Bükkhát” (Horv. É. 16)
203. *C. caryophyllea* Latour. (Tavaszi sás)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 19, Simk. 206) — V: Harsány (1. c.) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 93), „Sötétvölgy” (idem MBL 1914 58)
204. *C. humilis* Leyss. (Lappangó sás)
T: Pécs „Mecsek” (Simk. 205, Horv. PCGE 34, 10)
205. *C. digitata* L. (Ujjas sás)
J: Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19), „Dömörkapu”, „Lámpás”, Pécsbudafa (!) — Z: (!), Váralja (Zóly.) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11.) — H: Palé (1. c. 13), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — ZS: Kaposújlak (Boros VSZ 1936 83)
? *C. pedata* L. (= *ornithopoda* Willd.) — T: Pécs (Maj.!, apud Horv. PM2 6, bene determinata, de Pécs?)
? *C. alba* Scop. — O: Gordisa (1. c., bene determinata, de Gordisa??)
206. *C. panicea* L. (Muhar sás)
V: Pécs „Mecsek” (Maj.!, Simk. 205) — V: Máriagyűd (1. c.)
207. *C. silvatica* Huds. (Erdei sás)
J: (Bs.) Orfű „Szuado” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19, Cyp. Hung.), „Bányatelep”, „Lapis”, „Lámpás” (!) — Z: (!), Zobák — V: Harsány (Soó) — Ma: Hercegszabar, Nemetpalkonya (!) — H: Palé (Horv. É. 13),

Lengyel (Jáv.-Zóly.), Högyész, Nagytterecsény, Vaszar (!) — SZ: Szekszárd „Bükk”, „Haramia-kút” (Hollós MBL 1914 57), „Óriás-h.” (Bs.) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 11.), Töröcske „Rapol” (!) — O: Marócsa, Sellye, Alsószentmárton (!)

208. *C. strigosa* Huds. (Borostás sás)

T: Pécs „Kismélyvölgy” (Simk. 206, NV!)

209. *C. Michellii* Host (Micheli-sás)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19, Simk. 205) — Z: Magyaregregy „Márévár” (Kit. 1. 25), Váralja-Püspöknádasd (!) — V: Villány (Simk. 205) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36), „Gurovica”, „Bat” (Hollós 1914 58)

210. *C. pilosa* Scop. (Szörös sás)

J: Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19, Simk. 206), „Dömörkapu”, „Kisrét”, „Istenkút”, „Bányatelep”, Pécsbudafa (*b. glabrata* Zapal. Horv. PM4 13) — Z: (!), Hosszúhetény (Simk. 206), Váralja (Zóly.), Szászvár „Dobogó” (!) — V: Harsány (!Simk. 206), „Feketehegy” (!) — Ma: Hercegszabar, Göröcsöny, Baksa (!), Villánykövesd, Erdősmecske (Horv. É. 11, 12) — H: Bakóca, Kisvaszar, Palé (1. c. 13), Högyész, Nagytterecsény, Szentbalázs (!), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy”, Szálka (Hollós 93), „Gurovica” (Bs.) — ZS: Kaposújlak (Boros VSz 1936 83), Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi, Tótfalui erdő” (!) — O: Szentegát (!)

211. *C. distans* L. (Ritkás sás)

J: Magyarürög (Kárp.), Kövágószőlős (Simk. 205) — T: Pécs (1. c.) — V: Máriagyűd, Villány (1. c.) — H: Nagymányok-Hidas (!) — ZS: Kaposvár (Lengyel: A magyar lucernamag... 52)

212. *C. hordeistichos* Vill. (Arpaképi sás)

O: Pécs (!Maj.), Harkány (Simk. 205)

213. *C. hirta* L. (Borzas sás)

Vulgaris. Közönséges.

214. *C. melanostachya* Willd. (= *nutans* Host) (Bókoló sás)

Baranya (Janka apud N II 13) — Ma: Nagynyárád (idem ÖBZ 1867 231)

215. *C. acutiformis* Ehrh. (Mocsári sás)

Vulgaris. Közönséges.

216. *C. riparia* Curt. (Parti sás)

Ma: Villánykövesd (!) — H: Nagymányok (!) — O: Pécs (!Maj. 40, Simk. 206), Drávaszabolcs (!) — D: Kölked (!) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós MBL 1914 57)

217. *C. pseudocyperus* L. (Villás sás)

Baranya (K.-Nendtv. 566) — O: Harkány (Simk. 206)

218. *C. inflata* Huds. (= *rostrata* Stokes) (Csörös sás)

Pécs „környéke” (NT)

219. *C. vesicaria* L. (Hólyagos sás)

Pécs „környéke” (Maj. 40., K.-Nendtv. 566)

C. cuprina Nendtv. — Baranya (NT) = *vulpina* v. *tenuior* (Simk. 206)

Araceae. Kontyvirágfélék.

220. *Acorus calamus* L. (Kálmosgyökér)

O: Pécs „környéke” (Nendtv. 16), „Balokány” (Maj. apud Horv. PM4 15), Pellérd (Maj.!) — D: Eszék-Bellye, Dárda (Kit. 1. 22, 26)

221. *Arum maculatum* L. (Foltos kontyvirág) — **b. intermedium** SchurJ: Magyarürög (Maj. apud Horv. PM2 10) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 18, **b.** Horv. PM4 13), „Melegmányivölgy” (!), „Kantavár”, „Kis-rét” (**b.** PK 28. 7), „Lapis” (**b.**!) — Z: (**b.** Horv. PM4 13), Magyaregregy, Hosszúhetény, Váralja-Püspöknádasd (!) — V: Harsány (**b.** Horv. PM4 13) — Ma: Kistótfalu, Borjád, Geresd, Hercegtöttös (!), Németpalkonya (**b.** Horv. PM4 13), Nagypárad (Horv. É. 11), Kozármisleny „Üszög” (BK 7, BKA) — H: Palé (**b.** 1. c. 13), Kisvaszar (1. c.) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 92), „Sötétvölgy” (Bartal 36) — O: Páprád „Tilos erdő”, „Bükkhát” (Horv. É. 15, 16), Szentegát (**b.**!)*Calla palustris* L. — Pécs (Maj.!) 39) tantum Velencei-tó (?), erroneo publicata (K. Nendtv. 564, Horv. PM4 16)

Lemnaceae. Békalencsefélék.

222. *Lemna trisulca* L. (Keresztes békalencse)

Baranya (Maj. 39) — J: (Maj. K. apud Horv. PM2 11), Abaliget „barlang” (!) — Ma: Velény (!) — O: Drávaszabolcs (Simk. 202), Gordisa (Maj.!) apud Horv. PM4 15), Sellye „Görü” (Boros MBL 1924 29), Pécs, Mecsekalja, Páprád „Bükkhát”, Harkány (!)

223. *L. minor* L. (Kis békalencse)

Vulgaris. Közönséges.

224. *L. gibba* L. (Púpos békalencse)

Baranya (Maj. 39) — T: Mecsekszabolcs (Maj. K. apud Horv. PM2 11) — O: Kákics (Simk. 202), Pécs „Balokány”, Gordisa (Horv. PM4 19), Sellye „Kápolnapusztá” (!)

225. *Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid. (Bojtos békalencse)

J: Abaliget (Simk. 202) — O: Pécs „környéke” (Maj. 39), Gordisa (Maj. K. apud Horv. PM2 11), Drávaszabolcs (Simk. 202), Sellye „Görü” (Boros MBL 1924 29) — D: Földvári-tó (Boros MBL 1922 71), Dárda (Kit. 1. 26)

Juncaceae. Szittyófélék.

226. *Juncus subnodulosus* Schrk. (Tompalevelű szittyó)

Pécs „környéke” (Maj.!) apud Horv. PM2 6)

227. *J. atratus* Krock. (Fekete szittyó)

Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 205) — D: Riha-tó (!)

228. *J. articulatus* L. (Fülemile szittyó)

Vulgaris. Közönséges.

229. *J. inflexus* L. (= *glaucus* Ehrh.) (Deres szittyó)

J: Magyarürög „Egervölgy” (!) — V: Villány (Simk. 204) — Ma: Palotabozsok (Bs.) — SZ: Szekszárd (Hollós MBL 1914 58) — O: Harkány (1. c.), Pécs „környéke” (Nendtv. 25, K.-Nendtv. 565, 567, Maj.!)

230. *J. effusus* L. (Béka szittyó)

J: Abaliget (!*b. compactus* Lec. et Curt. Boros apud Horv. Borbásia I 95) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 25, RK 592) — Z: Szászvár „Dobogó” (!) — H: Palé, Kisvaszar (!) — V: Villány (Simk. 204) — SZ: Szálka (Hollós 93) — O: Endrőc, Páprád „Bükkhát”, Sellye (!)

231. *J. conglomeratus* L. (Csomós szittyó)

J: Kővágószőlős (Simk. 204), Abaliget (!) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 93) — O: Pécs „környéke” (Maj. 39), Sellye (!), Harkány (!Simk. 204)

232. *J. compressus* Jacq. (Laposszárú szittyó)

J: Kővágószőlős (!) — Z: Hosszúhetény (Simk. 204) — Ma: Villány (1. c.), Áta (!) — O: Pécs „környéke” (Maj. 39), „Megyer” (NV!), Mecsekalja, Páprád (!) — D: Kisdárda (Knapp), Dárda (Simk. 204), Mohács (!)

233. *J. sphaerocarpus* Nees. (Gömbös termésű szittyó)

J: Kővágószőlős (Simk. 205)

234. *J. bufonius* L. (Varangy szittyó)

Vulgaris. Közönséges.

? *J. bulbosus* L. — Baranya (Nendtv. 24) ? (Horv. PM 4 16)

J. filiformis L. — Baranya (Nendtv. 25) = *glaucus* (K.-Nendtv. 597 secundum exemplar Nendtvichi)

235. *Luzula Forsteri* (Sm.) DC. (Forster perjeszittyó)

J: (!), Magyarürög (Kárp.) — T: Pécs „Mecsek” (!Janka ÖBZ 1867 232), „Lapis” (NV!) — Z: Váralja (Zóly.) — V: Villány (Simk. 205) — Ma: Baksa (!), Ivánbattyán, Feked (Horv. É. 11, 12) — H: Bakóca „Hollófészek” (1. c. 13), Högyész (!), Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36), „Gurovica”, Szálka (Hollós MBL 1914 58) — ZS: Kaposújlak (Boros VSz 1936 83)

236. *L. pilosa* (L.) Willd. (Pillás perjeszittyó)

J: Abaliget „Katalin-erdő” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 26), „Daíndol” (Kit. 1. 8.), „Kisrét” (!NV!), „Lámpás”, „Melegmányivölgy”, „Árpádtető”, Pécsbudafa (!) — H: Palé (Horv. É. 13) — SZ: Szekszárd, Szálka (Hollós 93) — ZS: Kaposújlak (Boros 1. c.) — O: Marócsa (!)

237. *L. luzuloides* (Lam.) Dandy et Willmott (= *nemorosa* (Poll.) E. Mey.) (Fehér perjeszittyó)

J: (!*b. erythranthema* (Wallr.) Hay. (= *cuprina* Roch., *rubella* (Hoppe) Gaud. Simk. 205) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 26), „Kisrét”, „Melegmányivölgy”, Komló (!) — Z: Zobák „Hármashegy” (!), Váralja (Zóly.)

238. *L. campestris* (L.) DC. (Mezei perjeszittyó)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges.

L. spadicea (All.) Lam. et DC. — (Nendtv. 16) = *Juncus articulatus* (K.-Nendtv. 565)

L. silvatica (Huds.) Gaud. — (Maj. 39) erroneo publicata (K.-Nendtv. 564)

Liliaceae. Liliomfélék.

239. **Veratrum nigrum** L. (Fekete zászpa)
Baranya (Maj. 26, 39)
240. **V. album** L. (Fehér zászpa)
Baranya (Maj. 26, 39) — Z: (Maj.! apud Horv. l. c. *nigrum* lapsus calami PM4 15)
241. **Colchicum hungaricum** Janka (Magyar kikerics)
V: Harsány (!Janka ÖBZ 1867 102), Villány (!)
242. **C. autumnale** L. (Őszi kikerics)
In regione montana collinaque et O vulgaris. A hegy- és dombvidéken meg az O-ban közönséges.
Asphodelus albus Mill. — Ad limites territorii: Szigetvár-Drávatamási (Kit. apud N I 55)
? *Anthericum liliago* L. — SZ: „Bat” (Hollós 93)
243. **A. ramosum** L. (Hölye)
J: (!Kit. 1. 8), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17, Horv. PK28 5) — Z: (Kit. 1. 17), Pécsvárad (!) — V: Harsány (!Simk. 203, Kit. 1. 12), Beremend (l. c. 28) — SZ: Szekszárd „kápolna”, „Petre”, „Bat” (Hollós 93)
244. **Gagea pratensis** (Pers.) Dum. (Mezei tyúktaréj)
T: Pécs „Mecsek” (!Balek! ÖBW 1852 14), „Bálics” (Sz!), „Kozári vadászház” (!) — V: Harsány (!Simk. 204) — SZ: Szekszárd „Bat”, Szálka (Hollós 93)
245. **G. lutea** (L) Ker. (Erdei tyúktaréj)
J: Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj.! 39), „Lapis” (!K.-Nendtv. 567, 571), „Remeterét” (Sz!), „Szkokó”, „Istenkút”, Pécsbudafa (!) — Z: Hosszúhetény (!Simk. 204) — V: (!Harsány l. c.) — Ma: Nagynyárad (Janka l. c. 161), Nagypárad (Horv. É. 11), Németpalkonya (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 93), „Sötétvölgy” (!)
246. **G. pusilla** (Schm.) R. et Sch. (Kis tyúktaréj)
T: Pécs „Mecsek” (Horv. Borbásia I 94) — SZ: Szekszárd „Csatár”, Szálka (Hollós 93)
247. **G. minima** (L) Ker. (Apró tyúktaréj)
J: Vöröshegy (!) — V: Harsány (!Simk. 204)
248. **G. arvensis** (Pers.) Dum. (Úgari tyúktaréj)
J: Abaliget „Katalin-erdő” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 9, 28), „Frühweiss”, „Tettye” (!), „Bálics”, „Daindol” (Sz!) — V: Harsány (Simk. 204)
249. **Allium vineale** L. (Bajuszos hagyma)
Z: Szászvár (Horv. Borbásia I 94)
250. **A. sphaerocephalum** L. (Bunkós hagyma)
J: Mecsekalja (Soó) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17) — V: Harsány (!Simk. 204, Kit. 1. 12) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Sötétvölgy” (Hollós 93)
251. **A. scorodoprasum** L. (Kígyós hagyma)
J: Mecsekalja, Kővágószőlős (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17), „Bányatelep” (!) — Ma: Borjád (Horv. É. 11) — H: Hőgyész (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Sötétvölgy” (Hollós 93) — O: Pellérd, Alsószentmárton (!)

252. *A. rotundum* L. (Ereszes hagyma)
J: (Horv. Borbásia I 94) — Z: Hosszúhetény (1. c., Bs.)
A. atroviolaceum Boiss. — Ad limites territorii — SZ: Szekszárd „Gurovica” (Hollós MBL 1924 58)
253. *A. ursinum* L. (Medve hagyma)
J: (!), Orfű, Hetvehely, Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17), „Kantavár” (!), Somogy (Bs.) — Z: (Horv. TTK 1934 293), Zórák (!) — V: Harsány (!Simk. 204) — Ma: Nagyárpád-Pécsudvard (!) — H: Kisvaszar, Palé (Horv. É. 13), Baranyajenő, Nagytrecsény, Szentbalázs (!), Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 93) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O: Okorág, Szentegát (!)
254. *A. atropurpureum* W. et K. (Bíborfekete hagyma)
Ma: Kistótfalu (Janka apud N II 19), Áta (!), Fazekasboda (Horv. PM4 18) — SZ: Szekszárd „alsó temető” (Hollós MBL 1914 58), „Csatár” (Hollós 93) — O: Pécs (Horv. PM4 18)
255. *A. angulosum* L. (Gyék hagyma)
Baranya (Nendtv. 17) — J: (Kit. 1. 8.), Kövágószőlős (Simk. 203) — SZ: Szekszárd „Palánk”, Bába (Hollós 93) — O: Gordisa (!Boros MBL 1924 29), Matty (Simk. 203) — D: Dárda (1. c.), Riha-tó (Boros MBL 1922 71)
256. *A. montanum* Schm. (Hegyi hagyma)
T: Pécs „Mecsek” (Horv. PM2 7), „Bertalan-szikla” (PK28 5), „Lám-pás” (*sub angulosum* Kit. 1. 7, 6)
257. *A. oleraceum* L. (Érdes hagyma)
J: (!), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 17), „Szkokó” (!) — Z: Pécsvárad (!) — V: Harsány (Kit. apud Jáv. AMNH 1926 469 ?), Máriagyűd (Simk. 204)
258. *A. carinatum* L. (Szarvas hagyma)
Pécs „környéke” (Nendtv. 17, Maj. 39)
259. *A. flavum* L. (Sárga hagyma)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17, Kit. 1. 6), „Bertalan-szikla” (Horv. PK28 5) — V: Harsány (!Kit. 1. 12, Simk. 203)
260. *A. paniculatum* L. (Bugás hagyma)
T: Pécs „Mecsek” (!)
A. ampeloprasum L. — Baranya (Nendtv. 17) erroneo publicatum (Horv. PM4 16)
261. *Lilium martagon* L. (Turbánliliom)
J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25), „Daíndol”, „Kantavár” (!Kit. 1. 8, 9) — Z: (!), Hosszúhetény (Kit. 1. 17, Horv. TTK 1934 292), Szászvár „Dobogó” (!) — V: Harsány (!Simk. 204) — Ma: Pécsudvard, Vülánykövesd (Horv. É. 11), Fazekasboda, Erdősmecske, Görcsöny, Velény (!) — H: Palé, Kisvaszar (1. c. 13), Högyész (!), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Bat”, „Sötétvölgy” (Hollós 93)
L. bulbiferum L. — J: (Maj. 25, 39) residuum culturae. Olim.
262. *Fritillaria meleagris* L. (Császárkorona)
Baranya (Nendtv. 23) — Ma: Villány (K.-Nendtv. 570) — O: Sellye (1. c.), Drávafok (!) — D: Mohácsziget (Janka l. c. 161), Petárda (!)
Tulipa silvestris L. — Olim subsponsanea — M: (Maj. 39, Ballay!) — J: (Maj. 39)

Erythronium dens-canis L. — **b. biscopius** Horv. — Ad limites territorii — ZS: Kadarkút (Jávorka: Magyar Flóra II. 1281), Görösgal (1. c., **b.** cum typo! Horv. Borbásia II 26)

263. *Scilla bifolia* L. (incl. **ssp. subtriphylla** Schur) (Csillagvirág)

b. biscapa Horv. — J: (!), Mecsekalja (!), Vöröshegy (**b.** Horv. Borbásia II 26), Magyarürög (Sz!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 9, 31), „Lámpás” (**b.** Horv. 1. c.) — V: Harsány, Villány (!Simk. 204) — Ma: Nagynyárád (Janka ÖBZ 1867 161), Pécsudvard (Horv. É. 11) — H: Högyész (1. c. 14) — SZ: Szekszárd „Bat”, Szálka (Hollós 93) — ZS: Kaposújlak (Boros VSz 1936 83) — D: Bokerdő (Horv. Borbásia II 26)

264. *Ornithogalum sphaerocarpum* Kern. (Gömbtermésű sárma)

T: Pécs „Mecsek” (!) — Ma: Nagynyárád (Janka ÖBZ 1867 231) — V: Harsány (!)

265. *O. pyramidale* L. (Nyulánk sárma)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 28, Simk. 204, *Anthericum liliago* = *O. p.* BK 16, A) — V: Harsány (Simk. 204) — Ma: Nagynyárád (Janka 1. c. 232)

266. *O. Gussonei* Ten. (Vékonylevelű sárma)

J: Magyarürög (Horv. PM2 7) — T: Pécs „Mecsek” (1. c.) — H: Bakóca (!) — O: Pécs „ótemető” (1. c.)

267. *O. umbellatum* L. (Ernyős sárma)

Vulgaris. Közönséges.

268. *O. Bouchéanum* (Kunth) Asch. (= *nutans* L. auct.) (Kónya sárma)

J: Magyarürög (!) — T: Pécs „Mecsek” (Horv. PM2 7) — SZ: Szekszárd, „Öcsényi hegy” (Hollós MBL 1914 58)

? *O. pyrenaicum* L. (= *flavescens* Lam.) — Ma: Nagynyárád (Janka 1. c.)

269. *Muscari comosum* (L) Mill. (Üstökös gyöngyike)

Vulgaris. Közönséges.

270. *M. tenuiflorum* Tausch. (Karcú gyöngyike)

T: Pécs „Mecsek” (!) — V: Harsány (Soó) — Ma: Nagynyárád (Janka 1. c.)

271. *M. racemosum* (L) Mill. (Fürtös gyöngyike)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 27), „Szkokó”, „Bányatelep”, „Istenkút” (!) — V: Harsány (!) — Ma: Németpalkonya, Keresztes pusztá (!) — SZ: Szekszárd (Bartal 93), „Bat”, „Csatár”, Szálka (Hollós 93)

272. *M. botryoides* (L) Mill. (Eperj gyöngyike)

J: (!), Boda, Magyarürög, Mecsekalja (!hic typus cum *b. lus. lactealbum* Horv. Borbásia I. 95) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 27), „Bertalan szikla” (PK28 5), „Bányatelep”, „Kozárvadászház”, Mecsekszabolcs (!) — Z: (Horv. TTK 1934 293), Zobák, Hosszúhetény (!), Hármashegy (Kárp.) — V: Harsány (!Simk. 204) — Ma: Nagynyárád (!Janka 1. c. 161), Hercegszabar (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (!)

273. *Asparagus officinalis* L. (Spárga)

T: Pécs „környéke” (Nendtv. 18), „Makár” (Simk. 203) — V: Mária-gyúd (!) — Ma: Geresd (!) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Gemenc” (Hollós 93)

A. tenuifolius Lam. — M: (Maj!) non est *A. t.* (Horv. Borbásia I. 99, ergo ex Jávorka: A magyar flóra kis határozója 2. k. 64. delendum!)

274. *Ruscus hypoglossum* L. (Lónyelvű csodabogyó)

J: (!Simk. 203), Abaliget, Abaliget „Katalin-erdő”, Husztót (Horv. PM2 7) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, 30, Horv. 1. c.), „Kisrét”, „Lapis” (Horv. 1. c. hic cum **b. platyphyllum** Horv. Borbásia II 26), „Árpádtető”, „Kantavár” (Horv. PM4 19), „Kozárivadászház”, „Melegmányi völgy”, „Istenkút” (!) — Z: Hosszúhetény (Simk. 203), Váralja-Püspök-nádasd, Szászvár, Pécsvarad (!) — V: Harsány (!Simk. 203), „Feketehegy” (!) — Ma: Nagynyárád (Janka 1. c. 127) — H: Hajmás (Ambrózy apud Boros MBL 1924 30), Bakóca, Kisvaszar (Horv. É. 13, 12), Sásd Nagytrecsény (!) — ZS: Kishárság „Margita puszta”, Szentlászló, Gálosfa (Kit. 2. 14, 15), Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)

275. *R. aculeatus* L. (Szúrós csodabogyó, egértövis)

J: (!), Orfű (Horv. PM2 7), Hetvehely, Bükkösd, Abaliget (!), Vöröshegy (Horv. PM4 19) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, 30), „Bertalan templom” (Maj. K. apud Horv. PM2 11), „Büdöskút”, „Kirchenberg” (Fekete-Blattny 613), „Bányatelep”, „Melegmányivölgy” (Horv. PM2 7), „Istenkút”, „Mélyvölgy”, Pécsbuda (!), Mecsekszentkút (Soó) — Z: Hosszúhetény (Simk. 203), Óbánya „Hidegtető” (Horv. 1. c.) — V: Harsány (!Kit. apud N I 57), „Feketehegy” (!) — Ma: Nagynyárád (Janka 1. c. 127), Németspalkonya „Törökcsér” (Horv. PM4 19), Erdősmecske (Horv. É. 12), Kistótfalu (!) — H: Bakóca, Palé, Kisvaszar (1. c. 13, 12), Nagyhajmás (Hollós MBL 1912 279), Hajmás (Ambrózy apud Boros 1. c.), Nagytrecsény, Sásd, Szentkatalin (!), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36), „Bat” (Hollós 93), „Gurovica”, „Óriás-h.” (Bs.) — ZS: Szentlászló, Gálosfa (Kit. 2. 14), Kaposvár „Nádasdi erdő”, Töröcske „Rapol” (!) — O: Sellye (Simk. 203), Páprád „Tilos erdő”, „Bükkhát” (Horv. É. 15, 16), Okorág, Szentegát (!)

276. *Majanthemum bifolium* (L) Schm. (Árnyékvirág)

J: Magyarürög (K.-Nendtv. 567, 570) — O: Marócsa (1. c., NV!), Sellye (NV! apud Horv. PM4 15), Szentegát (!)

277. *Polygonatum latifolium* (Jacq.) Desf. (Széles levelű Salamonpecsét)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 28) — Ma: Bisse, Baksa (!) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Bat” (Hollós 93), „Sötétvölgy”, „Remetekápolna” (Bartal 36)

278. *P. odoratum* (Mill.) Druce (= *officinale* All.) (Sok térdű Salamonpecsét)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29, **b. platyphyllum** Brügger Maj! apud Horv. Borbásia II 26), „Makár”, „Kisrét” (!) — V: Harsány (!Simk. 202, Kit. 1. 12), Veresmart (Marsigli 69) — H: Lengyel (Jáv.-Zóly.) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O: Szentegát (!)

279. *P. multiflorum* (L) All. (Fürtös Salamonpecsét)

J: (!), Hetvehely (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29), „Daindol” (Kit. 1. 8), „Kisrét” (Sz!) — V: Harsány (!) — Ma: Kistótfalu (!) — H: Bakóca, Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36), Szálka (Hollós 93) — ZS: Kaposvár (KH!)

? *P. verticillatum* (L) All. — M: (Maj. 39) erroneo publicata (K.-Nendtv. 564, Horv. PM2 3)

280. *Convallaria majalis* L. (Májusi gyöngyvirág)

J: Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 20), „Lapis” (!) — Z: (Horv. TTK 1. c.), Zobák, Püspökszentlászló (!) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 13), Kistótfalu (!) — H: Kisvaszar (1. c. 11), Baranyajenő, Högyész (!), Lengyel (Hollós 93), Kurd (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36), „Bat”, „Borrév”, Szálka (Hollós 93) — ZS: Nagytrecsény, Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O: Sámód (!)

281. *Paris quadrifolia* L. (Farkasszőlő)

J: (!), Orfű „Szuado” (cum *b. lus. 5 folius*), Mecsekalja, Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, 28), „Melegmányi-, Mélyvölgy”, „Lámpás”, „Lapis”, Vágot, Mánfa „Sikonda” (!) — H: Palé, Kisvaszar (Horv. É. 13), Lengyel (Jáv.-Zóly.), Nagytrecsény (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 93) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14), Kaposszerdahely „Rapol” (!) — O: Szentegát (cum *b. et c. 6 folius!*), Marócsa (cum *b.!*)

Amaryllidaceae. Amarilliszfélék.282. *Galanthus nivalis* L. (Hóvirág)

J: Szentlőrinc, Abaliget, Bükkösd (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 9, 23, typus cum *a. major* Ten. Horv. Borbásia I 95, *b. isomicrochlamidaeus* Borb., *c. lus. abbatis Adulphi* Horv. I. c., *d. erdődensis* Prodán, *e. lus. biscopius* Beck 1. c. II 26), „Kisrét” (cum typo *f. biflorus* Beck, *g. lus. mecsekensis* Horv. 1. c. I 100 et IV, et adhuc multis formis teratologicis) „Bányatelep”, „Remeterét”, Pécsbudafa, Mánfa „barlang” (*h. lus. Margarethae* Horv. 1. c. I 96 et IV), Magyarszék (!) — Z: (Horv. TTK 1. c., *a.!*) — V: Harsány (!), Villány (!Simk. 203), Máriagyűd (!) — Ma: Németpal-konya, Geresd (!) — H: Kisvaszar, Bakóca (Horv. É. 13, 14), Nagytrecsény, Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36), „Bat” (Hollós 93) — ZS: Kapostűlak (Boros VSz 1936 83), Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O: Sellye „Gesnye”, Szentegát, Bánfa, Okorág (!)

283. *L. aestivum* L. (Nyári tözike)

J: Magyarürög (Horv. É. 5) — Z: Nagymányok-Hidas (!) — O: Pécs „környéke” (!Nendtv. 14, 25), Mecsekalja, Pellérd, Drávaszabolcs, Kákics, Endrőc (!) — D: Mohácsziget (Janka 1. c. 161), Kölked (!)

L. vernalis L. — M: Tantum cultum! (Maj.!)

Narcissus pseudonarcissus L. — Culta et subspontanea — Baranya (!Nendtv. 27) — J: (Maj. 25, 38) — Z: Nagymányok (!) — Ma: Nagypárad (K.-Nendtv. 571)

N. incomparabilis Curt. — Culta et subspontanea — J: (Simk. 203)

N. angustifolius Curt. — Tantum subspontanea? — Z: Nagymányok-Hidas (Horv. Borbásia I 94)

Dioscoreaceae. Jamszgyökök-félék.284. *Tamus communis* L. (Piritó gyökér)

Baranya (!Kit. apud N I 57, Nendtv. 14, 32) — J: (!Kit. 1. 8), Hetvehely (*b. racemosa* Suessenguth Horv. Borbásia II 26) — T: Pécs „Mecsek” (!, RK 592, Kit. apud Jáv. AMNH 1936 71, cum typo: *c. cretica* (L) Boiss.

Horv. Borbásia I 96, **d. contracta** Suessenguth, f. *paucibaccata* Suessenguth 1. c. II 27), „Daíndol”, „Kantavár” (Kit. 1. 8), „Árpádtető” (Soó), „Lapis” (!) „Remeterét”, Mánfa „Sikonda”, Mecsekszentkút (!) — Z: Püspöknádasd (Simk. 203), Hosszúhetény (Kit. 1. 17, Horv. TTK 1. c.), Szászvár „Dobogó”, Pécsvárad (Bs.) — V: Harsány (!Boros TTK 1925 165, Kit. 1. 12), Németpalkonya „Törökcser” (Horv. PM4 19) — Ma: Ivánbattyán, Erdősmecske (Horv. É. 12), Villánykövesd, Hercegszabar, Fazekasboda (!) — H: Kisvaszar (1. c. 13), Högyész (!Kit. 1. 14), Szentbalázs, Nagyterecsény (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36), „Bat” (Hollós 93) — ZS: Szenttamás „Cserhegy” (Kit. 2. 14), Kaposvár „Nádasdi erdő”, Töröcske „Rapol” (!) — O: Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 16), Alsó-szentmárton-Siklós (**d. f. pluribaccata** Suessenguth Horv. Borbásia II 27), Lakócsa, Sellye (!)

Iridaceae. Nőziromfélék.

285. **Iris pumila** L. (Apró nőzirom)

Baranya (Maj. 38) — V: Harsány (Simk. 203)

286. **I. variegata** L. (Tarka nőzirom)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 24), „Makár” (1. c. 14) — V: Harsány (!), Beremend (Kit. 1. 12, 28) — H: Högyész (!Kit. 1. 14) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Éleshát” (Hollós 93)

287. **I. pseudacorus** L. (Sárga nőzirom)

Vulgaris. Közönséges.

288. **I. sibirica** L. (Kék nőzirom)

O: Pécs „környéke” (!Maj. 38, NV!), Sellye (K.-Nendtv. 567, 571), Mecsekalja (!)

289. **I. spuria** L. (Korcs nőzirom)

Baranya (Maj. 26, 38) — D: Nagynyárád-Sátorhely (Janka apud N II 22)

290. **I. graminea** L. (Pázsitos nőzirom)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 24), „Makár” (1. c. 14), Mecsekszabolcs (!) — Z: (Horv. PM2 9) — Ma: Nagynyárád (Janka apud N II 21) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36), „Bat”, „Gurovica” (Hollós MBL 1914 58)

I. germanica L. — Culta et subspontanea — Pécs „Mecsek” (Nendtv. 24, K.-Nendtv. 571) — V: Harsány (!Kit. 1. 13) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 1. c.)

I. arenaria W. et K. — Ad limites territorii — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36)

291. **Gladíolus communis** L. (Dákoska)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23), Mecsekszentkút (!K.-Nendtv. 570)

? *G. paluster* Gaud. — T: Pécs (Agh 74) — Olím? (Máthé BK 1934 266)

G. imbricatus L. — Ad limites territorii — SZ: Szekszárd „Vám-erdő” (Bartal 36) secundum Máthé = *paluster* (1. c.)

?? *Crocus Pallasii* M. B. — V: Harsány (Tauscher apud Janka) ipse etiam dubitavit (ÖBZ 1870 319), Borbás etiam (ÖBZ 1874 252)

Orchidaceae. Kosborfélék.

292. *Cypripedium calceolus* L. (Boldogasszony-papucs)
T: Pécs „Mecsek” (Maj. 38) — H: Bükkösd (Legit: G. Frindt professor hist. nat. de Pécs)
293. *Ophrys sphegodes* Mill. (= *araneifera* Huds.) (Párkányos bangó)
T: Pécs „Mecsek” (NT, Maj.!), Mecsekszabolcs (Nendtvich! apud Soó Bot. Arch. 1928 132) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 36, Hollós MBL 1914 58)
294. *O. muscifera* Huds. (Légyalakú bangó)
Baranya (Maj. 25) — SZ: Szekszárd „Remetekápolna” (Bartal 36)
295. *O. cornuta* Stev. *b. banatica* Rchb. f. (Szarvas bangó)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 27, Nendtvich! apud Soó 1. c. 135), „Lapis” (1. c. 35), „Frühweiss” (Horv. PM2 7), „Báránytető” (Árpádtető 1. c. lapsus calami), „Mandulás” (Horv. PM4 19)
O. apifera Huds. — T: Pécs „Mecsek” (BK 15) = *O. cornuta secundum picturam* (BKA)
? *O. fuciflora* Sw. — Baranya (Nendtv. 27, Maj. 38, herbariis deest)
296. *Orchis morio* L. (Agár kosbor)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 27) — Z: Hosszúhetény-Zobák (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 94) — O: Mecsekalja, Sellye, Harkány (!)
297. *O. coriophora* L. (Poloskaszagú kosbor)
Baranya (Maj. 38) — Ma: Hegyszentmárton „Jánoshegy” ? (K.-Nendtv. 567, 571)
298. *O. tridentata* Scop. (Tarka kosbor)
T: Pécs „környéke” (Nendtv. 28, Maj. 38), Mecsekszabolcs (Soó 1. c. 144) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 94), „Óriás-h.” (Boros apud Soó 1. c.)
299. *O. ustulata* L. (Sömörös kosbor)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 28, NV!, Maj. 38), Mecsekszabolcs (Nendtv. apud Soó 1. c. 143) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós MBL 1914 58)
300. *O. simia* Lam. (Majom kosbor)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 28, cum typo *b. albiflora* Horv. Borbásia II 27), „Lapis” (!Simk. 202), „Makár” (Soó 1. c. 145), „Lapis”-Vágot, „Csurgó” (!) — Z: Pécsvárad (Horv. PM2 10), Hosszúhetény (!) — V: Harsány (Legit: Kocsis laborans Degeni, revera hic et non ad Pécs? In herbario Degeni)
301. *O. militaris* L. (Vitéz kosbor)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 27, Maj. 38), „Lapis” (*b. platyloba* Zimm. Soó) — Ma: Keresztespuszta (!) — SZ: Szekszárd (*c. intercedens* Beck cum typo Bartal 36), „Bükk” (Hollós MBL 1914 58), „Óriás-h.” (Boros apud Soó 1. c. 148)
302. *O. purpurea* Huds. (Bíboros kosbor)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 27, Horv. Borbásia I 99), „Mélyvölgy”, Mecsekszentkút (!) — Z: Hosszúhetény (Horv. TTK 1934 292), Pécsvárad (Horv. PCGÉ34 10), Püspökszentlászló (!) — V: Harsány (!) — Ma:

Nagynyárád (Janka apud N II 22), Villánykövesd (Horv. É. 11), Kistótfalu (!) — H: Bakóca, Palé (Horv. É. 13), Högyész (!), Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 94), „Sötétvölgy” (Bartal 36), „Óriás-h.”, „Gurovica” (Bs., **b. triangularis** Wirtg. Boros! apud Soó BK 1928 135) — ZS: Csertő (Kit. apud N I 63), Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)

303. **O. mascula** L. **ssp. signifera** Soó (Füles kosbor)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 27), „Lapis” (Horv. Borbásia I 98)

304. **O. palustris** Jacq. (Mocsári kosbor)

O: Pécs „környéke” (Maj.!), „Megyer” (NV! apud Horv. PM4 15), Old (!)

305. **O. elegans** Heuff. (Pompás kosbor)

O: Pécs-Nagyárpád (Horv. Borbásia I 94), Mecsekalja (!)

306. **O. pallens** L. (Sápadt kosbor)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 28), „Lapis”, „Zsidóvölgy” (!) — Z: (Horv. TTK 1934 299)

307. **O. sambucina** L. (Bodzaszájú kosbor)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 28, Maj. 38), „Lapis”, „Nagymélyvölgy” (!) — Z: Zobák „Hidasí völgy” (!)

308. **O. maculata** L. (Foltos kosbor)

M: Pécs „Mecsek” (Maj. 38 apud Horv. PM2 4)

309. **O. latifolia** L. (Széleslevelű kosbor)

M: Pécs „környéke” (Nendtv. 27, Maj. 38)

310. **Himantoglossum hircinum** (L) Spr. (Sodortajk)

T: Pécs „Mecsek” (!Kit. 1. 7 et apud Jávorka AMNH 1936 25, Nendtv. 27), „Makár” (1. c. 14, **b. heterotomum** Geith. Maj. 38 apud Horv. Borbásia II 27) — Z: Hosszúhetény, Pécsvárad (Janka apud N II 23) — V: Máriagyűd (Simk. 202) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 94), „Gurovica”, „Óriás-h.” (idem MBL 1914 58)

311. **Anacamptis pyramidalis** (L) Rich. (Ragikra)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 28), „Makár” (Maj. K. apud Horv. PM2 10), „Bertalan szikla”, „Lapis” (!) — Z: Hosszúhetény (!), Pécsvárad (Janka apud N II 22) — V: Máriagyűd (!Simk. 202) — Ma: Erdősmecske (!) — H: Gödre-Gálosfa (Kit. 1. 26) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 94)

312. **Gymnadenia conopsea** (L) R. Br. (Bibircsvirág)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 27, Maj. 38) — SZ: Szekszárd „Bükk” (Hollós 94)

? *G. odoratissima* (L) Rich. — Pécs „környéke” (Nendtv. 27) ? (Horv. PM4 16)

313. **Platanthera bifolia** (L) Rich. (Sarkvirág)

J: (!), Kővágószőlős (!), Magyarürög (Sz!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 27), „Kisrét”, „Nagymélyvölgy”, Mánfa „Sikonda” (!) — Z: Pécsvárad (!) — Ma: Erdősmecske (Horv. É. 12) — H: Palé (1. c. 13), Nagytérecsény, Högyész, Szentbalázs (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 94), „Sötétvölgy” (**b. laxiflora** A. et G., **c. pervia** Rchb. Bartal 37), „Óriás-h.” (Bs.) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14), Töröcske „Rapol” (!) — O: Marócsa (!)

314. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. (Piros madársisak)
J: „Orfű” (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 22, Maj. 38), „Krumplivölgy” (BKA), Mecsekszentkút (Nendtv. apud Soó Bot. Arch. 189) — Z: Pécsvárad (Bs.), Szászvár „Dobogó” (!) — H: Högyész (!)

315. *C. damasonium* (Mill.) Druce (= *alba* (Cr.) Simk.) (Fehér madársisak)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22), „Árpádtető”, Mánfa „Sikonda” (!) — Z: (!) — V: Harsány (Simk. 202, Bs.) — Ma: Hercegszabar (!) — H: Palé, Bakóca (Horv. É. 13), Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Csatár”, Szálka (Hollós 94), „Sötétvölgy” (Bartal 36), „Óriás-h.” (Bs.) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)

316. *C. longifolia* (L.) Fritsch (Kardos madársisak)

J: (!BK 11), Petőc (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22), „Nagymélyvölgy” (!), „Szaniszló-pihenő” (BKA), „Lapis”, Mánfa (Soó) — Z: (!), Hosszúhetény, Püspökszentlászló, Szászvár „Dobogó” (!) — V: Harsány (Boros apud Soó 1. c. 188), Máriagyúd (!) — H: Bakóca, Kisvaszar (Horv. É. 13), Högyész, Nagytterecsény (!) — SZ: Szekszárd „Óriás-h.” (Bs.) — ZS: Töröcske „Rapol” (!)

317. *Epipactis palustris* (Mill.) Cr. (Mocsári nőszőfű)

O: Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 567), Sellye (Maj. K. apud Horv. PM2 11, NV!), Dráva (Kit. apud N I 69)

318. *E. microphylla* (Ehrh.) Sw. (Kislevelű nőszőfű)

T: Pécs „Mecsek” (NT, Maj. 38, Simk. 202), „Kantavár” (Simk. apud Soó 1. c. 193) — Ma: Apátvarasd (Horv. É. 12), Geresd (!)

319. *E. atropurpurea* Rafin. (Sötétbarna nőszőfű)

T: Pécs (Maj. 38 apud Horv. PM2 6)

320. *E. helleborine* (L.) Cr. (= *latifolia* (L.) All.) (Széleslevelű nőszőfű)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22, b. *viridiflora* (Hoffm.) Irmisch Simk. apud Soó 1. c. 195), „Kisrét” (!) — Z: Pécsvárad, Hosszúhetény, Magyar-egregy, „Márévár”, Zobák, Szászvár „Dobogó” (!) — V: Harsány (Simk. 202) — Ma: Erdősmecske (!) — H: Kisvaszar (Horv. É. 12), Nagytterecsény (!) — SZ: Szekszárd (b. Sadler! apud Soó 1. c.), „Bat”, „Csatár”, Bába (Hollós 94) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14), Töröcske „Rapol” (!)

ssp. varians (Cr.) A. et G. — SZ: Szekszárd (Sadler! apud Soó 1. c.)

321. *Limodorum abortivum* (L.) Sw. (Gérbics)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, 25), „Lapis”, „Mecsekszentkút” (K.-Nendtv. 571), „Krumplivölgy” (!) — V: Harsány (Simk. 202) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Gurovica”, „Nagybükk”, „Bat”, Szálka (Hollós MBL 1914 58)

322. *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. (Füzértkerces)

T: Pécs „környéke” (Maj. K.), Mecsekjánosi (K.-Nendtv. 567, 571) — O: Harkányfürdő (!Lyka apud Boros MBL 1924 31)

323. *Listera ovata* R. Br. (Békakonty)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 22, Maj. 38), „Mélyvölgy” (Soó 1. c. 181) — H: Szentbalázs (!) — SZ: Szekszárd (b. *platyglossa* Peterm. apud Soó 1. c.) „Bat”, „Csatár” (Hollós 94) — ZS: Töröcske „Rapol” (!) — O: Marócsa (!)

324. *Neottia nidus avis* (L) Rich. (Madárfészek)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22., *b. glandulosa* Beck Soó 1. c. 183), „Bertalan-kápolna”, „Árpádtető” (Soó), „Lapis” (Bs.), „Melegmányivölgy” (*b.!*), Komló (*b.!*) — V: Harsány (Simk. 202) — Ma: Kistótfalu (*b.!*), Vilyánykövesd (Horv. É. 11) — H: Kisvaszar, Palé (1. c. 12, 13), Nagytérecsény, Högyész, Szentbalázs (!), Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 94), „Sötétvölgy” (typus cum *b.*, Bartal 36), „Óriás-h.” (Boros typus cum *b.* apud Soó 1. c.), „Gurovica” (Bs.) — ZS: Töröcske „Rapol” (!), Kaposvár (!KH!)

? *Achroanthes monophyllos* (L) Green. — Pécs (Sadler (herbario ejus autem deest) apud Reichenbach: Iconographia XIII 164)

Dicotyledones. Kétszikűek.

Salicaceae. Fűzfafélék.325. *Populus alba* L. (Fehér nyárfa)

Baranya (!Nendtv. 29) — T: Pécsbudafa (Fekete-Blattny 607) — Ma: Erdősmecske (!) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15) — O: Drávaszabolcs (!) — D: Karapancsa (Tuzson BK 1914 139), Kölked (*b. nivea* Willd. Horv. Borbásia I 96)

326. *P. tremula* L. (Rezgő nyárfa)

J: (!) — T: Pécs „környéke” (typus cum *b. villosa* Láng Nendtv. 29, Simk. 199) — Z: Zobák (!) — H: Bonyhádvarasd (Kit. 2. 14), Kisvaszar, Bakóca (Horv. É. 12, 13), Palé (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 101) — ZS: Gálosfa (Kit. 1. 15) — O: Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 15)

327. *P. nigra* L. (Fekete nyárfa)

Baranya (!Nendtv. 29) — J: Abaliget (Bs.) — H: Dombóvár-Ujdombóvár (Bs.) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15), Kaposújlak (Bs.) — O: Drávaszabolcs, Drávasztára-Zaláta (!) — D: Karapancsa (Tuzson 1. c.), Bokerdő (!)

328. *P. canescens* Sm. (*P. alba* × *P. tremula*) (Szürke nyárfa)

Pécs „környéke” (NT, K.-Nendtv. 568)

329. *Salix alba* L. (Fehér fűz)

J: Abaliget (!) — T: Pécs „környéke” (! typus cum *b. vitellina* L. Nendtv. 30, Maj. 23, 37, Simk. 199), „Lámpás” (!), Mánfa (Fekete-Blattny 606) — Z: Magyaregregy, Hidas (!) — SZ: Szekszárd (Hollós 101) — O: Mecsekalja, Pellérd, Drávaszabolcs (!) — D: Karapancsa (Tuzson 1. c.), Kölked (!)

330. *S. fragilis* L. (Csöregé fűz)

Vulgaris. Közönséges.

331. *S. triandra* L. (Mandolalevelű fűz)

J: Abaliget (!Bs.), Szatina (!) — O: Pellérd, Páprád „Borostyánpusztá” (!) — D: Laskó (*b. semperiflorens* Host Simk. 199)

332. *S. purpurea* L. (Csigolyafűz)

T: Pécs „környéke” (Nendtv. 30, Simk. 199), „Lámpás” (Kit. 1. 7) — O: Páprád (!) — D: Bok-Bédaerdő (!), Laskó (Simk. 199)

? *S. elaeagnos* Scop. — Pécs „környéke” (NT)

333. *S. rosmarinifolia* L. (Rozmaringfűz)

O: Pécs „környéke” (Maj.!) 319 202

334. *S. viminalis* L. (Kosárkötő fűz)

Verisimiliter tantum culta et subspontanea. Őshonossága kétes.

Pécs „környéke” (Nendtv. 30) — O: Pellérd (cult!)

335. *S. cinerea* L. (Hamvas fűz)

T: Pécs „környéke” (Nendtv. 30), „Lajostárna” (K.-Nendtv. 572) — Z: Nagymányok-Hidas (!) — SZ: „Bat”, Szálka (Hollós 101) — O: Gordisa „Dázsonypusztá” (!) — D: Bédaerdő (!)

? *S. aurita* L. — Pécs „környéke” (Nendtv. 30)336. *S. caprea* L. (Kecskefűz)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken köznséges. — D: Bokerdő (!) — O: Sámód (!)

Juglandaceae. Diófafélék.337. *Juglans regia* L. (Közönséges diófa)

Pécs „környéke” (!Nendtv. 13) — V: Harsány (!Bs.) — De spontaneitate disputatur. Őshonosságáról vitáznak. cf. BK. 1933 129, 1935 193.

Betulaceae. Nyírfafélék.338. *Carpinus betulus* L. (Gyertyán)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken köznséges. — O: Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 15), Szentegát, Okorág, Bánfa, Baranyahídvég (!)

339. *Corylus avellana* L. (Mogyoró)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken köznséges. — O: Páprád (!) — D: „Réterdők” (Kit. 1. 28)

340. *Betula pendula* Roth (Nyírfa)

T: Pécs „Mecsek” (Fekete-Blattny 606, Maj. apud Horv. PM4 16) — H: Högyész, Bószénfa (!) — ZS: Szentlászló, Gálosfa (Kit. 2. 14, 15), Kaposvár (KH!) — O: Sellye (!)

B. pubescens Ehrh. — Pécs „környéke” (NT, Maj. 38 = *pendula* Horv. 1. c.) — Ad limites territorii — ZS: Némétlad (Fekete-Blattny 615)341. *Alnus incana* (L) Mnch. (Hamvas éger)

Baranya (Nendtv. 17, Maj. 38) Tantum olim. Talán csak egykor volt Baranyában.

342. *A. glutinosa* (L) Gärt. (Mézgás éger)

J: Abaliget (!) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 17, Maj. 38), Somogy (Bs.) — Z: Magyaregregy (!) — H: Kisvaszar (Horv. É. 12) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15), Kaposszerdahely „Rapol” (!) — O: Sellye (!Simk. 200), Drávaszabolcs (Kit. 1. 14), Sósvertike (!)

Fagaceae. Bükkfafélék.343. *Fagus silvatica* L. (Bükkfa)In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken köznséges. — O: Szentegát (!) — J: (*b. carpinifolia* Dom. Boros! apud Kárp. BK 1937 198, *c. moesiaca* K. Maly Horv. Borbásia I. 96)

344. *Castanea sativa* Mill. (Szelíd gesztenye)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 24), „Kantavár” (Kit. 1. 9) — Z: Hosszúhetény (Simk. 200, Fekete-Blattny 125), Pécsvárad, Zengővárkony (!Fekete-Blattny 125), Váralja (Kit. 1. 24) — V: Harsány (Simk. 200) — Ma: olim Nagynyárád (Kogutovicz: Dunántúl és Kisalföld II 13), Dunaszekcső (Marsigli 56), Apátvarasd (Hunfalvy opus citatum III 630) — ZS: (Kogutovicz 1. c. I. 221), Töröcske (Fekete-Blattny 128)

345. *Quercus cerris* L. v. *austriaca* Willd. (Csertőlgy)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Siklós (!Kit. 1. 15), Szentegát, Sellye (!)

346. *Q. pubescens* Willd. (= *lanuginosa* Lam.) (Molyhos tölgy)

M, V, Ma: vulgaris. M, V, Ma: közönséges. — V: Máriagyűd (**b. pendulina** Kit. Simk. *Quercus Hungariae* 29), Harsány (**c. dasyclados** Borb. = **Budayana** Haberle?, Kit. ! apud Jávorka AMNH 1935 85, **d. undulata** !Kit. 1. c.) — H: Kurd (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd (Fekete-Blattny 604), „Bat”, „Csatár” (Hollós 101) — ZS: Szigetvár-Szentlászló (Kit. 2. 14)

347. *Q. petraea* (Mattuschka) Lieblein (= *sessiliflora* Salisb.) (Kocsán-talan tölgy)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — J: (**b. aurea** Wierzb. Horv. Borbásia I 96)

348. *Q. robur* L. (Kocsános vagy mocsári tölgy)

Vulgaris. Közönséges. — **b. australis** Heuff. — O: Rónádfa (Borbás EL 1887 728) — **c. brevipes** Heuff. — D: Dárda (Simk. 200) — **d. pilosa** Schur — O: Sellye (Horv. Borbásia I 96) — **e. tardiflora** Tschern. — Ma: Egerág — O: Siklós (ex verbis cancellariae silvarum status in Pécs)

349. *Q. Bedői* Borb. (*Q. lanuginosa* × *Q. robur*)

T: Pécs „Mecsek” (Simk. 1. c.)

Ulmaceae. Szilfafélék.350. *Ulmus levis* Pall. (Vénic szil)

Baranya (NT, K.-Nendtv. 568) — SZ: Szekszárd (Fekete-Blattny 607), „Bat”, „Csatár” (Hollós 101) — D: Karapanca (Tuzson BK 1914 139), Kölked (!)

351. *U. campestris* L. (= *carpinifolia* Gleditsch, *foliacea* Gilib.) (Mezei szil)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Bánfa, Okorág, Szentegát (!) — D: Karapanca (Tuzson 1. c.)

b. suberosa (Mnch.) Wahlbg. — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 33), „Lámpás” (Kit. 1. 7), „Árpádtető” (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17, Simk. 200)

c. latifolia Pers. — V: Harsány (Kit. 1. 13) — Ma: Vokány „Terentás” (1. c. 11)

352. *U. scabra* Mill. (Hegyi szil)

T: Pécs „Mélyvölgy” (Soó) — Z: (!) — V: Máriagyűd (!) — H: Kisvaszar (!)

b. pannonica Simk. — V: Harsány (Simk. EL 1898 176)

Moraceae. Eperfafélék.

Ficus carica L. — Fructuose culta et semisubspontanea — T: Pécs (!Nendtv. 13, 22)

353. *Humulus lupulus* L. (Komló)

Vulgaris. Közönséges.

345. *Cannabis sativa* L. (Kender) — Subspontanea, vulgaris. Elvadultan közönséges.

Urticaceae. Csalánfélék.

355. *Urtica urens* L. (Apró csalán)

Vulgaris. Közönséges.

356. *U. dioica* L. (Nagy csalán)

Vulgaris. Közönséges.

357. *Parietaria officinalis* L. (Falgyom)

T: Pécs (!Nendtv. 28, Simk. 199) — Z: Pécsvárad, Zengővárkony, Püspöknádasd (!) — V: Máriagyűd (Simk. 199)

Loranthaceae. Fagyöngyfélék.

358. *Loranthus europaeus* Jacq. (Fakín)

J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „környéke“ (K.-Nendtv. 567, Maj.!, K., BK 9, A) — Z: Hármashegy (Kárp.) — V: Harsány (Simk. 180) — Ma: Püspöklak (Kit. 1. 21) — SZ: Szekszárd „Csatár“, Szálka (Hollós 106) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás“, Somogyhárság-Toponár (Kit. 2. 14, 15)

359. *Viscum album* L. (Fagyöngy)

J: (Maj.!, Simk. 180), Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek“ (Nendtv. 34, BK 9, A) — H: Dombóvár-Ujdombóvár (Bs.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy“ (Bartal 37) — ZS: Kaposújlak (Boros VSz 1936 83), Almamellék (Bs.) — D: Kölked (!)

Santalaceae. Zsellérkefélék.

360. *Th. linophyllon* L. (= *intermedium* Schrad.) (Lenlevelű zsellérke)

T: Pécs „Mecsek“ (!Nendtv. 32, Maj.!, 37), „Daindol“ (Kit. 1. 8.) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Beremend (Kit. 1. 28) — Ma: Geresd (1. c. 20) — SZ: Szekszárd „Kálvária“ (Bartal 37), „Sötétvölgy“ (Hollós 106)

361. *Th. ramosum* Hayne (Homoki zsellérke)

J: Kővágószőlős (!) — T: Pécs „Mecsek“ (!Maj. 37., Simk. 197), „Tettye“ (!) — Ma: Fazekasboda (!)

? *Thesium bavarum* Schrk. — T: Pécs „Mecsek“ (Maj. 37! non est T. b.!, K.-Nendtv. 568, Simk. 197 herbario eius deest!)

Aristolochiaceae. Farkasalmafélék.

362. *Asarum europaeum* L. (Kapotnyak)

J: Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek“ (!Nendtv. 18), „Kantavár“ (!Kit. 1. 9.), „Bányatelep“, „Istenkút“ (!), „Nagymélyvölgy“, Somogy (Bs.) — Z: (Horv. TTK 1. c.), Szászvár „Dobogó“, Váralja-Püspöknádasd (!) —

V: Villány (!Simk. 197), Villánykövesd „Törökcser” (!) — Ma: Nagynyárád (Janka 1. c. 161), Borjád, Feked (Horv. É. 11, 12), Villánykövesd, Hercegszabar, Baksa, Görcsöny, Nagypád (!) — H: Kisvaszar, Palé, Bakóca (Horv. É. 11, 13), Szentkatalin, Szentbalázs, Nagytrecsény, Högyész (!), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 37), „Bat”, „Csatár”, Szálka (Hollós 106) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 12), Kaposújlak (Boros VSz 1936 III 83), Kaposvár „Nádasdi erdő”, „Tótfalui erdő”, Töröcske „Rapol” (!) — O: Páprád „Tilos erdő”, „Bükkhát” (Horv. É. 15, 16), Szentegát, Baranyahidvég, Marócsa (!)

363. *Aristolochia clematitis* L. (Farkasalma)

Vulgaris. Közönséges.

Polygonaceae. Keserűfűfélék.

364. *Rumex pulcher* L. (Csinos lórom)

J: Kővágószőlős (!) — T: Pécs (Maj! apud N I 90), „Tettye” (Soó) — V: Villány, Harsány (Simk. 198) — Ma: Fazekasboda (!) — H: Jágónak (Zsák) — SZ: Szekszárd „Remete”, „Petre” (Hollós 101)

365. *R. maritimus* L. (Tengerparti lórom)

O: Siklós (Kit. apud N I 90, Kit. apud Jáv. AMNH 1936 10)

366. *R. paluster* Sm. (= *limosus* Thuill.) (Mocsári lórom)

Ma: Ócsárd (Zsák) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 101) — O: Harkány (Simk. 198), Matty (!) — Mohács (!)

367. *R. conglomeratus* Murr. (Murvás lórom)

Baranya (Nendtv. 30) — J: Abaliget (!) — V: Villány (Simk. 198) — Z: Szászvár „Dobogó” (!) — O: Páprád, Sámod „Bükkhát”, Matty (!) — D: Karapancsa (Tuzson 1. c.), Mohács (!Knapp)

368. *R. sanguineus* L. (Erdei lórom)

J: (*b. viridis* Sibth. Horv. Borbásia II 27) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 34, *b.* Horv. 1. c.), „Kisrét” (!), „Tettye” (Soó) — Z: Püspöknádasd (Simk. 198) — V: Harsány (1. c. et Soó) — Ma: Fazekasboda (*b.* Horv. 1. c.), Görcsöny (!), Erdősmecske „Alapítványi erdő” (Horv. É. 12) — H: Kisvaszar (1. c.), Högyész (!) — ZS: Töröcske „Rapol” (!) — O: Czinderybogád „Bükkhát” (!)

369. *R. obtusifolius* L. (Réti lórom)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30), „Szkokó” (!), Mecsekszentkút (K.-Nendtv. 572) — V: Villány (Simk. 198), Máriagyűd „Tenkes” (Bs.) — Ma: Baksa (!) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — D: Mohács (Knapp)

b. ssp. silvester (Lam.) Fr. — Ma: Fazekasboda (!) — H: Dombóvár (Bs.) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 101) — O: Rónádfa (Borbás apud Rechinger BBC 1922 58) — D: Mohács (!)

c. ssp. transiens (Simk.) Rchb. f. — O: Rónádfa (Borbás apud Rechinger 1. c. 54)

d. ssp. agrestis (Simk.) Rchb. f. — O: Gusztávműve (1. c. 47)

370. *R. stenophyllus* Ledeb. (Keskenylevelű lórom)

O: Magyarbóly (Zsák)

371. *R. hydrolapathum* L. (Vízi lórom)

Pécs „környéke” (Maj. 37, K.-Nendtv. 565, BK 19, A) — O: Páprád (!) — D: Kisdárda (Knapp), Laskó (Simk. 198)

372. *R. crispus* L. (Fodros lórom)
Vulgaris. Közönséges.
373. *R. patientia* L. (Paréj lórom)
J: Mecsekalja (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — H: Palé (!) —
ZS: Kaposvár (Lengyel 1. c. 54) — O: Pécs (!), Rónádfa (Rechinger Rep.
sp. nov. 1933 249)
374. *R. Kernerii* Borb. (= *R. confertoides* Bihari) (Kerner-féle lórom)
J: Kövágószőlős, Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek“ (!Borbás apud
Bihari MBL 1928 74), Lapis-Vágot (!)
375. *R. acetosella* L. (Madársóska)
Vulgaris. Közönséges. — *b. multifidus* (L) Lam. et DC. — T: Pécs
(Maj.! apud Horv. Borbásia II 27) — Ma: Baksa (!)
376. *R. acetosa* L. (Mezei sóska)
Vulgaris. Közönséges.
R. thyrsiflorus Fingerh. — T: Pécs (Horv. Borbásia I 94) — V: Har-
sány (l. c.) — Secundum Bihari tantum *acetosa*.
? *R. aquaticus* L. — Pécs (Nendtv. 30, K.-Nendtv. 565, Simk. 198)
R. scutatus L. — Culta et subspontanea — Pécs (Maj. 37) — V:
Máriagyűd (Simk. 198)
377. *R. pratensis* M. et K. (*R. crispus* × *R. obtusifolius*) — O:
Gusztávműve (Borbás apud Rechinger BBC 1932, 96)
378. *R. confusus* Simk. (*R. crispus* × *R. patientia*)
D: Veresmart (Bihari apud Rechinger Rep. sp. nov. 1933 272)
378. a. *R. erubescens* Simk. (*R. obtusifolius* × *R. patientia*)
O: Rónádfa (Borbás: A Balaton flórája 342)
379. *Polygonum amphibium* L. (Vidra keserűfű)
Baranya (Sz!) — Ma: Villány (*b. terrestre* Leyss. Simk. 197) — O:
Sellye (*b. 1. c.*) — D: Mohács (MAN 256, *b. Knapp*)
380. *P. lapathifolium* L. (Lapulevelű keserűfű)
Vulgaris. Közönséges.
ssp. tomentosum (Schrk.) Danser — J: Abaliget (Simk. 198) — Z:
Hosszúhetény (!) — SZ: Szekszárd „Bat“ (Hollós 101) — O: Pécs, Magyar-
mecske „Gyöngyfa“ (!)
- b. Brittingeri* Opiz — J: Abaliget (Horv. Borbásia I 96)
381. *P. persicaria* L. (Baraklevelű keserűfű)
Pécs „környéke“ (!Maj.!, Simk. 198) — O: Pécs „Balokány“, Páp-
rád (!), Sellye (Simk. 198) — D: Dárda (Kit. 1. 26)
382. *P. minus* Huds. (Keskenylevelű keserűfű)
SZ: Bába (Hollós 101—2) — O: Pécs (!Kit. Add. 59, ! apud Jáv. AMNH
1935 70), Sellye (!), Harkány (Simk. 198) — D: Dárda (Kit. N I 88)
383. *P. mite* Schrk. (Szelíd keserűfű)
J: (!) — O: Pécs (!), Sellye (Simk. 198), Drávaszabolcs (Kit. 1. 14.)
384. *P. hydropiper* L. (Borsos keserűfű)
Pécs „környéke“ (!Nendtv. 29, Maj.!, 37) — O: Drávaszabolcs (Kit.
1. 14) — D: Dárda (1. c. 27)
385. *P. aviculare* L. (Madár keserűfű)
Vulgaris. Közönséges. — *b. erectum* Roth — V: Villány (!) —
c. rotundifolium Schur — T: Pécs „Szkokó“ (!) — Ma: Palotabozsok (Bs.)
P. orientale L. — Culta et subspontanea — Pécs (Maj.!), „Megyer“—
Pellérd (NV!)

P. patulum M. B. b. *Kitaibelianum* Sadl. — T: Mecsekalja (Rácváros) „Rihmer-szőlő” (K.-Nendtv. 568, 572) secundum exemplar originale Nendtvichi = *persicaria* (Simk. 198)

386. *Fagopyrum dumetorum* (L) Schreb. (Sövény pohánka)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29), „Lapis” (Simk. 198) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 102)

387. *F. convolvulus* (L) H. Gross. (Szulák pohánka)

Vulgaris. Közönséges.

F. sagittatum Gilib. — Culta et subspontanea — V: Vokány „Terentás” (Simk. 198) — SZ: Szekszárd „Bat”, Palatinca, Bonyhád (Hollós 102)

Chenopodiaceae. Labodafélék.

388. *Polycnemum Heuffelii* Láng (Heuffel-torzonja)

Pécs „környéke” (Balek ÖBW 1852 14) — J: (NV! apud Horv. PM4 15) — O: Harkány (Zsák)

389. *P. verrucosum* Láng (Bibircses torzon)

V: Harsány (1. c.) — Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 198) — D: Dárda (1. c.)

390. *P. arvense* L. (Mezei torzon)

Vulgaris. Közönséges. — ssp. *majus* (A. Br.) Briqu. — J: (NV! apud Horv. PM2 6), Kővágószőlős (Simk. 198) — T: Pécs „Mecsek” (1. c.) — Z: Váralja (1. c.) — O: Harkány (1. c.)

391. *Chenopodium botrys* L. (Rubianka libatalp)

T: Pécs „környéke” (Nendtv. 20, Maj. 30), „Bányatelep” (Bs.) — SZ: Szekszárd „Bakta” (Hollós 102) — O: Sellye (!) — D: Dárda (Simk. 199)

392. *Ch. bonus Henricus* L. (Paraj libatalp)

J: (Simk. 199) — T: Pécs „Mecsek” (1. c., Nendtv. 20, NV!)

393. *Ch. polyspermum* L. (Sokmagvú libatalp)

Pécs „környéke” (Nendtv. 20, Maj. 30) — H: Bükkösd (Zsák) — O: Sellye (Simk. 199) — D: Mohácssziget (Bs.)

394. *Ch. vulvaria* L. (Büdös libatalp)

J: Abaliget (Simk. 199) — Z: Püspöknádasd (1. c.) — O: Gordisa (1. c.), Pécs „környéke” (!Nendtv. 20) — D: Magyarbóly (Zsák)

395. *Ch. hybridum* L. (Pokolvarfű)

Pécs „környéke” (!Nendtv. 20, Maj. 30) — Ma: Fazekasboda, Göröcsöny (!), Kékesd (Kit. 1. 20) — SZ: Szekszárd (Hollós 102) — D: Mohács (!Knapp)

396. *Ch. opulifolium* Schrad. (Bangitalevelű libatalp)

Pécs „környéke” (!Maj. 30, NV!) — T: Pécs „Szkokó” (!) — D: Mohács (Knapp)

397. *Ch. album* L. (Fehér libatalp)

Vulgaris. Közönséges. — b. *viride* (L) Wahlbg. — T: Pécs (Kit. 1. 9) — D: Mohács (!)

398. *Ch. urbicum* L. (Faluszéli libatalp)

Pécs „környéke” (!Nendtv. 20, K.-Nendtv. 567) — T: Pécs „Szkokó” (!) — Ma: Kozármisleny (Kit. 1. 10) — O: Becefa, Botykapeterd (Kit. 1. 4)

399. *Ch. murale* L. (Kőfali libatalp)

Pécs „környéke” (Nendtv. 20) — D: Mohács (!)

400. **Ch. glaucum** L. (Fakó libatalp)
T: Pécs (!Nendtv. 20) — D: Mohács (Knapp) — SZ: Szekszárd (Hollós 102)
401. **Ch. rubrum** L. (Vörös libatalp)
Pécs „környéke” (Maj. 30) — D: Kisdárda (Knapp)
Ch. capitatum (L) Aschers. — Pécs (Maj. 30) tantum in horto (Maj.!)
Ch. ambrosioides L. — Culta et subspontanea — Baranya (Nendtv. 20, Kit. apud N I 85) — J: Kővágószőlős (Simk. 199) — T: Pécs „Mecsek” (Kit. 1. 6, 22, Maj.!) — Ma: Nagypeterd (Kit. 1. 30), Dunaszekcső (K.-Nendtv. 570, NV!) — O: Sellye (1. c.)
402. **Atriplex hortensis** L. (Kerti laboda)
Subspontanea — T: Pécs (Nendtv. 18, Simk. 199, BK 23, A)
403. **A. nitens** Schk. (Fényes laboda)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 13, 18, Maj. 30)
404. **A. tatarica** L. (Tatár laboda)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 18), Szokó (!) — Ma: Fazekasboda (!)
— SZ: Szekszárd „Bakta”, Bonyhád (Hollós 102)
405. **A. rosea** L. (Fehér laboda)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 18, NV!) — Z: (Kit. 1. 19), Hosszúhetény (1. c. 17) — Ma: Kozármisleny (1. c. 10) — O: Botykapeterd (1. c. 4), Sellye (Simk. 199)
406. **A. hastata** L. (Dárdás laboda)
T: Pécs „környéke” (Maj. 30) — Ma: Somberek (Zsák) — SZ: Szekszárd (Hollós 102, Lengyel 1. c. 48) — ZS: Kaposvár (Lengyel 1. c. 53) — O: Szigetvár, Drávaszabolcs (Kit. 1. 4, 14), Sellye (**b. salina** Wallr. (= **incana** Neilr.) Simk. 199) — D: Mohács (Knapp)
407. **A. oblongifolia** W. et K. (Hosszúlevelű laboda)
Pécs „környéke” (!Nendtv. 18, BKA) — SZ: Szekszárd (Hollós 102)
408. **A. patula** L. (Terebélyes laboda)
T: Pécs „környéke” (!NT, NV!, BK 23 A), „Szokó” (!) — Z: Pécs-várad (Zsák) — H: Bükkösd (Zsák) — SZ: Szekszárd „Bakta” (Hollós 102) — O: Szentlőrinc (Kit. 1. 4), Sellye (Simk. 199) — D: Mohács (Zsák)
409. **Kochia scoparia** (L) Schrad. (Kerti seprőfű)
Subspontanea — J: Abaliget (Bs.), Mecsekalja (!) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 13, 30, Maj. 30, Kit. 1. 9) — Ma: Kékesd (1. c. 20), Palotabozsok (Bs.) — SZ: Szekszárd „várdomb” (Hollós 102) — O: Sellye (Simk. 199) — D: Mohács (Knapp, Zsák)
410. **K. laniflora** (Gmel.) Borb. (Homoki seprőfű)
O: Pécs „környéke” (Maj. 30)
411. **Salsola ruthenica** Iljin (= **kali** L.) (Ballagófű)
T: Pécs „környék” (Maj. 29), „Üszög” (Kit. 1. 21) — Z: Hidas (1. c. 10) — SZ: Bonyhád (Kit. 2. 14) — D: Mohács (Knapp)

Amaranthaceae. Amarántfélék.

412. **Amaranthus retroflexus** L. (Disznóparéj)
Vulgaris. Közönséges.
A. hypochondriacus L. — Subspontanea — T: Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 566) — O: Drávasztára (Simk. 198)

A. caudatus L. — Subspontanea — Pécs (Maj. 29) — SZ: Szekszárd „Bakta” (Hollós 102)

413. *A. albus* L. (Fehér amaránt)

Adventiva — T: Pécs (Horv. PM4 13), „Üszög” (Kit. 1. 10) — O: Sellye (!)

414. *A. angustifolius* Lam. (Cigányparéj)

J: (!Soó) — T: Pécs „környéke” (Maj. 29) — V: Siklós, Nagyharsány (Zsák) — D: Mohács (Knapp), Magyarbóly (Zsák)

415. *A. adscendens* Lois. (Zöld amaránt)

T: Pécs (!Nendtv. 17, Kit. 1. 9) — SZ: Szekszárd (Hollós 102) — O: Drávasztára (Simk. 198) — O: Dárda (1. c.), Mohács (Knapp)

416. *A. crispus* (Lesp. et Théven.) Terrac. (Bodros amaránt)

Adventiva — H: Dombóvár (Bs.) — D: Mohács (Horv. Borbásia I. 94)

417. *A. deflexus* L. (Vöröslő amaránt)

Adventiva — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 17, Bs.) — H: Dombóvár (Bs.)

418. *A. blitoides* Watson (Labodás amaránt)

Adventiva — H: Dombóvár (Boros BK 1938 312)

Phytolaccaceae. Alkőrmösfélék.

419. *Phytolacca americana* L. (Alkőrmös)

Subspontanea — J: Magyarürög (BKA) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 28) — Ma: Túrny (Kit. 1. 14) — SZ: Szekszárd „Remete” (Hollós 102) — O: Drávasztára (Simk. 174) — D: Kisdárda (Zsák apud Soó Bot. Arch. 1927 353)

Portulaccaceae. Porcsinfélék.

420. *Montia fontana* L. ssp. *minor* Gmel. (= *verna* Neck.) (Monti-füve)

J: „Pöcök-hegyoldal” (Simk. 175)

421. *Portulaca oleracea* L. (Kövérr porcsin)

Vulgaris. Közönséges.

Caryophyllaceae. Szegfűfélék.

422. *Stellaria aquatica* (L) Scop. (Víz csillaghúr)

Vulgaris. Közönséges.

423. *S. media* (L) Vill. (Tikhúr)

Vulgaris. Közönséges. — *b. neglecta* (Weihe) M. et K. — V: Villány (Simk. 173)

424. *S. holostea* L. (Olocsán csillaghúr)

J: (!Kit. 1. 8), Abaliget, Orfű, Szentlőrinc, Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 32), „Bányatelep”, „Nagymélyvölgy” (!), „Kantavár” (!Kit. 1. 9), Pécsbudafa (!) — Z: (Horv. TTK. 1. c.), Zobák (!) — V: Harsány (!Simk. 173) — Ma: Villánykövesd, Feked (Horv. É. 11, 12), Németpalkonya, Borjád, Pellérd, Göröcsöny, Baksa (!) — H: Kisvaszar, Bakóca (Horv. É. 13, 12), Högyész, Szentbalázs (!), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 37), „Bat”, „Csatár”, Belac, Bataapáti



(Hollós 102) — ZS: Kaposújlak (Bs.), Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi, Tótfalui erdő” (!) — O: Okorág, Czinderybogád, Szentegát, Bánfa, Marócsa (!)

425. **S. graminea** L. (Pázsitos csillaghúr)

Vulgaris. Közönséges.

426. **S. palustris** Retz. (Mocsári csillaghúr)

T: Orfű „Sárkánykút” (K.-Nendtv. 568, 572)

427. **Cerastium glomeratum** Thuill. (Gomolyos madárhúr)

T: Pécs „környéke” (Nendtv. 20, Sz!) — Z: Zobák (!)

428. **C. brachypetalum** Desp. (Kisvirágú madárhúr)

J: Abaliget (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 20) — V: Harsány (!Simk. 172) — SZ: Szekszárd „Bükk” (Hollós MBL 1914 59) — **b. tauricum** (Spr.) Koch — T: Pécs „Mecsek” (Horv. Borbásia II 27)

429. **C. caespitosum** Gilib. (Gyepes madárhúr)

Vulgaris. Közönséges.

430. **C. semidecandrum** L. (Béka madárhúr)

V: Harsány (Simk. 172, Bs.)

431. **C. glutinosum** Fr. (Enyves madárhúr)

T: Pécs „Mecsek” (Simk. 172) — V: Harsány (1. c.) — Ma: Baksa (**b. agricola** Murr.!) — SZ: Szekszárd (Bartal 37, Hollós 102), Zsibrik, Palatinca (1. c.)

432. **C. silvaticum** W et K. (Erdei madárhúr)

J: Orfű (Bs.), „Szuado” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, 20), „Nagymélyvölgy” (Soó), „Kismélyvölgy” (Simk. 173), Mánfa „Sikonda” (!) — Z: Püspöknádasd (Simk. 173), Pécsvárad (!) — ZS: Gálosfa (Kit. Add. 211), Töröcske „Rapol” (!) — O: Sellye (Simk. 173), Marócsa (!)

433. **C. arvense** L. (Parlagi madárhúr)

T: Pécs „környéke” (Maj.!)

434. **C. anomalum** W. et K. (Sziki madárhúr)

O: Pécs (Nendtv. 14, 20, NV!), „Megyer”, Nagyárpád (K.-Nendtv. 570)

C. tomentosum L. — Cultum et subspontaneum — Pécs (!)

435. **Holosteum umbellatum** L. (Olocsán)

Vulgaris. Közönséges.

436. **Moenchia mantica** (L) Bartl. (Mönchia)

J: Orfű, Hetvehely, Mecsekalja (!), Kővágószőlős (Simk. 173), Abaliget (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, 20), „Bányatelep” (Simk. 173), „Szkokó”, Mánfa „Sikonda”, Komló (!) — Z: Hosszúhetény, Zobák, Hármashégy (!) — V: Harsány (!Janka apud N II 81), Máriagyűd (!) — Ma: Erdősmecske, Görcsöny, Baksa, Vokány, Kistótfalu (!) — H: Szentbalázs (!) — ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 34), Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi, Tótfalui erdő” (!) — O: Harkányfürdő (Janka apud N II 81), Pécs (!), „Megyer” (K.-Nendtv. 570), Páprád „Tilos erdő” (Horv. E. 15), Kákics (lus. *violacea* Anzavour!)

437. **Sagina procumbens** L. (Heverő szagján)

J: (Simk. 173), Magyarürög (K.-Nendtv. 568, 572) — T: Pécs „környéke” (Maj. 29) — Z: Püspöknádasd (Simk. 173) — V: Máriagyűd (1. c.) — O: Harkány (1. c.)

438. *S. ciliata* Fr. *b. depressa* F. Schltz. (Pillás szagján)
Baranya (Simk. 173) — J: (Simk.! 173) — Z: Püspöknádasd (1. c.) —
ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 34) — O: Pécs, Harkány,
Sellye (Simk.! 173)
439. *S. subulata* (Sw.) Presl. (Szálkás szagján)
J: (1. c.), Kővágószőlős (1. c.), Magyarürög (Sz!) — T: Pécs „Szkokó” (!)
— O: Harkány (Simk. 173)
440. *Minuartia viscosa* (Schreb.) Schinz et Thell. (Enyves lúdhúr)
Baranya (Maj. 29) — J: Kővágószőlős (Simk.! 172) — O: Sellye
(Simk.! 172)
441. *M. fastigiata* (Sm.) Rchb. (Nyalábos lúdhúr)
T: Pécs „Mecsek” (Maj.! 29, NV!, Simk. 172) — V: Harsány (!Janka
ÖBZ 1867 127)
442. *M. setacea* (Thuill.) Hay. (Sertelevelű lúdhúr)
T: Pécs „Mecsek” (Maj.! 29, K.-Nendtv. 566)
443. *M. verna* (L.) Hiern. (= *caespitosa* (Ehrh.) Deg.) (Tavaszi lúdhúr)
T: Pécs „Mecsek” (Maj.! 29, K.-Nendtv. 565, 566, BK 9) — V: Har-
sány (!Simk. 172) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 102)
444. *Arenaria serpyllifolia* L. (Kakukhúr)
Vulgaris. Közönséges.
ssp. leptoclados (Guss.) Oborny
V: Villány (Zsák) — SZ: Szekszárd „Remete” (Hollós 102)
445. *Moehringia trinervia* (L.) Clairv. (Csitre)
J: (Bs.), Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 29), „Kantavár” (Kit.
1. 9.), „Mélyvölgy”, „Árpádtető” (!) — Z: (Kit. 1. 18), Pécsvárad (!), Vár-
alja (Zóly.) — V: Harsány (!Simk. 173) — Ma: Erdősmecske „Alapítványi
erdő” (Horv. É. 12), Görcsöny, Borjád (!) — H: Palé (1. c. 13) — SZ:
Szekszárd „Sárosalja erdő” (Hollós MBL 1914 59), „Óriás-h.” (Bs.) —
ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő”, Töröcske „Rapol” (!) — O: Páprád „Tilos
erdő” (Horv. É. 15), Marócsa (!)
? *M. muscosa* L. — Pécs (Maj. 29) — J: (Kit. 1. 8)
446. *Spergula arvensis* L. (Csibehúr)
T: Pécs „környéke” (Maj. 29), Mecsekjánosi (K.-Nendtv. 568, 572)
? *S. pentandra* L. — Pécs „környéke” (Maj. 29, Maj. K.)
447. *Spergularia rubra* (L.) Presl. (Piros budavirág)
J: Petőc, Mecsekalja (!) — T: Pécs (Simk. 172), Mecsekjánosi
(K.-Nendtv. 567, 571) — Z: Püspöknádasd (Simk. 172) — O: Sellye (1. c.),
Harkány (Zsák)
448. *Herniaria glabra* L. (Kopasz porcika)
M: (Maj.!) — J: (!Simk. 173), Mecsekalja (!), Magyarürög (Kárp.)
449. *H. hirsuta* L. (Borzas porcika)
Baranya (Maj.! 29)
? *H. incana* Lam. — Baranya (Maj. 29)
450. *Scleranthus annuus* L. (Egynyári szikárka)
Vulgaris. Közönséges.
451. *S. perennis* L. (Evelő szikárka)
Pécs „környéke” (Maj.! 29)
452. *Agrostemma githago* L. (Konkoly)
Vulgaris. Közönséges.

453. *Viscaria vulgaris* Bernh. (Enyves szegfű)

J: (!Kit. 1. 8) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 26), „Bányatelep”, „Melegmányivölgy” (!)

454. *Silene cucubalus* Wib. (= *vulgaris* (Mnch.) Garcke) (Hólyagos habszegfű)

In regione montana vulgaris. Hegyvidéken közönséges. — D: Mohács (Knapp) — *b. latifolia* (Mill.) Sch. et Th. — T: Pécs „Mecsek” (Horv. Borbásia I 96) — *c. oleracea* Ficin — J: (Soó)

455. *S. otites* (L.) Wib. *ssp. pseudootites* (Bess.) Gräbn. (Fodrosszirmú habszegfű)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 21 *sub otites*), Havihegy (!) — V: Harsány (!Simk. 174, Kit. 1. 12 *sub otites*), Beremend (1. c. 28 *sub otites*) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár”, „Petre” (Hollós 102 *sub otites*) — O: Gordisa (Horv. PM2 7)

456. *S. dichotoma* Ehrh. (Villás szegfű)

T: Pécs „környéke” (Nendtv. 19, 31), „Havihegy” (Simk. 174) — Z: Hosszúhetény (WK. Ic. I. 28), Váralja (Kit. 1. 24)

457. *S. multiflora* (Ehrh.) Pers. (Sokvirágú habszegfű)

O: Pécs „környéke” (Maj. apud Horv. PM2 6)

458. *S. nemoralis* W. et K. (Berki sziléne)

V: Harsány (!Kárpáti BK 1935 199), „Feketehegy” (1. c.) — *S. italica* Pers. *b. laxiflora* Neilr. — Pécs (Janka ÖBZ 1867 232) ad hoc pertineat?

459. *S. viridiflora* L. (Zöld virágú sziléne)

Baranya (Kit. apud N I 290) — J: (!Kit. 1. 8), Mecsekalja (!), Magyar-ürög (Kit. 1. 22) — T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 174), „Daindol”, „Kantavár”, „Lámpás” (Kit. 1. 8, 9, 22), Somogy „Ferkőirtás” (Bs.) — Z: Hosszúhetény (1. c. 17), Pécsvárad (Bs.), Szászvár „Dobogó” (!), Püspöknádasd (Simk. 174) — V: Villány (1. c.) — Ma: Vokány (Kit. 1. 11), Erdősmecske „Alapítványi erdő” (Horv. É. 12) — H: Kisvaszar (1. c.), Högyész (!) — ZS: Kaposszerdahely „Rapol” (!)

460. *S. nutans* L. (Kónya habszegfű)

In regione montana collinaeque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — *lus. rubens* (Vest.) Rohrb. — T: Pécs „Lapis”-Vágot (Horv. Borbásia II 27)

S. armeria L. — Semispontanea — T: Pécs „Mecsek” (NT, Maj.!, K.-Nendtv. 568)

461. *Lychnis coronaria* (L.) Desr. (Bársonyos szűnyogvirág)

J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 16, Kit. apud N I 292), „Kantavár” (1. c.), „Lámpás” (Kit. 1. 7.), „Makár” (Nendtv. 14) — V: Villány (Simk. 173) — Ma: Fazekasboda (Kit. apud N I 292), Nagynyárad (Janka 1. c. 57), Villánykövesd (Horv. É. 11), Borjád (1. c.), Hercegtóttós (!) — H: Lengyel (Jáv.-Zóly.), Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 102) — O: Alsószentmárton (!)

462. *L. flos-cuculi* L. (Kakukszegfű)

J: Abaliget (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 26) — Z: Hosszúhetény (Simk. 173) — Ma: Erdősmecske, Bisse (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 37), „Bat” (Hollós 102) — ZS: Kaposvár (KH!) — O: Dráva szabolcs (!)

463. **Melandrium noctiflorum** (L) Fr. (Esti mécsvirág)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 31), „Kantavár” (Kit. 1. 31) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Villány (Simk. 173) — Ma: Borjád, Erdősmecske „Alapítványi erdő” (Horv. É. 11, 12) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 102) — O: Kémes (Zsák) — D: Magyarbóly (Zsák)

464. **M. album** (Mill.) Garcke (Fehér mécsvirág)

Vulgaris. Közönséges.

465. **M. diurnum** (Sibth.) Fr. (= **silvestre** (Schk.) Roehl.) (Piros mécsvirág)

J: Orfű „Szuado” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 26, Maj. 29), „Lapis”, „Lámpás”, „Mély”-, „Melegmányivölgy”, Mánfa „Sikonda” (!) — Z: (!Simk. 173, lus. *albiflora*!), Hosszúhetény „Bikarét” (!) — V: Máriagyűd, Kistótfalu (!)

466. **Cucubalus baccifer** L. (Szegefűbogó)

J: (!Kit. 1. 8.) — T: Pécs „Mecsek” (PM. It. 142, NV!, BKA), „Daindol” (Kit. 1. 8.) — Z: Hosszúhetény (1. c. 17) — V: Villány (!), Harsány (!Simk. 172) — Ma: Geresd (Kit. 1. 21), Feked (Horv. É. 12) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Sötétvölgy”, Belac, Szálka (Hollós 102) — O: Sellye, Gordisa (Boros MBL 1924 33), Sósvertike (!)

467. **Gypsophila muralis** L. (Dercefű)

Vulgaris. Közönséges.

G. acutifolia M. B. — *Culta et subspontanea* — Pécs „környéke” (NT, Maj. K.)

468. **G. paniculata** L. (Fátyolvirág)

O: Pécs „környéke” (Maj. 29), Drávasztára (Simk. 173 frustra quae-sivit!)

469. **Tunica saxifraga** (L) Scop. (Kötörő szegfű)

H: Högyész (!) — O: Pécs „környéke” (Maj. 29), Gordisa (!) — **b. rigida** (L) Boiss. — O: Harkány (Simk. 174)

470. **T. prolifera** (L) Scop. (Aszuszegfű)

J: (!), Mecsekalja (!) — T: Pécs „környéke” (!Nendtv. 21, Kit. 1. 6) — Z: Szászvár (!) — V: Harsány (!Simk. 173, Kit. 1. 12), Siklós, Beremend (1. c. 14, 28) — SZ: Bonyhád (Hollós 102) — O: Sellye (!Simk. 173), Alsó-szentmárton, Harkány, Baranyahídvég, Páprád „Bükkhát” (!)

471. **Vaccaria pyramidata** Medic. (Tinóöröm)

T: Pécs „környéke” (Nendtv. 31, Simk. 173) — V: Villány (1. c.) — SZ: Szekszárd „Bakta”, Szálka (Hollós 102)

472. **Dianthus Pontederæ** Kern. (*D. carthusianorum* auct.) (Magyar szegfű)

J: (!Kit. 1. 8), Szentlőrinc (!) — T: Pécs „környéke” (!Nendtv. 21, lus. *lactiflorus* Kárp. (1939) Horv. Borbásia II 27, sine nomine PM4 19 1936), Mecsekszabolcs (!) — Z: (!), Hosszúhetény (!) — V: Villány (!Simk. 173), Máriagyűd, Villánykövesd (!) — Ma: Borjád, Feked (Kit. 1. 12), Hercegszabar, Erdősmecske (!) — H: Högyész (cum *n. monstr. ramosus* Horv.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 37), „Csatár”, Szálka, Alsónána (Hollós 102) — ZS: Kaposmérő (Kárp. apud Boros MBL 1924 34) — O: Kákics, Vajszló (!)

473. **D. giganteiformis** Borb. (Harsányi szegfű)

Z: Hármashegy (Kárp.) — V: Harsány (!Jávorka: Magyar Flóra 337)

474. *D. armeria* L. (Szeplő szegfű)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Páprád „Tilos erdő” (Horv. É. 15)

475. *D. armeriastrum* Wolfn. (Déli szegfű)

V: Harsány (Boros MBL 1924 33) — O: Sellye (Horv. PM4 18)

476. *D. barbatus* L. (Szakállas szegfű)

T: Pécs „Mecsek” (NT, Kit. 1. 7, Simk. 173), „Makár” (Nendtv. 21 *sub trifasciculato*, vide ibi!), „Daindol”, „Lámpás” (Kit. 1. 8, 7, BK 22 A), Mecsekszabolcs (*b. ramosus* Horv. NV! apud Horv. II 27) — H: Kisvaszar (Horv. É. 12), Lengyel (Filarszky!) — SZ: Bonyhád (secundum Hollós 102 tantum subsponsaneus, verisimiliter spontaneus!) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — O: Sellye (typus! cum *b.* Horv. Borbásia II 27), Rónádfa (Borbás! apud Soó Bot. Arch. 1927. 353—4)

? *D. collinus* W. et K. — J: (Kit. apud N I 286)

? *D. serotinus* W. et K. — Baranya (Maj. 29) Numquid Majeri planta de territorio nostro sit?

D. trifasciculatus Kit. — (Nendtv. 14, K.-Nendtv. 570) = *barbatus* (Janka apud N II 82), addendum: verisimiliter *b. ramosus* Horv.

477. *Saponaria officinalis* L. (Szappanfű)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30), Komló (!) — SZ: Szekszárd „Bakta”, „Remete”, „Petre” (Hollós 102)

Nymphaeaceae. Tündérrózsafélék.478. *Nymphaea* (= *Castalia*) *alba* L. (Fehér tündérrózsa)

O: Pécs „környéke” (Nendtv. 27), Drávaszabolcs (Simk. 176), Gordisa (1. c.), „Matty-tó” (!Boros MBL 1924 35) — D: Dárda (Kit. 1. 26), Kopács, Földvári-tó (Várady 68), Riha-tó (!)

479. *Nuphar luteum* (L) Sm. (Tavirózsa)

O: Pécs „környéke”, Drávaszabolcs (!Simk. 176, Kit. 1. 14), Gordisa „Matty-tó” (!Boros MBL 1924 35), „Ódráva” (!) — D: Dárda (Kit. 1. 26.)

Ceratophyllaceae. Tócsagazfélék.480. *Ceratophyllum submersum* L. (Sima tócsagaz)

O: Harkány (!Simk. 200), Sellye (Boros! apud Soó MBIM. 1928 68)

481. *C. demersum* L. (Érdes tócsagaz)

Ma: Villány (Simk. 200) — O: Sellye, Gordisa (Boros MBL 1924 35, Maj.), „Matty-tó” (!) — D: Riha-tó (Boros MBL 1922 71)

Ranunculaceae. Boglárkafélék.482. *Paeonia officinalis* L. v. *banatica* (Roch.) Gräbn. (Pünkösdi rózsa, pévenye)

M: (!Maj. 31) — Z: Pécsvárad (!Janka ÖBZ 1866 398), Hosszúhetény-Pécsvárad (!Kit. Add. 184), Püspökszentlászló (!), Hosszúhetény (!K.-Nendtv. 567, 571, 566 Kerner non credit!), „Bikarét” (Horv. TTK 1924 66), Hármashegy (Horv. PCGE 1934 10, Kárp. apud Tatár o. c. 21.)

483. *Caltha palustris* L. (Mocsári gólyahír)

Vulgaris. Közönséges.

? *Trollius europaeus* L. — O: Pécs „környéke” (Maj.! apud Horv. PM2 4, Jávorka BK 1934 258)484. *Helleborus odoratus* W. et K. (Illatos hunyor)

M, V, Ma, H, SZ vulgaris. M, V, Ma, H, SZ közönséges. — ZS, D, deest. ZS, D hiányzik. — O: tantum ad limites. Csak a szélén. — Gyöngyfa-Magyarmecske „vasúti állomás” (!) — Formae: **b. angustifolius** Beck — T: Pécs „Mecsek” (Horv. Borbásia I 96) — Ma: Baksa, Hercegszabar (!) — H: Szentbalázs, Högyész, Nagytrecsény, Palé, Kisvaszar, Gyöngyfa — **c. latifolius** Beck — T: Pécs „Mecsek” (Horv. 1. c.) — V: Harsány (!) — Ma: Erdősmecske „Alapítványi erdő”, Villánykövesd, Göröcsény, Borjád, Geresd (!) — **d. laceratus** K. Maly — T: Pécs „Mecsek”, Komló (!) — Z: Szászvár „Dobogó” (1. c.) — V: Máriagyűd (!) — Ma: Erdősmecske (Horv. É. 12) — H: Högyész (!) — **e. mecsekensis** Horv. — Z: (1. c.) — Praeterea multae formae ad enarratas vergentes. — **f. purpureiformis** Horv. — T: Pécs „Mecsek” (1. c.) — **g. Jávorkae** Horv. — H: Högyész (Horv. Borbásia II 27)

H. niger L. — Pécs „környéke” (Maj. 31) ut spontaneus certe erroneo publicatus jam (K.-Nendtv. 564)

H. purpurascens W. et K. — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 24), Orfű „Sárkánykút” (K.-Nendtv. 570) = *odoratus* f. *purpureiformis* Horv. (Borbásia I. 76)

H. dumetorum W. et K. — Pécs „környéke” (Maj. 31) erroneo publicata (Horv. PM4 16)

H. viridis L. — Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 567) = *odoratus*.

485. *Nigella arvensis* L. (Kandilla)

Vulgaris. Közönséges.

N. damascena L. Culta et subspontanea — Pécs (Maj.! 31, BK 41)

486. *Isopyrum thalictroides* L. (Galambvirág)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 24), „Lapis”-Vágot, „Bányatelep”, „Nagy-mélyvölgy”, Pécsbudafa (!) — Z: (Horv. TTK 1. c.), Hosszúhetény (Simk. 179), Szászvár (**b. pubescens** Wierzb. Horv. Borbásia II 27) — V: Villány (!Simk. 179) — Ma: Nagypárad (**b.** Horv. 1. c.), Németpalkonya (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Sötétvölgy” (Hollós 103) — ZS: Kaposújlak (Boros VSz 1936 83)

487. *Actaea spicata* L. (Békabogyó)

T: Pécs „Mecsek” (Maj.! 31), „Kantavár” (Kit. 1. 10, K.-Nendtv. 566, 569, Maj. K. apud Horv. PM2 10) — V: Zobák „Hidasi völgy” (Horv. PM4 18) — H: Kisvaszar (Horv. É. 12), Nagytrecsény (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Hollós 103) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14), Kaposvár „Nádasdi erdő”, Töröcske „Rapol” (!)

Aquilegia vulgaris L. — Culta et forsitan tantum subspontanea —

J: (Maj. 25, 31, hic secundum Maj. tantum subspontanea) — Z: Pécs-várad (!)

488. *Consolida regalis* S. F. Gray (Mezei szarkaláb)

Vulgaris. Közönséges. — *b. albiflora* Borb. — O: Pécs (Horv. Borbásia II. 27), Mecsekalja (!)

ssp. paniculata (Host) Soó — T: Pécs (Nendtv. I apud Soó ÖBZ 1922 244)

489. **C. orientalis** (Gay) Schröd. (Keleti szarkaláb)

Pécs (!Görlitz! apud Uechtritz ÖBZ 1866 287)

C. ajacis (L) Schur — Culta et subsponsanea — T: Pécs „Mecsek” (Maj. 31, BKA) — V: Villány (!)

490. **Aconitum vulparia** Rchb. (incl. **b. galactonum** Rchb.) (Farkasölő sisakvirág)

J: (!Maj! apud Horv. PM2 4, Simk. 179), Orfű „Szuado”, Hetvehely, Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 16), Somogy „Csatornavölgy” (Bs.) — Z: (!Kit. 1. 18), Szászvár „Dobogó” (!) — Ma: Vokány (1. c.), Apátvarasd (Horv. É. 12) — H: Kisvaszar (1. c. 13), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 103)

491. **A. anthora** L. (incl. **b. Jacquini** Rchb.) (Méregölő sisakvirág)

T: Pécs „Mecsek” (!PM. It. 142), „Havihegy” (!Maj. K. apud Horv. PM2 10), „Bertalan-szikla” (Horv. PK 28 5), „Lapis”, „Tettye”, Mecsek-szentkút (K.-Nendtv. 569) — V: Harsány (Horv. PM2 9, Kit. 1. 12)

492. **Pulsatilla nigricans** Störck. (Fekete kökörcsin)

J: Magyarürög (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29), „Bányatelep” (!) — Z: Hosszúhetény (Simk. 179) — V: Harsány (!Simk. 179), „Feketehegy”, Máriagyűd (Horv. PM4 19) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 37), „Bat” (Hollós 103), „Óriás-h.” (Bs.)

493. **P. grandis** Wender. (Leánykökörcsin)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 9, 29), „Havihegy” (!Maj. K. apud Horv. PM2 10), „Bertalan-szikla”, „Frühweiss” (!) — V: Harsány (Horv. PCGE 1937 19), „Feketehegy”, Máriagyűd (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (!Bartal 37), „Bat”, Szálka (Hollós 103)

494. **Anemone silvestris** L. (Erdei pácics)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17, Maj. I (**b. major** Janczewski!) 31), „Szaniszló-pihenő” (BKA), „Kőlyuk”, „Árpádtető” (!) — Z: Hosszúhetény (**b.** Horv. Borbásia II 27), Püspöknádasd, Magyaréregy (!), Pécsvárad (**b.** Sz!) — SZ: Szekszárd „Petre”, „Bat”, „Csatár” (Hollós 103), „Óriás-h.” (Bs.) — ZS: Kaposvár (KH!)

495. **A. ranunculoides** L. (Bogláros pácics)

J: (!), Hosszúhetény, Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17), „Bányatelep”, „Lapis”, „Nagymélyvölgy” (!hic cum **b. latisepta** Schur Horv. Borbásia II 27), Pécsbuda, Magyarszék (!) — Z: (Horv. TTK 1. c.), Zobák, Püspöknádasd (!) — V: Villány (!Simk. 179) — Ma: Nagynyárád (Janka ÖBZ 1867 161), Németpalkonya, Villánykövesd (Horv. É. 11), Véménd (!), Ivánbattyán (**b.** Horv. Borbásia II 27), Baksa (**b.**!) — H: Bakóca (**b.** 1. c.), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.), Högyész (!Horv. É. 14) — SZ: Szekszárd „Bat”, Szálka (Hollós 103) — ZS: Kaposújlok (Boros VSz 1936 83), Szigetvár (!) — O: Szentegát, Okorág, Harkány, Vajszló (!)

496. **A. nemorosa** L. (Berki szellőrózsa)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 17), „Lapis” (BK 6, Sz!) — H: Szatina-Kishajmás v. m. (Horv. PM4 18), Bakóca, Palé (Horv. É. 13) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 37) — ZS: Kaposújlok (Boros VSz 1936 83), Kaposvár „Nádasdi erdő”, Töröcske „Rapol” (!)

497. *A. hepatica* L. (Májvirág)

J: (!), Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 9, 17, Kit. 1. 7, *b. rosea* Neumann Horv. Borbásia II 27), „Büdöskút”, „Daindol”, „Kantavár” (Kit. 1. 8, 9), „Kozári vadászház-Bányatelep” (*b.* 1. c.), „Havihegy”, Pécsbudafa, Magyarország (!), Somogy „Ferkóirtás” (Bs.) — Z: (Kit. 1. 18, Horv. TTK 1. c.), Zobák „Márevár” (Kit. 1. 25), Hosszúhetény, Szászvár „Dobogó”, Váralja-Püspöknádasd (!), Hármashegy (Kárp.), Váralja (Zóly.) — V: Villány (Simk. 179), Diósvizsló (Kit. 1. 30) — Ma: Baksa, Erdősmecske „Alapítványi erdő” (Horv. É. 12) — H: Gödreszentmárton „Hajmás” (Ambrózy apud Boros MBL 1924 36), Kisvaszar, Palé (Horv. É. 13), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.), Nagyterecsény, Szentbalázs (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy”, „Kálvária” (Bartal 37), „Bat”, „Csatár”, Szálka, Bátaapáti (Hollós 103), Bonyhád (Pillich ex verbis) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14), Kaposújlak (Boros VSz 1936 83), Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)

498. *Clematis integrifolia* L. (Réti bércse)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 20, Simk. 179) — SZ: Szekszárd, „Sötétvölgy” (Hollós 103) — O: Pécs „környéke” (Maj. 25, 31), „Balokány” (Maj. apud Horv. PM4 15) — D: Mohácssziget (!)

499. *C. vitalba* L. (Kuszó iszalag)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — *b. integrata* DC. — J: (!Soó)

500. *C. recta* L. (Egyenes iszalag)

Baranya (Maj. 31, Maj. K.) — Ma: Fazekasboda (!) — SZ: Szekszárd (Hollós 103)

C. viticella L. — Pécs „környéke” (Maj. 31), ut spontanea certe false publicata (K.-Nendtv. 564)

501. *Myosurus minimus* L. (Egérfarkfű)

O: Pécs „környéke” (Maj. 31) Olim. Egykor.

502. *Ranunculus foeniculaceus* Gilib. (= *circinatus* Sibth.) (Merev boglárka)

O: Drávasztára „Ódráva” (Simk. 179), Gordisa „Ódráva” (!Boros MBL 1924 36) — D: Riha-tó (Boros MBL 1922 71)

R. fluitans Lam. — Pécs „környéke” (Nendtv. 30) = *circinatus* (Simk. 179)

503. *R. aquatilis* L. (Vizi boglárka)

J: Abaliget (Kit. 1. 16) — D: Dárda (1. c. 26), Kisdárda (Knapp)

504. *R. trichophyllus* Chaix (Kis vízboglárka)

Z: Hidas (!). — In regione plana vulgaris. Síkságon közönséges.

505. *R. ficaria* L. (Saláta boglárka)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — D: Mohács (!) — *b. calthaeifolius* (Rchb.) Bl. N. Sch. — T: Pécs „Mecsek” (Simk. 179) — V: Harsány (1. c.)

R. pedatus W. et K. — Ad limites territorii: Szigetvár, Sióagárd (!)

506. *R. illyricus* L. (Selymes boglárka)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30) — V: Harsány (!Simk. 179) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 103)

507. *R. flammula* L. (Béka boglárka)

Baranya (Maj. 31, Maj. K.)

508. **R. lingua** L. (Nádi boglárka)
Baranya (1. c., Nendtv. 30)
509. **R. sceleratus** L. (Torzsika)
T: Pécs „környéke” (!Nendtv. 30, Simk. 179), Komló (!) — D: Dárda (Kit. 1. 26)
510. **R. bulbosus** L. (Hagymás boglárka)
J: Kövágószőlős (Simk. 179), Abaliget (Boros MBL 1924 36) — T: Pécs „környéke” (!Nendtv. 20), Magyaréregy (!) — Z: Hosszúhetény (!) — H: Bakóca (!) — SZ: Szekszárd „Remete”, „Sötétvölgy” (Bartal 37) — ZS: Kaposvár (KH!) — O: Szentlőrinc (Boros 1. c.), Drávaszabolcs (!)
511. **R. sardous** Cr. (Buborcs boglárka)
J: Kövágószőlős (Simk. 179) — T: Pécs „környéke” (!Nendtv. 30) — SZ: Szekszárd (Hollós 103) — D: Mohács (Knapp)
512. **R. repens** L. (Kúszó boglárka)
Vulgaris. Közönséges.
513. **R. arvensis** L. (Mezei boglárka)
Vulgaris. Közönséges. — **b. tuberculatus** Kit. — J: Kövágószőlős (Simk. 179)
514. **R. auricomus** L. (Változó boglárka)
T: Pécs „környéke” (!K.-Nendtv. 568, 572), „Mélyvölgy” (Sz!) — O: Pécs, „Megyer”, Okorág, Szentegát (!)
515. **R. lanuginosus** L. (Gyapjas boglárka)
J: Orfű (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30), „Melegmányivölgy”, „Lapis”, „Kozári vadászház” (!), „Árpádtető” (Soó) — H: Szatina (!), Palé (É. Horv. 13), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Haramia-kút” (Hollós MBL 1924 59) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — O: Sellye (Simk. 179)
516. **R. acer** L. (Réti boglárka)
J: Abaliget (!) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 30), „Mélyvölgy” (!) — Z: Zobák „Hidasi völgy” (!) — SZ: Szekszárd (Bartal 37), Bátaapáti (Hollós 103) — O: Mecsekalja, Drávaszabolcs (!)
517. **R. polyanthemus** L. (Sokvirágú boglárka)
Vulgaris. Közönséges. — **b. latifolius** Wallr. — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 30), „Lámpás” (Sz!)
518. **Thalictrum aquilegifolium** L. (Galamólevelű virnác)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 32), „Mélyvölgy” (NV!), „Daindol” (Kit. 1. 9), „Lapis” (Bs.), „Remeterét” (!), „Szamárkút” (K.-Nendtv. 572), Orfű „Sárkánykút” (1. c.) — V: Harsány (!Simk. 179), Báni hegy (Janka apud N II 66) — Ma: Nagynyárád (1. c.), Fazekasboda, Hercegszabar (!) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 37), „Bat” (Hollós 103) — ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 36)
519. **Th. minus** L. (Közönséges virnác)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 32), „Havihegy” (!) — Ma: Nagynyárád (Janka apud N II 66) — **b. flexuosum** Bernh. — T: Pécs „Mecsek”, „Havihegy” (Simk. 180) — V: Harsány, Beremend (Kit. 1. 12, 28) — Ma: Geresd (1. c. 20) — SZ: Szekszárd „Bakta”, „Kálvária”, „Bat” (Hollós 103) — **c. medium** Murr. — Ma: Nagypárad (Simk.!)
Th. pseudominus (Borb.) Jáv. — Pécs „környéke” (Nendtv. 32, Simk. 180) = *minus* c. (Horv. PM4 16)

520. *Th. flavum* L. (Sárga virnác)

Pécs „környéke” (Nendtv. 32, BK 21 A) — H: Kisvaszar, Almamellék „Sasrét” (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Hollós 103) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14) — O: Harkány, Páprád „Borostyánpusztá”, Magyarmecske, Gordisa (!), Sellye (!Simk. 180) — D: Laskó (1. c.), Karapancsa (Tuzson BK 1914 139), Mohácssziget (Bs.)

521. *Th. lucidum* L. (Borkóró virnác)

J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 32) — V: Villány (Simk. 179) — O: Drávaszabolcs, Drávasztára (1. c.), Sámód (!)

b. angustissimum Cr. — O: Sámód (Horv. Borbásia II 27)522. *Adonis vernalis* L. (Tavaszi hérics)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 16, cum *b. minor* Dieudonne!), „Havihegy” (!) — Z: Hosszúhetény (! cum typo *b.* Horv. Borbásia I 96), Pécs-várad (Bs.) — V: Harsány (!Janka ÖBZ 1867 127), Máriagyűd (!) — Ma: Nagynyárad (1. c. 161), Fazekasboda (!) — H: Hőgyész (Horv. É. 14) — SZ: Szekszárd (Bartal 37), „Csatár”, „Bat”, Szálka (Hollós 103)

523. *A. flammea* Jacq. (Lángszínű hérics)

Pécs (Csapody BK 1935 196) — Z: Hosszúhetény (!) — Ma: Nagypárad (Simk. 179), Áta (Zsák), Fazekasboda (Horv. PM4 18), Hird (Csapody 1. c.) — H: Bonyhád (1. c.)

524. *A. aestivalis* L. (Nyári hérics)

Pécs „környéke” (!Nendtv. 16.) — Z: Hosszúhetény (!) — Ma: Fazekasboda (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (103), Szekszárd (Bs.) — O: Mecsekalja (!)

Berberidaceae. Sóska-félék.525. *Berberis vulgaris* L. (Sóska)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 38), „Bertalan kápolna” (Maj.!) — M: Spontaneitas dubitatur; jam a Kitaibelo non est visa, ut spontanea (Kit. 1. 9) A Mecseken való őshonos előfordulása kétséges. — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 102) — ZS: Kaposvár (KH!)

Mahonia aquifolium Nutt. — Culta et subspontanea — H: Kisvaszar (Horv. Borbásia II 26)

Papaveraceae. Mákfélék.526. *Chelidonium majus* L. (Vérehulló fecskefű)

Vulgaris. Közönséges.

527. *Glaucium corniculatum* (L.) Curt. v. *phoeniceum* (Cr.) DC. (Veres szarumák)

Baranya (Kit. apud N I 247) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 13, 23, Simk. 178) — H: Bonyhádvarasd (Kit. 2. 14) — O: Szentlőrinc (Kit. 1. 5) — D: Mohács (Knapp)

G. flavum Cr. — Cultum et subspontaneum — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 13, 23, Maj. 25, 31)

528. *Papaver dubium* L. praecipue v. *albiflorum* Boiss. (Bujdosó mák)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 28), „Makár” (Sz!), „Szkokó”, „Lapis”-Vágot (!) — V: Villány (Simk. 178) — SZ: Szekszárd (Hollós 103)

529. **P. rhoëas** L. (Pipacs)

Vulgaris. Közönséges. — **b. strigosum** Bönningh. — SZ: Bonyhád (Hollós 103)

P. somniferum L. — Cultum et subspontaneum — Pécs (Maj. 31) — V: Harsány (Simk. 178)

530. **Corydalis cava** (Mill.) Schw. et Kte. (incl. f. *albiflora* (Kit.) Rchb.) (Odvas keltike)

J: (!), Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 20), „Bányatelep”, „Istenkút”, „Lapis”, Magyarszék, Pécsbudafa (!) — Z: (Horv. TTK. 1. c.), Hosszúhetény (Simk. 178), Zobák (!) — V: Villány (!. c.) — Ma: Nagynyárád (Janka 1. c. 161), Ivánbattyán, Nagyárpád (Horv. É. 11), Villánykövesd, Véménd (!) — H: Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.), Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (!Bartal 37), „Bat” (Hollós 103) — ZS: Kaposújlak (Boros VSz 1936 83)

531. **C. solida** (Mill.) Sw. (Ujjas keltike)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 20, lus. *roseifloraque*!), „Makár” (Sz!), V: Harsány (!Simk. 178, f. *trichophoraque* Zsák!) — H: Palé (Horv. É. 13), Kurd-Lengyel (Jáv.-Zóly.)

? *C. pumila* (Host) Rchb. — Baranya (Jávorka: A magyar flóra kis határozója. 2. k. 121)

532. **Fumaria officinalis** L. (Orvosi füstike)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 23) non ad *Schleicheri* pertinet?, (**b. banatica** Hausk. (Simk. 178), Mecsekszentkút (**c. minor** Koch l. c.) — Z: Vár-alja, Püspöknádasd (1. c.) — V: Harsány (1. c. cum **d. floribunda** Peterm., typus Bs., Soó)

533. **F. rostellata** Knaf. (Csörös füstike)

Ma: Nagynyárád (Janka ÖBZ 1867 232)

534. **F. Schleicheri** Soy. Willm. (Közönséges füstike)

Vulgaris. Közönséges.

535. **F. Vaillantii** Lois. (Szürke füstike)

J: Kővágószőlős (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23), „Szkokó” (!), „Makár” (Simk. 178) — V: Máriagyűd (1. c.) — SZ: Szekszárd (Bartal 37), „Remete”, Mórág (Hollós 103) — D: Mohács (Knapp, Simk. 178)

F. parviflora Lam. — Introducta — Pécs (Nendtv. 23)

F. capreolata L. — Pécs „környéke” (Nendtv. 13, 23) = *officinalis* (Simk. 178)

Cruciferae. Keresztesek.

536. **Lepidium perfoliatum** L. (Felemás levelű zsázsa)

T: Pécs „környéke” (Maj. 31, K.-Nendtv. 567), „Bányatelep” (Maj. K.) — V: Harsány (Simk. 177) — SZ: Szekszárd „Remete” (Hollós 104)

537. **L. campestre** (L.) R. Br. (Mezei zsázsa)

Vulgaris. Közönséges. — T: Pécs „Mecsek” (**b. simplex** Paquy., **c. pluricaule** Thell. Horv. Borbásia II 27)

538. **L. draba** L. (Ütszéli zsázsa)

Vulgaris. Közönséges.

539. **L. ruderales** L. (Büdös zsázsa)

Vulgaris. Közönséges.

540. *L. virginicum* L. (Virginiai zsázsa)

Introductum — Pécs (Horv. PM4 13)

L. sativum L. — Cultum et subspontaneum — Pécs (Nendtv. 25, NV!)

?? *L. cartilagineum* (J. May.) Thell. — Pécs (Maj. ?? apud Horv. PM2 7)

541. *Coronopus squamatus* (Forskal) Asch. (= *procumbens* Gilib.) (Varjúláb)

T: Pécs (Simk. 177) — V: Villány (Simk. 177) — Ma: Nagynyárád, Majs (Janka apud N II 76), Hercegtöttös (Simk. 177), Fazekasboda (**b. procumbens** Muschler Horv. Borbásia II 27) — O: Nagypeterd (Kit. apud N I 267), Szentlőrinc (Boros MBL 1924 36), Sellye, Gordisa, Harkány (Simk. 177) — D: Pélmonostor (Janka 1. c.), Riha-tó (Boros MBL 1922 71), Kistapolca-Siklósnagyfalu (Bs.)

542. *Biscutella levigata* L. (Pajzspár)

T: Pécs „Mecsek” (Maj. et NV! apud Horv. PM2 6)

543. *Thlaspi perfoliatum* L. (Atalbuvo tarsolyfű)

J: (!), Abaliget (**b. simplicissimum** DC., **c. multicaule** F. Zimmermann et Thell. Horv. Borbásia II 27), Mecsekalja (**b.** 1. c.) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 32, **b.**, **c.**, Horv. 1. c.), „Bányatelep”, „Istenkút”, „Szkokó”, Pécsbudafa (!) — V: Harsány (!Simk. 178) — Ma: Nagyárpád (Horv. É. 11), Nagynyárád (Janka ÖBZ 1867 161), Németpalkonya (**b.**, **c.**!) — SZ: Szekszárd (Bartal 38, Hollós 104) — O: Magyarszentiván (!) — D: Mohács (Simk. 178)

544. *Th. arvense* L. (Mezei tarsolyfű)

Vulgaris. Közönséges.

545. *Alliaria officinalis* Andr. (Kányazsombor)

Vulgaris. Közönséges.

546. *Sisymbrium officinale* (L) Scop. (Keserű zsombor)

Vulgaris. Közönséges.

547. *S. sophia* L. (Sebforrasztó zsombor)

Vulgaris. Közönséges.

548. *S. strictissimum* L. (Magas zsombor)

Baranya (Nendtv. 31) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Püspök-nádasd (Simk. 178), Magyaregregy (!) — Ma: Fazekasboda (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 104)

549. *S. altissimum* L. (= *sinapistrum* Cr.) (Magyar zsombor)

Baranya (Kit. 1. 22) — SZ: „Remete” (Bartal 38), „kápolna” (Hollós 104)

550. *S. orientale* L. (Hamvas zsombor)

J: Magyarürög (Sz!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 31), „Szkokó”, „Bányatelep” (!) — Z: Hosszúhetény, Pécsvárad (!) — V: Harsány (!Simk. 178) — Ma: Püspöklak (Kit. 1. 20), Nagyárpád (!) — SZ: Szekszárd „Bödö” (Bartal 38), „Éleshát” (Hollós 104) — D: Mohács (Knapp)

S. irio L. — Introducta — Pécs „környéke” (Nendtv. 31)

551. *S. Loeselii* L. (Borzas zsombor)

Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 568) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „várdomb” (Hollós 104) — D: Mohács (Knapp), Dárda (NV!)

552. *Myagrum perfoliatum* L. (Légyfógó)

Pécs (Nendtv. 14, 27, Maj. K.)

553. *Calepina irregularis* (Asso) Thell. (Matyó)
 J: Abaliget, Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19), „Bányatelep”, „Havihegy” (!) — Z: Hosszúhetény (!Simk. 176) — V: Harsány (!l. c.) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11), Téseny (Zsák), Baksa, Vokány (!) — H: Bakóca (Horv. É. 13), Kurd (Jáv.-Zóly.) — O: Pécs (Horv. PM2 10), Alsócún, Szentlőrinc (Zsák), Harkányfürdő, Gordisa „Dázsony” (!)
554. *Isatis tinctoria* L. (Festő csülleng)
 Spontanea in territorio nostro? — Baranya (Maj. 31)
555. *Sinapis arvensis* L. (incl. *b. orientalis* (L) Murr.) (Vadrepce)
 Vulgaris. Közönséges.
556. *S. alba* L. (Fehér mustár)
 Subspontanea — Pécs (Nendtv. 31, Maj. 30, Maj. K., Simk. 177)
557. *Diplotaxis muralis* (L) DC. (Fali kányazsásza)
 T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 21), „Báránytető”, „Istenkút” (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 16), Pécsvárad (Soó) — V: Harsány (Simk. 177) — Ma: Pécs „Üszög”, Nagypall (Kit. 1. 10, 20) — SZ: Szekszárd „Bakta” (Hollós 103) — O: Beremend (Kit. 1. 29)
558. *D. tenuifolia* (L) DC. (Szabdalt kányazsásza)
 Pécs „környéke” (Nendtv. 21) — Ma: Pécs „Üszög” (Horv. PM2 8) — D: Mohács (Knapp)
D. viminea (L) DC. — Pécs (Maj. 30) = *tenuifolia* secundum Majeri plantam (Horv. PM4 16)
559. *Brassica elongata* Ehrh. (Harasztos káposzta)
 Baranya (Nendtv. 18, NT, Maj. 30, Maj. K.)
560. *B. campestris* L. (Kerekrépa)
 Subspontanea — Pécs (Nendtv. 18) — Z: Püspöknádasd (Simk. 176)
561. *B. napus* L. (Repce)
 Subspontanea — Pécs (Maj. 30) — D: Mohács (Simk. 176)
562. *B. nigra* (L) Koch (Fekete mustár)
 Subspontanea — T: Pécs „környéke” (!Nendtv. 31, BKA) — V: Villány (Simk. 176)
563. *Raphanus raphanistrum* L. (Repcsén retek)
 T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30) — SZ: Szekszárd (Hollós 103)
564. *Rapistrum perenne* (L) All. (Rekenyő)
 Pécs (Nendtv. 19, Simk. 177) — SZ: Szekszárd „Kálvária”, „Csatár” (Hollós 103)
565. *Barbarea vulgaris* R. Br. (Borbálafű)
 Vulgaris. Közönséges.
 ? *B. praecox* R. Br. — Adventiva — Pécs „környéke” (NT, Maj. K.) — O: Sellye (K.-Nendtv. 566—9)
566. *Rorippa islandica* (Oeder) Borb. (Mocsári kányafű)
 Pécs (!Maj. 30) — O: Gordisa (Boros MBL 1924 37) — D: Laskó (Simk. 177), Karapancsa (Tuzson BK 1914 139), Kisdárda (Knapp), Mohács (Knapp, MAN 300)
567. *R. amphibía* (L) Bess. (Iszapzsásza)
 O, D: vulgaris. O, D: közönséges.
b. auriculata (DC.) Rchb. — O: Sellye (Simk. 177)
c. variifolia (DC.) Rchb. — O: Drávaszabolcs (Horv. Borbásia II 27)

568. **R. austriaca** (Cr.) Bess. (Parti kányafű)
Vulgaris. Közönséges.
569. **R. silvestris** (L) Bess. (Közönséges kányafű)
Vulgaris. Közönséges.
570. **Armoracia rusticana** (Lam.) Gärt. (= **lapathifolia** Gilib.) (Torma)
Subspontanea — Pécs (!Nendtv. 20) — D: Mohács, Kisdárda (Knapp)
A. macrocarpa (W. et K.) Baumg. — Culta et subspontanea (Nendtv. 20)
571. **Cardamine** (= **Dentaria**) **bulbifera** (L) Cr.) (Hagymás fogasír)
J: Abaliget (!), Orfű (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 21), „Mélyvölgy”, „Kantavár”, „Lámpás” (!), „Kozári vadászház” (b. f. *albi-flora* Horv. Borbásia II 28) — Z: (Horv. TTK 1. c.), Zobák, Váralja-Püspökszentlászló (!) — V: Villány (!Simk. 177), Németpalkonya „Török-cser” (Horv. PM4 19) — Ma: Borjád, Feked, Villánykövesd (Horv. É. 12, 11), Hercegszabar, Ivánbattyán, Görcsöny (!) — H: Palé, Bakóca (1. c. 13, 14), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.), Högyész, Szentbalázs, Kisvaszar (!), Nagyterecsény (b.!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38), „Csatár”, „Bat” (Hollós 104) — ZS: Kaposújlak (Boros VSz 1936 83), Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O: Szentegát (!), Páprád „Tilos erdő” (Horv. É. 15)
572. **C. Waldsteinii** Hort. Kew. (= **D. trifolia** W. et K.) (Hármaslevelű fogasír)
T: Pécs „Mecsek” (Borbás TTK 1897 208, herbario eius deest!)
573. **C.** (= **D.**) **enneaphylla** (L) Cr. (Ikrás fogasír)
J: (!typus cum **b. polyantha** Beck Horv. Borbásia II 28), Orfű „Szuado” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 21, **c. alternifolia** Haussmann Horv. 1. c.), „Melegmányivölgy” (Horv. 1. c.), „Mélyvölgy”, Orfű „Vízfő”, Pécsbudafa (!) — ZS: Kaposújlak (Boros 1. c.)
574. **C. impatiens** L. (Virágrugó kakuktorma)
J: (!K.-Nendtv. 570), Orfű (Bs.), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19), „Árpádtető”, „Mélyvölgy” (!Soó), Mánfa „Sikonda” (!) — Z: (!), Magyarereggy „Márévár” (Kit. 1. 25), Zobák, Szászvár „Dobogó” (!) — H: Lengyel (Jáv.-Zóly.), Nagyterecsény (!) — ZS: Kaposújlak (Boros 1. c.), Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)
575. **C. hirsuta** L. (Borzas foszlár)
J: Abaliget (!) — T: Pécs „Büdöskút” (Simk. 177) — H: Szatina (!) — ZS: Kaposújlak (Boros 1. c.)
576. **C. pratensis** L. (Réti kakuktorma)
J: Magyarürög, Abaliget, Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19), „Mélyvölgy”, „Bányatelep”, „Istenkút”, Pécsbudafa (!) — Z: Nagymányok-Hidas, Szászvár (!) — V: Villány (Simk. 177) — Ma: Németpalkonya (!) — H: Szentkatalin, Ujdombóvár (!), Bakóca (Horv. É. 13) — ZS: Kaposújlak (Bs.) — O: Pécs „Megyer” (Maj. K.), Sellye, Bánfa, Okorág, Szentegát, Harkányfürdő, Gordisa „Dázsony” (!), Szentlőrinc (Boros MBL 1924 37) — D: Mohács, Béda, Bokerdő (!)
- C. amara* L. — Ad limites territorii — ZS: Kaposújlak (Boros VSz 1. c.)

577. *Lunaria rediviva* L. (Évelő holdviola)
J: Magyarürög (BK 16, A)
L. annua L. — Semispontanea — T: Pécs „Mecsek” (!Sz!), „Lámpás” (!), „Lapis”, „Bálics”, (b. *Echfaelleri* Wiesb. Horv. Borbásia II 26)
578. *Capsella bursa-pastoris* (L) Medic. (Pásztortáska)
Vulgaris. Közönséges. — b. *apetala* Opiz — O: Szentlőrinc (Boros MBL 1924 37) — c. *integrifolia* DC. — V: Villány (Simk. 176) — d. *parvula* Beck — SZ: Szekszárd „Parásztai szőlő” (Bartal 38)
C. rubella Reut. — Ad limites territorii — Introducta — H: Dombóvár (Csapody BK 1935 196)
579. *Camelina sativa* (L) Cr. (Sárgarepce)
Semispontanea — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 19, Maj. 31, NV!, Simk. 176) — Ma: Áta, Téseny (Zsák) — SZ: Szekszárd (Hollós 104) — ZS: Kaposvár (Lengyel: A magyar lucernamag. 52) — O: Siklós, Alsócún, Kémes (Zsák)
580. *C. microcarpa* Andr. et v. *pilosa* DC. (Gomborka)
Vulgaris. Közönséges.
581. *Neslia paniculata* (L) Desv. (Sömörje)
T: Pécs (Nendtv. 27, Maj. K., Sz!) — V: Harsány (Soó)
582. *Draba verna* L. (Tavaszi daravirág)
Vulgaris. Közönséges. — b. *stenocarpa* Jord. (= *Krockeri* Andr.) — O: Szentlőrinc (Boros MBL 1924 37) — c. *majuscula* (Jord.) Hay. et Wibir. — V: Harsány (Simk. 177) — d. *spatulata* Láng (*praecox* auct.) — T: Pécs „Mecsek” (!) — V: Harsány (!, 1. c.), Máriagyűd (!)
583. *D. nemorosa* L. (Ligeti daravirág)
Pécs (Maj. apud Horv. PM2 6)
584. *D. muralis* L. (Kövi daravirág)
J: Magyarürög (Kárp.) — O: Harkányfürdő (Janka ÖBZ 1867 232, Janka! ex herbario Degeni apud Pflanzenreich. IV. 105. 307), Mecsek-alja (Horv. Borbásia I 94)
? *D. lasiocarpa* Roch. — T: Pécs „Mecsek” (Maj. apud Horv. PM2 4), Majeri planta de territorio nostro ??
585. *Arabidopsis thaliana* (L) Heynh. (Lúdfű)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 17, Simk. 176), Mecsekszabolcs (NV!), „Istenkút” (!) — V: Harsány (Simk. 176, b. *pusilla* (Petit) Briquet. Horv. Borbásia II 28) — Ma: Németpalkonya (!) — H: Szentkatalin (!) — O: Okorág (!) — D: Kisdárda (Knapp)
586. *Turritis glabra* L. (Toronyszál)
J: Abaliget (Bs.), Mecsek-alja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 33) — Z: Hosszúhetény (Simk. 178) — V: Harsány (1. c., Bs.) — Ma: Baksa (!) — H: Kisvaszar-Magyaregregy (Horv. É. 13), Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 104) — O: Alsószentmárton (Horv. É. 16)
587. *Arabis turrita* L. (Tornyos ikravirág)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 17), „Kantavár” (Kit. apud N I 250), „Lapis”, „Lámpás”, „Bányatelep” (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. c.) — SZ: Szekszárd „Óriás-h.” (Bs.)
588. *A. auriculata* Lam. (Füles ikravirág)
T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 176) — V: Harsány (!Janka apud N II 71,

Simk. 176, **b. dasycarpa** Andr. 1. c.), Siklós (Janka 1. c.) — SZ: Szekszárd „Remetekápolna” (Bartal 38)

589. **A. hirsuta** (L.) Scop. (Borzas ikravirág)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17, **b. sagittata** (Bert.) Rechb. Richter L. apud Tuzson MTE 1916 429), „Kantavár” (Kit. 1. 9.) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Harsány (Simk. 176) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38) — O: Rónádfa (**c. etrusca** Tuzs. — **d. integra** Tuzs. Borbás! apud Tuzson 1. c. 424), Endrőc, Lakóca (!)

590. **Cardaminopsis arenosa** (L.) Hay. (Közönséges kövi foszlár)

J: (Ballay!), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17, **b. petrogena** (Kern.) Jáv. Simk. 176) — V: Villány (**b. 1. c.**) — Ma: Erdősmecske (!) 591. **C. hispida** (Mygind.) Hay. (Ritkás szőrű kövi foszlár)

Olim. Egykor. — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 17, Maj. 30), „Havihegy” (secundum Nendtvich V. iam tempore Simonkai extincta fuit 176)

592. **Erysimum cheiranthoides** L. (Violás repcsény)

Pécs „környéke” (Nendtv. 22, Maj. 30) — Z: Pécsvárad (Kit. 1. 18) — O: Drávasztára (Simk. 177) — D: Püspökpuszta (Boros MBL 1922 71) —

593. **E. repandum** L. (Fürtös repcsény)

T: Pécs (!Nendtv. 22, Simk. 177) — D: Mohács (Knapp)

594. **E. pannonicum** Cr. (= **erysimoides** (L.) Fritsch) (Magyar repcsény)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges.

595. **E. diffusum** Ehrh. (Szürke repcsény)

Pécs (Maj. 30, Maj. K.) — SZ: Szekszárd „Öcsényi-h.” (Bs.)

E. silvestre (Cr.) Kern. — Pécs „környéke” (Nendtv. 22) = **erysimoides** (K.-Nendtv. 565)

596. **Alyssum alyssoides** L. (Közönséges ternye)

Vulgaris. Közönséges.

597. **A. desertorum** Stapf. (Pusztai ternye)

J: Boda (!) — T: Pécs (Balek ÖBW 1852 14, Maj. 30, NV!, Simk. 176) — V: Harsány (Janka apud N II 74) — Ma: Vokány (!)

598. **A. montanum** L. (Hegyi ternye)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17, Kit. 1. 6) — V: Harsány (!)

599. **Berteroa incana** (L.) DC. (Hamuka)

Vulgaris. Közönséges.

600. **Euclidium syriacum** (L.) R. Br. (Táskazár)

Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 567) — J: Kővágószőlős (Simk. 177) — H: Szigetvár „Domolós” (Maj. K. apud Horv. PM2 11, NV!)

601. **Hesperis tristis** L. (Szomorú estike)

T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 30., K.-Nendtv. 567, Simk. 177) — V: Harsány (!1. c., Kit. 1. 12)

602. **H. silvestris** Cr. (= **runcinata** W. et K.) (Kacúros estike)

Baranya (WK. Ic. II 221) — J: Kővágószőlős (Simk. 177), Mecsekalja (Horv. Borbásia I. 96), Magyarürög (Richter! apud Borbás MBL 1902 376) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, Kit. 1. 9), „Istenkút”, „Szkokó”, „Bánya-telep-szamárkút” (K.-Nendtv. 571), Mecsekszabolcs (1. c.), Mecsekszentkút (Soó) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17, Kárp.), Pécsvárad (Kit. 1. 18, Bj.) — Ma: Nagypárad (Simk. 177) — H: Cserdi-Helesfa (Kit. 1. 15)

603. **H. matronalis** L. (Esti viola)
 J: Cserdi-Bükkösd (Kit. 1. 23) — T: Pécs „Mecsek” (NT, Maj. 30, Kit. 1. 9), „Lámpás” (Kit. 1. 23) — Z: (Simk. 177), Pécsvárad (Kit. 1. 23, **b. candida** Kit. Boros apud Horv. Borbásia I 96), Hármashégy, Hosszúhetény (NV!)
604. **Conringia orientalis** (L) Andr. (Nyilasfü)
- Baranya (Maj. 30, Maj. K.)
- Matthiola bicornis** S. Sm. — *Culta et subspontanea* — Pécs „Szkokó” (Horv. Borbásia I 95)

Resedaceae. Rezedafélék.

605. **Reseda luteola** L. (Sárgás rezed)
- J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30) — Z: Váralja, Hosszúhetény (Kit. 1. 14, 17), Szászvár (!) — V: Harsány (!Simk. 176) — Ma: Ata (!) — SZ: Szekszárd „Remete” (Hollós 104) — O: Siklós, Nagypeterd (Kit. 1. 30, 4)
606. **R. lutea** L. (Vad rezed)
- Vulgaris. Közönséges.* — **b. papillosa** Borb. — Pécs (Horv. Borbásia I 97)
607. **R. phyteuma** L. (Terpedt rezed)
- J: Mecsekalja (!Soó) — T: Pécs „Mecsek” (!NT, Maj. 31) — Z: Pécsvárad, Hosszúhetény (Kit. apud N I 268), Váralja (Kit. 1. 24), Püspökszentlászló (!) — V: Harsány (!Simk. 176) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11), Ata (Zsák) — D: Mohács (Knapp)

Droseraceae. Harmatfűfélék.

608. **Aldrovanda vesiculosa** L. (Aldrovanda)
- Olim. Kiveszett. — O: Gordisa, Sellye (Simk. 175)
- ? *Drosera rotundifolia* L. — Forte olim. Talán egykor? — O: Gordisa (Maj.!, NV! apud Horv. PM2 4)
- ? *D. anglica* Huds. — Forte olim. Talán egykor? — O: Gordisa (Maj. 1. c.)

Crassulaceae. Varjúhájfélék.

609. **Sedum maximum** (L) Krock. (Bablevelű varjúháj)
- T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 31, Kit. 1. 7.), „Makár” (Maj.!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — SZ: Szekszárd „Bat”, „káporna” (Hollós 106) — D: Beremend (Kit. 1. 28)
610. **S. hispanicum** L. (Deres varjúháj)
- Adventiva* — D: Dráva (Kit. 1. 29, Kit. apud Horv. Borbásia I 94)
611. **S. album** L. (Kis varjúháj)
- T: Pécs (!Sz!)
612. **S. acre** L. (incl. **b. Krajinae** Dom.) (Borsos varjúháj)
- Vulgaris. Közönséges.*
613. **S. Hillebrandii** Fenzl. (Homoki varjúháj)
- Z: Pécsvárad (Janka ÖBZ 1868 135)

614. *S. sexangulare* L. (= *boloniense* Lois.) (Szelíd varjúháj)
 J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!K.-Nendtv. 568, Maj. K.), „Tettye” (Soó), „Makár” (NV!) — Z: Hosszúhetény (Simk. 180), Zengővárkony (!) — V: Harsány (Bs., Soó) — Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 180) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 106)
S. reflexum L. — *Culta et subspontanea* — Pécs (!BKA)
S. annuum L. — T: Pécs „Mecsek” (BK 18) secundum BKA = *reflexum* (Horv. PM4 17)
 615. *Sempervivum hirtum* Juslen (Sárga fülű)
 J: (!Simk. 180), Kővágószőlös (!) — T: Pécs „Mecsek” (!b. *glabrescens* Sabr. Janka ÖBZ 1867 404 *sub sobolifero*), „Bertalan-szikla” (Horv. PK 28 5), „Havihegy” (Simk. 180)
 616. *S. Schlehani* Schott. (Rózsás fülű)
 Baranya (Jávorka: A magyar flóra kis határozója 2. k. 142) — V: Harsány (Bs.)
S. tectorum L. — *Culta et subspontanea* — J: Abaliget (Bs.) — T: Pécs (!Nendtv. 31)

Saxifragaceae. Köröntófélék.

617. *Saxifraga tridactylites* L. (Háromujjú köröntő)
 J: Abaliget (*b. exilis* (Poll.) Engler. Horv. Borbásia II 28) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 31, *b.*!) — V: Harsány (!Simk. 180, *b.*!), Németspalonya (!)
 618. *S. bulbifera* L. (Gumós kötörőfű)
 J: Magyarürög (Sz!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 31), Orfű „Sárkánykút” (Simk. 180), Mánfa (Soó), „Bányatelep” (!) — Z: Hosszúhetény, Zobák (!) — O: Harkányfürdő, Sellye, Mecsekalja (!)
 619. *Chrysosplenium alternifolium* L. (Vesélke)
 J: Abaliget (Kit. 1. 16), Orfű „Szuado” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 20), „Büdöskút” (NV!), „Mélyvölgy”, „Kölyuk” (!), Pécsbudafa (!) — ZS: Kaposújlak (Boros VSz 1936 83), Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)
Ch. oppositifolium L. — M: (Maj. 29) erroneo publicatum (K.-Nendtv. 564), Majeri planta non est de territorio nostro, ut spontaneum (Horv. PM2 4)
 620. *Ribes grossularia* L. (Pöszméte)
 Baranya (!Nendtv. 30) — Z: Hosszúhetény (!Simk. 180)
R. nigrum L. — *Culta?* (Nendtv. 30, NT, Maj. 30, Maj. K.)

Rosaceae. Rózsafélék.

621. *Spiraea media* Schm. (Bajnóca)
 T: Pécs „Mecsek” (!, *sub oblongifolia* W. et K. WK Ic. II 261) — V: Harsány (Kit. apud N I 325 *sub oblongifolia* W. et K., Bs.) — *Formae*:
a. oblongifolia (W. et K.) Dippel — T: Pécs „Mecsek” (Zólyomi: Kertészeti Szemle 1936 148) — *b. mollis* (K. Koch et Bouché) C. K. Schneider — T: Pécs „Mecsek” (1. c., f. *submollis* Zóly. Bs.) — V: Harsány (1. c., f. *submollis* Zóly. Bs.)
S. salicifolia L. — *Ad limites territorii* — ZS: Kaposvár (KH!)

622. *Aruncus vulgaris* Raf. (= *silvester* Kostel.) (Tündérfürt)
J: (Horv. PM4 18), Magyarürög „Égervölgy”, Orfű (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 32), „Peknyáki völgy” (BK 15, A), „Lámpás”, „Árpádtető” (Horv. 1. c.), Somogy „Csatornavölgy” (Bs.) — Z: Szászvár „Dobogó”, Magyaregregy „Hidasi völgy”, „Márévár” (!) — ZS: Kaposvár (KH!)
623. *Cotoneaster orientalis* (Mill.) Borb. (Nagylevelű madárbirs)
Olim. Egykor. — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 13, 27, NT, Maj.! apud Horv. PM2 9), „Tettye” (K.-Nendtv. 571)
624. *C. integerrima* Medic. (Molyhos madárbirs)
T: Pécs „Mecsek” (Maj.! 25, 27), „Havihegy” (Maj. K., Simk. 169), „Tettye” (Balek! in herbario Ballay)
625. *Pirus piraster* (L) Borkh. (Vadkörte, vackor)
Vulgaris. Közönséges. — *b. achras* Gärt. — Baranya (Maj.! 28) — T: Pécs „Mecsek” (!) — H: Bakóca „Hollófészek” (!)
626. *Malus silvestris* (L) Mill. (Vadalma)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 29) — H: Kisvaszar (Horv. É. 21)
627. *Sorbus domestica* L. (Fojtóska)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29, Kit. 1. 9), „Kantavár” (1. c. 10) — Z: Hosszúhetény (1. c. 17) — SZ: Szálka (Hollós 106) — ZS: Szentlászló, Gálosfa (Kit. 2. 14, 15)
628. *S. aucuparia* L. (Madár berkenye)
T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 25, 28, Simk. 169) — *b. lanuginosa* Kit. — J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (Horv. Borbásia I 97), „Bányatelep” (!) — H: Nagytetecsény, Bakóca „Hollófészek” (!)
629. *S. torminalis* (L) Cr. (Barkócafa)
J: (*b. semitorminalis* Borb.), Hetvehely (!), Kővágószőlős (Fekete-Blattny 610) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29, *b.* Horv. Borbásia II 28), Vasas (Fekete-Blattny 610), Mecsekszentkút (!) — Z: Pécsvárad (Fekete-Blattny 610), Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Váralja-Püspöknádasd (*b.* Horv. 1. c.) — V: Villány (Simk. 169) — Ma: Erdősmecske (Horv. É. 12), Fazekasboda (!) — SZ: Szekszárd „Keselyűs” (Bartal 38), „kápolna”, „Bat”, Szálka (Hollós 106) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14)
630. *S. cretica* (Lindl.) Fritsch (Déli berkenye)
M: (Jávorka 1. c. 149, Maj!)
631. *Crataegus oxyacantha* L. (Cseregalagonya)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 27, Kit. 1. 7.), „Daindol”, „Kantavár” (1. c. 8, 9), „Lapis”, „Tettye” (!) — Z: Kárász (Kit. 1. 26) — H: Bakóca (Horv. É. 13) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — D: Réterdő (Kit. 1. 28), „Bokerdő” (!)
632. *C. monogyna* Jacq. (Egybibés galagonya)
Vulgaris. Közönséges.
633. *C. nigra* W. et K. (Fekete galagonya)
D: Mohács, Karapancsa (Tuzson BK 1914 139), Bokerdő (!MAN)
634. *C. Degei* Zsák (*C. nigra* × *C. monogyna*)
D: Bokerdő (Horv. Borbásia I 97)
635. *Rubus idaeus* L. (Málna)
J: (ex verbis turistarum) — T: Pécs „környéke” (Maj.! 27) — V: Máriagyűd (Simk. 168)

636. **R. caesius** L. (incl. **b. arvalis** Rchb.) (Hamvas szeder)
Vulgaris. Közönséges.
637. **R. tomentosus** Borkh. (Molyhos szeder)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 30), „Makár” (NV!) — Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 168) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 107)
638. **R. candicans** Wh. (Fehéres szeder)
J: (Simk. 168) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 30, Maj. 25, 27) — Z: Máza (Kit. 1. 25) — V: Harsány „Dobogó” (Simk. 168) — H: Gödreszentmárton (Kit. 1. 26), Kisvaszar (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 107)
639. **R. bifrons** Vest. (Rózsás szeder)
Ma: Feked (Horv. Borbásia II 26)
640. **R. discolor** Wh. N. (Kétszínű szeder)
J: (!), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!), „Tettye” (Horv. PM2 7) — Ma: Fazekasboda (!) — ZS: Töröcske „Rapol” (!) — O: Sellye, Páprád „Bükkhát” (!)
641. **R. hirtus** W. et K. (Borzas szeder)
Baranya (WK. Ic. II. 150) — J: Orfű (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30), „Kantavár” (Kit. 1. 9) — Z: Magyaregregy, Máza (1. c. 26, 25) — V: Harsány (Simk. 168, **b. crassus** Hol. secundum Boros !Gayer in Jávorka: Magyar Flóra 508)
642. **R. agrestis** W. et K. (**R. caesius** × **R. tomentosus**)
V: Harsány (Simk. 168)
? *R. nemorosus* Hayne — Baranya (Nendtv. 30)
643. **Fragaria moschata** Duchesne (= **elatior** (Thuill.) Ehrh.) (Kerti szamóca)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23), „Kozári vadászház”, „Árpádtető”, „Mélyvölgy” (!) — Z: Hosszúhetény, Magyaregregy, Zobák (!), Pécsvárad (Soó) — V: Harsány (Simk. 168) — H: Bakóca (Horv. É. 13) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38), „Bat” (Hollós 107) — ZS: Kaposvár (KH!)
644. **F. vesca** L. (Erdei szamóca)
Vulgaris. Közönséges.
645. **F. viridis** Duchesne (= **collina** Ehrh.) (Csattogó eper)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11) — H: Bakóca (1. c. 13), Szatina (!) — O: Sellye (!)
646. **Potentilla rupestris** L. (incl. **b. gracilis** A. et G.) (Kövi pimpó)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29, Simk. 168, Tuzson BK 1908 212), „Kantavár” (Simk. 168), „Lapis” (Soó), „Kozári vadászház” (f. *glandulosa* Th. Wolf. Horv. Borbásia II 28) — Ma: Villánykövesd (f. *glandulosa* Th. Wolf. 1. c.)
647. **P. alba** L. (Fehér pimpó)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29), „Lapis” (!Sz!), „Kantavár” (Kit. 1. 10), „Bányatelep” (!), Vágot (!) — Z: Hosszúhetény (Simk. 168) — V: Németspalkonya „Törökcsér” (!)
648. **P. micrantha** Ram. (Apróvirágú pimpó)
J: (!Kit. 1. 8), Magyarürög (Kárp.), Abaliget (Horv. PM2 8), Mecsekalja (**b. rosea** Panč. Horv. Borbásia II 28), Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29?, Balek ÖBW 1852 14, **b.** Horv. 1. c.), „Kozár” (Maj. K. apud Horv. PM2 11), „Lapis”-Vágot (Sz!), „Bányatelep”, Pécs-

budafa (Horv. PM4 19), Somogy (Horv. PM2 8) — Z: (!Kit. 1. 18), Pécsvárad (l. c. 23), Hosszúhetény (Simk. 168), Váralja-Püspöknádasd, Szászvár (!) — Ma: Pécsudvard (Horv. É. 11) — H: Lengyel (Jáv.-Zóly.), Szentkatalin (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, Szálka (Hollós 107) — ZS: Töröcske „Rapol” (!)

649. *P. supina* L. (Henyé pimpó)

Pécs „környéke” (Maj. 28, Maj. K., K.-Nendtv. 568) — Ma: Villány (Simk. 168) — SZ: Szekszárd „Remete”, Bata (Hollós 107) — O: Harkány (Zsák) — D: Dárda (Kit. 1. 26)

650. *P. anserina* L. (Liba pimpó)

Vulgaris. Közönséges. — *b. sericea* Hayne — SZ: Szekszárd „ebesi csárda” (Hollós 107)

651. *P. erecta* (L.) Räuschel (Vérontófű)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 29, Maj. 28, Maj. *b. strictissima* (Zimm.) Hay.), Mánfa „Sikonda” (*b.* Horv. Borbásia II 28), Komló (!) — O: Sellye (*b.* 1. c.), Gordisa (Simk. 168), Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 16), Sámód (*b.*!)

652. *P. reptans* L. (Indás pimpó)

Vulgaris. Közönséges.

653. *P. adscendens* W. et K. (Szürke pimpó)

J: (Simk. 168) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 29, BK 16, A, Sz!) „Makár” (Simk. 168), Somogy (Bs.) — V: Villány (Simk. 168)

654. *P. argentea* L. (Ezüstös pimpó)

Vulgaris. Közönséges. — *b. tenuiloba* (Jord.) Sw. — J: (Horv. Borbásia I 97) — T: Pécs „Lapis” (Horv. 1. c.) — *c. impolita* (Wahlbg.) Tratt. — J: (Horv. 1. c.) — T: Mecsekszabolcs (!) — *d. dissecta* Willr. — Ma: Erdősmecke „Alapítványi erdő” (Horv. É. 12)

655. *P. leucopolitana* P. J. Müll. (Szürke pimpó)

Z: (!Soó! Horv. PM4 13) — V: Harsány (Kárp. I. 1. c.)

656. *P. recta* L. (Magas pimpó)

J: (Soó) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 29), „Istenkút” (!) — V: Harsány (!), Villány (Simk. 168) — Ma: Göröcsöny (!) — *b. pilosa* Willd. — T: Pécs „Mecsek” (f. *auriflora* Borb. Borbás MOTV 1894 277) — Ma: Erdősmecke (!) — SZ: Szekszárd „Kis Bükk”, „Éleshát”, „Gurovica” (Hollós MBL 1914 59) — *c. leucotricha* Borb. — J: (Horv. Borbásia I 97)

657. *P. heptaphylla* L. (= *rubens* (Cr.) Zimm.) (Vörösszárú pimpó)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29), „Bányatelep”, „Kisrét” (!) — Z: (!), Zobák (!) — V: Feketehegy (!). Beremend (Kit. 1. 28) — Ma: Fazekasboda (l. c. 20) — H: Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38), „Bat” (Hollós 107) — D: Beremend (Kit. 1. 28)

658. *P. arenaria* Borkh. (*verna* auct.) (Homoki pimpó)

J: Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 168, *b. concolor* Th. Wolf Borbásia II 28), „Bányatelep”, „Havihegy” (!) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Harsány (!Simk. 168, Kit. 1. 12, *b.*!), Máriagyűd (!) — Ma: Nagynyárad (Janka ÖBZ 1867 161), Nagypárad (Horv. É. 11), Fazekasboda (!) — H: Szentkatalin (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 107), „Sötétvölgy” (*c. meridionalis* A. et G. Bartal 38) — D: Mohács (Simk. 168)

659. *Waldsteinia geoides* Willd. (Waldstein-pimpó)

T: Pécs „Mecsek” (!WK. Ic. I. 80, Nendtv. 14, 34, Maj. 24, 27, Simk. 168)

660. **Geum urbanum** L. (Gyömbérgyökér)

Vulgaris. Közönséges.

G. rivale L. — M: Pécs (Maj. 27) erroneo publicatum (K. Nendtv. 564), non est de territorio nostro, ut spontaneum (Horv. PM2 4)

661. **Filipendula ulmaria** (L) Maxim. (Legyezőfü)

Pécs „környéke” (Maj. 27, **b. quinqueloba** (Baumg.) Podpera Maj. apud Horv. Borbásia I 97) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 106) — ZS: Kaposszerdahely „Rapol” (!)

662. **F. hexapetala** Gilib. (Tündérfürt)

J: (!), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 32), „Báránytető” (!) — V: Máriagyüd (!) — H: Hőgyész (!) — O: Harkányfürdő (!) — D: Beremend (Kit. 1. 28)

663. **Alchemilla arvensis** (L) Scop. (Palástfü)

T: Pécs „Mecsek” (NT, Simk. 168), „Gesztenyész” (Maj. K. apud Horv. PM2 10) — Z: Püspöknádasd (Simk. 168) — V: Máriagyüd (1. c.) — ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Palitz R.: Magyarország Alchemillái 14)

A. silvestris Schm. — M: (Maj. 27) erroneo publicata (K.-Nendtv. 564)

664. **Agrimonia eupatoria** L. (Koldustetű, párló)

Vulgaris. Közönséges.

665. **Aremonia agrimonioides** (L) Neck. (Aremónia)

J: Szatina-Kishajmás v. á. (Horv. PM4 18) — T: Pécs „Mecsek” (!NT), „Nagymélyvölgy” (Simk. 167), „Kantavár” (!Maj. K. apud Horv. PM2 10), „Lapis”, „Kisrét” (!Sz!) — H: Nagytetecsény, Palé (!) — ZS: Töröcske „Rapol” (!)

666. **Sanguisorba officinalis** L. (Őszi vérfű)

Pécs „környéke” (Maj. 27, **b. auriculata** Scop. Maj. apud Horv. Borbásia I 97) — O: Sellye (K.-Nendtv. 568, 572, Simk. 168)

667. **S. minor** Scop. (Csabaire)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29) — Z: Hosszúhetény (Simk. 168) — V: Harsány (1. c.), Máriagyüd (!) — SZ: Szekszárd (Bartal 38), „Bat”, „Petre” (Hollós 107) — D: Mohács (!)

ssp. muricata (Spach.) A. et G. — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 29, Bs., Soó) — V: Hosszúhetény (!WK. Ic. II. 217 ut species), Váralja (Kit. 1. 24) — V: Harsány (Kit. 1. 12, Soó)

668. **Rosa arvensis** Huds. (Erdei rózsza)

Baranya (RK 79) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30, Kit. 1. 7), „Lámpás” (1. c.), „Kantavár” (1. c. 9) — Z: (!RK 567), Hosszúhetény, Váralja (Kit. 1. 18, 21) — Ma: Erdősmecske „Alapítványi erdő” (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Petre” (Hollós 107) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szent Tamás-psz.” (Kit. 2. 14) — **a. repens** Scop. — Ma: Feked (!) — **b. pilifolia** Borb. — T: Pécs (Borbás MTK 1880 344) — O: Rónádfa, Magyarmecske, Gusztávműve (1. c., ad formam sequentem pertineat?) — **c. baldensis** Kern. — J: Vöröshegy (Horv. Borbásia I 97) — T: Pécs „Mecsek” (1. c.), „Bányatelep” (!), Mecsekszentkút (Soó) — Z: Szászvár „Dobogó” (Horv. 1. c.) — V: Harsány (Soó) — Ma: Geresd (Horv. 1. c.), Göröcsöny (!) — H: Palé (Horv. É. 13), Kisvaszar (!) — ZS: Töröcske „Rapol” (!) — O: Páprád „Bükkhát” (!)

669. **R. gallica** L. (*pumila* auct.) (Parlagi rózsza)
 J: (Kit. 1. 8.), Kővágószőlős (Simk. 168) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — V: Siklós (l. c. 14) — O: Rónádfa (Borbás 1. c. 369) — D: Dráva „torkolat” (Marsigli 71) — **a. haplodonta** Borb. — SZ: Szekszárd „Gurovica” (Bs.) — **b. pannonica** Wiesb. — T: Pécs „Mecsek”, „Létics-parlag” (!) — V: Harsány (Boros apud Horv. Borbásia I 97) — **c. austriaca** Cr. — T: Pécs „Bányatelep” (!), Mecsek-szentkút (Soó) — SZ: Szekszárd „Petre”, „Bat”, „Csatár” (Hollós 108)
670. **R. eglanteria** L. (= *rubiginosa* L.) (Rozsdaszínű rózsza)
 T: Pécs „Mecsek” (Maj. 27, BK 16, A) — Ma: Geresd (!**b. umbellata** Leers.)
671. **R. elliptica** Tausch. **b. Szabói** Borb. (Elliptikus rózsza)
 O: Rónádfa, Gusztávműve (Borbás 1. c. 485)
672. **R. agrestis** Savi (*sepium* auct.) (Mezei rózsza)
 J: (Simk. 168) — V: Harsány (1. c.)
673. **R. dumetorum** Thuill. (Berki rózsza)
 V: Villány (Simk. 168) — **b. hemitricha** Rip. — O: Rónádfa, Gusztávműve (Borbás 1. c. 436) — **c. hirta** H. Br. — T: Pécs „Mecsek” (!) — V: Harsány (Bs.) — **d. leptotricha** Borb. — SZ: Szekszárd „Óriás-h.” (Bs.) — **e. platyphylla** Rau. — T: Pécs „Mecsek” (Soó) — Ma: Hercegszabar (!) — **f. solstitialis** Bess. — T: Pécs „Mecsek” (Soó) — V: Harsány (!) — **g. urbica** Lém. — H: Högyész (!)
674. **R. canina** L. (Vadrózsza, gyepű rózsza)
 T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30) — Z: Pécsvárad (RK 567) — **b. Desvauxii** H. B. — V: Harsány (!Bs.) — **c. fissidens** Borb. — O: Magyarmecske (Borbás 1. c. 414) — **d. flexibilis** Déségl. — J: Orfű (Bs.) — O: Magyarmecske (Borbás 1. c. 415) — **e. frondosa** Stev. — T: Pécs „Mecsek” (!) — **f. hispidula** Rip. — T: Pécs „Mecsek” (!) — **g. lutetiana** Lem. — T: Pécs „Mecsek” (Simk. 168) — V: Harsány (Soó) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 107), „Öcsényi-h.” (Bs.), Mórág, Bátaapáti, Szálka (Hollós 107) — **k. nitens** Schur — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 107) — **i. psilogyna** Borb. — O: Magyarmecske (Borbás 1. c. 415) — **j. semibiserrata** Borb. — T: Pécs „Tettye” (Soó) — **h. syntrichostyla** Rip. — O: Magyarmecske (Borbás 1. c. 414)
- ssp. dumalis** Bechst. — V: Harsány (Simk. 168) — **a. typica** — T: Pécs „Mecsek” (!) — **b. biserrata** Mérat. — O: Rónádfa, Gusztávműve (Borbás 1. c. 419) — **c. calophylla** Christ. — T: Pécs „Mecsek” (!) — **d. cladoleia** Rip. — V: Harsány (Soó) — **e. eriostyla** Rip. et Déségl. — T: Pécs „Mecsek” (!) — V: Harsány (Soó) — **f. firmula** God. — J: Orfű (Boros apud Horv. Borbásia I 97) — Z: (!), Hosszúhetény (!) — **g. glaucina** Rip. — V: Harsány (Boros apud Horv. Borbásia I 97) — **h. innocua** Rip. — T: Pécs „Mecsek” (!) — Z: Pécsvárad (Soó) — V: Harsány (!) — Ma: Geresd (!) — **i. levistyla** Rip. — Z: Hosszúhetény (!) — **j. ovifera** Borb. — O: Rónádfa (Borbás 1. c. 466) — **k. podolica** Tratt. — Z: Hosszúhetény (!) — V: Harsány (Soó) — **l. rubelliflora** Rip. — SZ: Szekszárd „Öcsényi-h.” (Bs.) — **m. sarmentoides** Pug. — V: Harsány (!) — **n. squarrosidens** Borb. — O: Rónádfa (Borbás 1. c. 408) — **o. transsilvanica** Schur — V: Harsány (Boros apud Horv. Borbásia I 97)

675. **R. vosagiaca** Desp. (= **glauca** Vill.) (Szürkelevelű rózsza)
b. falcata Pug. — O: Rónádfa (Borbás 1. c. 459) — **c. subcoerulascens** Borb. (ad *glauca*m) — O: Rónádfa (1. c.) — **d. subleiostylis** Borb. — O: Rónádfa (1. c. 460)
676. **R. coriifolia** Fr. (Keménylevelű rózsza)
Pécs „környéke” (Nendtv. 30)
677. **R. spinosissima** L. (= **pimpinellifolia** L.) (Jaj-rózsza)
T: Pécs „Mecsek” (Maj. 28, Maj. K., Soó) — V: Harsány (Kit. 1. 12)
678. **Prunus nana** (L) Stokes (Törpe mandula)
Baranya (NT) — Pécs (? Kit. apud N I 326) — V: Harsány (l. c., Maj. K.) — D: Harsány-Mohács (Kit. 1. 22.)
679. **P. spinosa** L. (incl. **b. dasyphylla** Schur) (Kökény)
Vulgaris. Közönséges.
680. **P. avium** L. (**a. silvestris** (Kirschl.) Dierb.) (Vad cseresznyefa)
J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29), „Kisrét”, „Lámpás” (!) — Z: (!Fekete-Blattny 611), Pécsvárad (!) — Ma: Baksa, Hercegszabar (!) — H: Lengyel (Jáv.-Zóly.), Újdombóvár, Bakóca (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 107)
681. **P. fruticosa** Pall. (Cseplesz meggy)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29), „Makár” (Maj. apud Horv. PM4 15) — V: Harsány (!) — Ma: Pécs „Üszög” (!) — SZ: Szekszárd „Kálvária” (Bartal 38), „Bat”, „Csatár” (Hollós 107)
682. **P. mahaleb** L. (Sajmeggy)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29, NT, Maj. 25, 27, Maj. K.)

Leguminosae. Hüvelyesek vagy pillangós virágúak.

683. **Genista germanica** L. (Német rekettye)
J: (!Kit. 1. 3), Abaliget (Kit. 1. 16), Magyarürög (Kárp.), Hetvehely (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23), „Makár”, „Feketehegy” (K.-Nendtv. 570), „Bányatelep”, „Árpádtető”, Mánfa „Sikonda” (!) — Z: Máza (Kit. 1. 26), Zobák, Hosszúhetény, Zengővárkony (!) — V: Siklós (Kit. 1. 14) — ZS: Kaposméről (Jáv. apud Boros MBL 1924 39), Szentlászló (Kit. 2. 14)
684. **G. pilosa** L. (Selymes rekettye)
J: (!), Abaliget (Kit. 1. 16) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23, Kit. 1. 10), „Tettye”, „Istenkút” (!)
G. ovata W. et K. — Typus — J: (Simk. 164) erroneo publicata, tantum *v. nervata* Kit. (Horv. PM4 17)
685. **G. ovata** W. et K. *v. nervata* Kit. (Szőrös rekettye)
Formae: **b. baranyaensis** Horv. — **c. mecsekiensis** Horv. — J: (!Kit. apud N I 329, **b.**, **c.** Horv. Borbásia I 97), Magyarürög (Kit. apud N I 329) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23, **b.** Horv. 1. c.), „Lámpás”, „Daindol” (Kit. 1. 7, 8), „Makár”, „Kantavár” (K.-Nendtv. 571), „Lapis” (Soó) — Z: Hosszúhetény (Kit. apud N I 328), Hármashégy (**c.**!), Szászvár „Dobogó” (**b.** Horv. 1. c.), Pécsvárad (**b.**!) — Ma: Erdősmecske (**b.** Horv. É. 12) — H: Palé, Kisvaszar (**b.** 1. c. 13, 12), Bakóca (1. c. 13, **c.**!), Lengyel (Jáv.-Zóly.), Nagytércsény, Högyész (**b.**!) — ZS: Töröcske „Rapol” (**b.**!) — O: Páprád „Tilos erdő” (!)

686. *G. tinctoria* L. (Festő rekettye)

J: (!Kit. 1. 8, Simk. 164), Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Kit. 1. 6, Nendtv. 23) — V: Harsány (Simk. 164), Beremend (Kit. 1. 28) — H: Lengyel (Hollós 107) — SZ: Szekszárd „Petre”, „Kálvária”, „Csatár” (Hollós 107) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14)

ssp. elata (Mnch.) Wender

Vulgaris. Közönséges. — *b. hungarica* Kern. — T: Pécs „Mecsek” (Borbás MOTK 1894 277) — *c. pubescens* Láng — J: Orfű (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 23), Somogy „Csatornavölgy” (Bs.) — Ma: Erdősmecske (Horv. É. 12) — O: Páprád „Bükkhát” (1. c. 15)

687. *Laburnum anagyroides* Medic. (Aranyeső)

Culta et spontaneitas ejus est valde dubia. Művelik, őshonossága nagyon kétes. (Horv. PM4 19) — J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 21), „Kantavár” (Kit. Add. 303, K.-Nendtv. 570), „Lámpás” (Kit. 1. 7) — Z: Pécsvárad (Kit. apud N I 329) — SZ: Szekszárd (hic certe tantum subspontanea Bartal 38)

688. *Sarothamnus scoparia* (L) Wimm. (Seprőzanót) — Quoad spontaneitatem v. 687.

Pécs „környéke” (!K.-Nendtv.) — T: Komló (!) — H: Szigetvár „Domolos” (NV!) — ZS: Kaposújlak (Bs.) — O: Sellye (!)

689. *Cytisus procumbens* (W. et K.) Spr. (Kitaibel zanótja)

T: Pécs „Mecsek” (Maj. K.), (BK 12 secundum picturam *Genista pilosa*!)

690. *C. nigricans* L. (Fürtös zanót)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — *b. australis* Feyn. — T: Pécs „Mecsek” (Maj.! apud Horv. Borbásia II 28)

691. *C. supinus* L. (= *capitatus* Scop.) (Gombos zanót)

a. typus, *b. aggregatus* Schur, *c. leucotricho-aggregatus* Borb., *d. biflorens* Host, *e. pannonicus* Simk. — J: (!Kit. 1. 8, *b.*!), Abaliget (*b.* Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (1. c. 6, Nendtv. 21, *c.*, *d.* Horv. Borbásia II 28, *a.*, *b.*!), „Lámpás”, „Daindol”, „Kantavár” (Kit. 1. 7, 8, 9) — Z: Mária-vár (1. c. 25), Pécsvárad (*b.* Soó), Hosszúhetény, Szászvár „Dobogó” (*b.*!), Zórák (*c.*!) — V: Villány (Simk. 164), Harsány (*e.* Kit. apud Jáv. AMNH 1929 104) — Ma: Erdősmecske (*b.* Kit. 1. 12), Geresd, Görcsöny (*b.*!) — H: Kisvaszar (Horv. É. 12, *b.*!), Bakóca (1. c. 13), Högyész (*b.*!), Bonyhádvarasd (Kit. 2. 14) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „kápolna”, Mórág, Bátaapáti (107) — ZS: Szentlászló, Gálosfa (Kit. 2. 14, 15), Kaposvár (KH! apud Horv. É. 15), Töröcske „Rapol” (!) — O: Páprád „Bükkhát” (Kit. 1. 15, *b.*!), Siklós-Alsószentmárton (*b.*!)

692. *C. Heuffelii* Wierzb. (Heuffel-zanót)

T: Pécs „Mecsek” (Borbás MOTV 1894 277, herbario ejus deest!)

693. *C. austriacus* L. (Buglyos zanót)

J: (Kit. 1. 8), Magyarürög (1. c.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 21, Kit. 1. 7), „Bertalan-szikla” (Horv. PM2 8), „Tettye”, „Havihegy”, „Lámpás”, „Bányatelep” (!), „Daindol” (!Kit. 1. 9) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 16) — V: Nagyharsány (!1. c. 12), Máriagyűd (!Simk. 164) — Ma: Pécs „Üszög”, Nagypall (Kit. 1. 10, 20), Erdősmecske (1. c. 21, Horv. É. 12), Villánykövesd (1. c. 11), Fazekasboda (!) — H: Lengyel (Hollós 107, Jáv.-

Zóly.), Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Remete” (Bartal 38), „Bat”, „Csatár”, „Kálvária”, „Petre” (Hollós 107) — O: Nagypeterd (Kit. 1. 4), Drávaszabolcs (!)

694. *C. leucotrichus* Schur (Fehérszörű zanót)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (Simk. MTK 1888 377, Horv. PM2 7) — Z: Hosszúhetény (Simk. 1. c.), Váralja-Püspökszentlászló, Püspökszentlászló (!) — H: Bakóca (Horv. É. 13) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14)

C. elongatus W. et K. — M: (Simk. 164) = *leucotrichus* (Horv. PM4 17)

695. *C. ratisbonensis* Schaeff. *b. cinereus* Host (Selymes zanót)

V: Harsány (!RK 567, Kit.! apud Jávorka AMNH 1929 102)

696. *Ononis pusilla* L. (= *Columnae* All.) (Sárga iglice)

T: Pécs „Mecsek” (Ballay! apud Horv. PM4 13)

697. *O. hircina* Jacq. (Nehézságú iglice)

Vulgaris. Közönséges. — *ssp. semihircina* (Simk.) Soó *b. spinosiformis* (Simk.) Soó — V: Máriagyöd (Simk. Természettajzi Füzetek 1877 103—5) — O: Matty-Alsószentmárton (!) — D: Dárda (Simk. 1. c.)

698. *O. spinosa* L. (Tövises iglice)

J: (!) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 27, *b. pseudorepens* BK 22, A) — Z: Hosszúhetény (Simk. 165) — V: Harsány (!), Villány (1. c.) — Ma: Nagypárad (K.-Nendtv. 571) — H: Vásárosdombó (Kit. 1. 26) — SZ: Szekszárd, „Bat”, Bonyhád (Hollós 107) — O: Sellye (NV!) — D: Dárda (Simk. 165), Réterdő (Kit. 1. 28)

699. *Trigonella procumbens* Rchb. (= *Besseriana* Ser.) (Sziki lepkeszeg)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 26 NV!), „Mészkemencék” (K.-Nendtv. 571), 1873 jam extincta (Simk. 165)

700. *T. monspeliaca* L. (Francia lepkeszeg)

J: Kővágószőlős (Simk. 166) — T: Pécs „Mecsek” (1. c.) — V: Harsány (1. c., Bs.)

701. *T. gladiata* Stev. (Bakszarvú lepkeszeg)

V: Harsány (Simk.! 162, 166, Vajda László!)

T. melilotus-coeruleus (L.) A. et G. — Culta et subspontanea — T: Pécs „környéke” (!Nendtv. 26), „Lámpás” (Kit. 1. 7.) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14) — O: Drávasztára (Simk. 165)

702. *Medicago lupulina* L. (Komlós lucerna)

Vulgaris. Közönséges. — Ma: Fazekasboda (*b. glandulosa* Mertens et Koch Horv. Borbásia II 28)

703. *M. sativa* L. (Takarmány lucerna)

Subspontanea, vulgaris. Elvadultan közönséges. — SZ: Bába (f. *albiflora* Hollós 107)

704. *M. falcata* L. (Sárkelep lucerna)

Vulgaris. Közönséges. — T: Pécs „Mecsek” (*b. pseudoprostrata* Hausm. Horv. Borbásia II 28)

705. *M. prostrata* Jacq. (Cseplesz lucerna)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv., *b. declinata* (Kit.) Urban!), „Tettye” (*b.!*)

706. *M. arabica* (L.) Huds. (Arab lucerna)

Adventiva — J: (!, Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, 26), „Vasfürdő” (Maj. K. apud Horv. PM2 11), „Sz. János-kút”

(K.-Nendtv. 571), „Báránytető" (!) — Z: Püspöknádasd (Simk. 165) — V: Kistótfalu (!) — O: Pécs „Megyer" (!K.-Nendtv. 571), Pellérd, Málom (Horv. PM4 19), Nagyárpád, Máriagyüd-Harkányfürdő (!)

707. *M. hispida* Gärtner. *b. denticulata* Willd. (Szúrós lucerna)
Adventiva — J: Magyarürög (Sz!) — Z: Püspöknádasd (Simk. MTK 1878 541)

708. *M. minima* (L.) Desr. (Apró lucerna)
T: Pécs „Mecsek" (!Nendtv. 26, *b. recta* Willd. verg.!) — V: Harsány (!Kit. 1. 12, Simk. 165, *b. Horv. Borbásia* I 97, *c. brachiacantha* Kern. Simk. 165) — SZ: Mórág (Hollós 107)

709. *M. varia* Martyn (*M. falcata* × *M. sativa*)
Pécs „környéke" (Nendtv. 26, Maj. 26, Maj. K.)

710. *Melilotus dentatus* (W. et K.) All. (Fogas somkóró)
O: Pécs „környéke" (Nendtv. 14, 26, Maj. 26, Maj. K.), Gordisa „Dázsony" (!)

711. *M. altissimus* Thuill. (Réti somkóró)
O: Gusztávműve (*b. paluster* (W. et K.) R. et F. Borbás MBL 1902 107) — D: Virágos (Kit. 1. 27), Riha-tó (*b. Boros* MBL 1922 71)

712. *M. officinalis* (L.) Medic. (Orvosi somkóró)
Vulgaris. Közönséges.

713. *M. albus* Medic. (Fehér somkóró)
J: Abaliget (Bs.) — T: Pécs „Mecsek" (!Nendtv. 26, Kit. 1. 9), Mánfa „Sikonda", Komló (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 16) — H: Szigetvár „Domolos" (1. c. 4), Kisvaszar (!) — SZ: Szekszárd, Bonyhád (Hollós 107) — O: Sellye (!) — D: Riha-tó (!)

714. *Trifolium fragiferum* L. (Eper lóhere)
Vulgaris. Közönséges.

715. *T. procumbens* L. (= *campestre* Schreb.) (Mezei lóhere)
Vulgaris. Közönséges.

716. *T. agrarium* L. (= *strepens* Cr.) (Zörgő lóhere)
J: (Kit. 1. 8.) — T: Pécs „Mecsek" (!Nendtv. 33) — Z: Szászvár „Somlyó" (!) — V: Villány (Simk. 166) — SZ: Szekszárd „Bat", „Csatár" (Hollós 107)

717. *T. dubium* Sibth. (Kis lóhere)
Baranya (NT, Maj. 26) — J: Kővágószőlős (!) — Ma: Geresd (!) — SZ: Zsibrik, Palatinca (Hollós 107)

718. *T. filiforme* L. (= *micranthum* Viv.) (Cérna lóhere)
Baranya (NT, Maj. K.) — J: Kővágószőlős (!Simk. 166)

719. *T. montanum* L. (Hégyi lóhere)
In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Pécs-Nagyárpád (!)

720. *T. parviflorum* Ehrh. (Apróvirágú lóhere)
J: Kővágószőlős (Simk. 166)

721. *T. hybridum* L. (Korcs lóhere)
Vulgaris. Közönséges.

722. *T. repens* L. (Fehér lóhere)
Vulgaris. Közönséges.

723. **T. rubens** L. (Pirosló lóhere)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 33), „Lámpás”, „Daindol” (Kit. 1. 7, 8) — V: Harsány (Simk. 166) — SZ: Szekszárd „Petre”, „Csatár”, Szálka (Hollós 107)

724. **T. alpestre** L. (Bérci lóhere)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Czinderybogád „Bükkhát” (!)

725. **T. ochroleucum** Huds. (Vajszinű lóhere)

J: Abaliget (Kit. 1. 16), Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 33, Simk. 166) — Z: Zengővárkony (!) — V: Harsány, Villány (1. c.) — H: Kisvaszar (Horv. É. 13) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — O: Sellye (!)

726. **T. pannonicum** L. (Magyar lóhere)

Baranya (Maj. 25, herbario ejus deest!)

727. **T. medium** L. (Tekergős lóhere)

J: (Kit. 1. 8) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 33, Sz!), „Daindol” (Kit. 1. 8) — Z: Hosszúhetény, Váralja, Magyaregregy, Kárász (1. c. 17, 24, 26) — V: Harsány, Villány (Simk. 166) — Ma: Feked (Horv. É. 12) — H: Kisvaszar (1. c.) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 107) — ZS: Töröcske „Rapol” (!)

728. **T. pratense** L. (Réti lóhere)

Vulgaris. Közönséges. — **b. sativum** Schreb. — Culta et subspontanea. Művelik és vadon is nő. — **c. expansum** (W. et K.) Hausskn. — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 13, 33)

729. **T. pallidum** W. et K. (Halvány lóhere)

T: Pécs (Sz!), „Szkokó” (Horv. Borbásia I 99) — O: Harkány (Janka 1. c. 231)

730. **T. striatum** L. (Sávós lóhere)

Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 568) — T: Pécs „Mecsek” (Simk. 166) — V: Harsány (1. c.) — D: Laskó (Simk. !)

731. **T. diffusum** Ehrh. (Buglyos lóhere)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 13, 33, NT, Maj. 26), „Makár” (K.-Nendtv. 572, Maj. K.)

732. **T. incarnatum** L. (Bíborhere)

Culta et subspontanea. Művelik és elvadul. — Pécs (Sz!) — J: Hetvehely (!) — V: Harsány, Kistótfalu (!)

733. **T. arvense** L. (Herehura fű)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — **b. Brittingeri** Weitenw. — J: Mecsekalja (Horv. Borbásia I 97)

734. **Anthyllis polyphylla** Kit. (Magyar szapuka)

J: Orfű (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 26), „Lapis” (!), Komló (!) — V: Harsány (Soó) — SZ: Szekszárd „Remete” (Bartal 38), „Csatár” (Hollós 107), „Gurovica” (Bs.) — D: Mohács (Simk. 163), Riha-tó (!)

735. **A. vulneraria** L. (Partim ad 734. pertineat?) (Nyúlszapuka)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 17), „Daindol” (Kit. 1. 8) — Ma: Tésény (Zsák) — D: Mohács (Knapp)

736. **Dorycnium germanicum** (Gremli) Rouy (= **sericeum** (Kov.) Borb.) (Selymes dárdahegy)

T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 26) — T: Harsány (!) — V: Hosszúhetény (!) — ZS: Töröcske „Rapol” (!)

737. *D. herbaceum* Vill. (Berzedtszörű dárdahere)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 21, Kit. 1. 6), „Daíndol” (Kit. 1. 8) — Z: Hosszúhetény (!Kit. 1. 18) — V: Villány (Simk. 164), Beremend (Kit. 1. 28), Harsány (!) — Ma: Nagypall, Geresd (Kit. 1. 20, 21), Fazekasboda (!), Vokány „Terentás” (Simk. 164), Feked (Horv. É. 12) — H: Kisvaszar (1. c.), Lengyel (Hollós 107) — SZ: Szekszárd „Remete”, „Csatár” (Hollós 107) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — O: Sellye (!)

738. *Lotus siliquosus* L. (Bársony kerep)

T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 26, BK 8, A) — SZ: Szekszárd (!Hollós 108)

739. *L. corniculatus* L. (Szarvaskerep)

Vulgaris. Közönséges. — *b. hirsutus* Koch — SZ: Szekszárd „Remete” (Bartal 38)

ssp. tenuifolius (L) Hartm. — Pécs „környéke” (!BK 12, A) — V: Harsány (Simk. 164) — SZ: Bonyhád (Hollós 107) — O: Sellye (Simk. 164) — D: Mohács (Knapp)

740. *Galega officinalis* L. (Kecskeruta)

Vulgaris. Közönséges.

Robinia pseudoacacia L. — Culta et subspontanea (!NT)

741. *Colutea arborescens* L. (Pukkantó dudafürt)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 20, Kit. 1. 6, 7), „Lámpás” (1. c.), „Lapis”, „Szkokó” (!), Vasas (Fekete-Blattny 612) — Z: Pécsvárad (1. c., Kit. 1. 18), Hosszúhetény (1. c. 17) — V: Harsány (1. c. 12, Soó) — Ma: Püspöklak (Kit. 1. 21) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd (Bartal 38), „Bat”, „Csatár” (Hollós 108), „Öcsényi-h.” (Bs.)

C. orientalis Mill. — Subspontanea — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38)

? *Astragalus exscapus* L. — Baranya (Maj. 27)

742. *A. glycyphyllus* L. (Édeslevelű csüdfű)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Sellye, Alsószentmárton (!)

743. *A. cicer* L. (Hólyagos csüdfű)

J: (Soó) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 18, Kit. 1. 9, Maj. 27, BK 22, A) — Z: Püspöknádasd (!) — V: Villány (Simk. 163), Harsány (!) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 108)

744. *A. austriacus* Jacq. (Kisvirágú csüdfű)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 18), „Galgen” (nunc Zsolnay-mauzoleum, K. Nendtv. 569) — V: Harsány (!Janka apud N II 106)

745. *A. onobrychis* L. (Hosszúzászlós csüdfű)

J: Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 18, Kit. 1. 7, *b. rigidus* Schur Horv. Borbásia II 28) — Z: Majos (Kit. 2. 14) — V: Harsány (Simk. 163, *b. Soó*) — Ma: Fazekasboda (!) — SZ: Szekszárd „Remete”, „Petre” (Hollós 108) — Zs: Kaposvár (KH!)

A. vesicarius L. v. *albidus* (W. et K.) Beck — Ad limites territorii — SZ: Szekszárd „Oszoly” (Bartal 38)

746. *Glycyrrhiza echinata* L. (Ednámkóró)

O: Pécs „környéke” (Maj. 26, Maj. K., NV!), Pécs „Megyer”-Keszü (K.-Nendtv. 567, 570, Maj.!)

G. glabra L. — Culta et subspontanea — Baranya (Nendtv. 23) — V: Harsány (Simk. 164)

747. *Coronilla varia* L. (Tarka koronafürt)
Vulgaris. Közönséges. — lus. *alba* Pluskal — Ma: Feked (Horv. Borbásia II 28)

748. *C. coronata* L. (Sárga koronafürt)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 20, Kit. 1. 7.), „Daindol” (1. c. 8), „Remeterét” (!)

C. scorpioides (L) Koch — M: (BK 14) secundum picturam = *Medicago prostrata* (Horv. PM4 17)

749. *Onobrychis viciaefolia* Scop. (Takarmány baltacím)
Culta et subspontanea. Művelik és elvadul. — J: Hetvehely (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 24, Maj. 27), „Daindol” (Kit. 1. 8) — Z: (!), Hosszúhetény (1. c. 17) — Ma: Kékesd (1. c. 20) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38)

750. *O. arenaria* (Kit.) DC. (Homoki baltacím)
T: Pécs „Mecsek” (!Borbás MOTV 1894 277, herbario ejus locus inventionis est valde confusus), „Lapis”-Vöröshegy (Soó) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Petre”, „kápolna” (Hollós 108)

751. *Vicia hirsuta* (L) Gray (Borzas bükköny)
J: Hetvehely (!), Orfű (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22), „Kantavár” (Kit. 1. 9), „Makár” (Sz!), Mánfa „Sikonda” (!) — V: Villány (Simk. 164) — Ma: Feked (Horv. É. 12), Görcsöny (!) — H: Högyész (!) — O: Drávaszabolcs, Pécs-Nagyárpád (!) — D: Mohács (Knapp)

752. *V. tetrasperma* (L) Schreb. (Négymagvú bükköny)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22, NV!, Maj. 27) — H: Bükkösd (Zsák)

753. *V. silvatica* L. (Ligeti bükköny)

T: Mecsekszentkút-Magyarürög (!Kit. apud N I 343, Kit. 1. 8, Horv. Borbásia I 99)

754. *V. pisiformis* L. (Borsóka bükköny)

J: (!Simk. 164), Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 34, Maj. 27, Maj. K.), „Lámpás” (Kit. 1. 7) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15)

755. *V. dumetorum* L. (Csere bükköny)

J: Hetvehely (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 34, Maj. 27), Somogy (Bs.) — H: Kisvaszar (Horv. É. 12) — SZ: Szekszárd „Haramia-kút” (Hollós MBL 1914 59)

756. *V. cassubica* L. (Vitéz bükköny)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34, Maj. 27), Somogy (Bs.) — Z: Püspök-nádasd (Simk. 164)

? *V. onobrychioides* L. — T: Pécs „szőlők” (Schult. 1. c. II. 328)

757. *V. cracca* L. (Kaszanyüg bükköny)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34) — V: Harsány (Simk. 167) — H: Szalatnak (Kit. 1. 26) — SZ: Szekszárd (*b. linearis* (Peterm.) Koch Bartal 38), „Bat”, „Csatár”, Mórág, Bátaapáti (Hollós 108)

ssp. tenuifolia Roth

J: Magyarürög (Simk. 167) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 34, Maj. 34, Maj. K., Simk. 167)

758. *V. villosa* Roth (Szöszös bükköny)

Vulgaris. Közönséges.

759. *V. glabrescens* Koch (Kopaszodó bükköny)

Z: Hosszúhetény (Simk. 167) — V: Villány (1. c.)

760. **V. lathyroides** L. (Apró bükköny)
J: Mecsekalja, Abaliget (!), Magyarürög (Sz!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34, Maj. 27) — V: Harsány (!Simk. 167) — H: Szatina (!)
761. **V. serratifolia** Jacq. (Fogas bükköny)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, 34, Maj. 25, 27) — V: Harsány (Simk. 167) — Ma: Nagynyárád-Majs (Janka apud N II 107) — H: Cserdi (!) — O: Gusztávműve-Magyarszentiván (Horv. PM4 19)
762. **V. pannonica** Cr. (Dunamelléki bükköny)
J: Abaliget (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 14, 34, Maj. 27, Simk. 167, Sz!) — Z: Püspöknádasd (!) — V: Harsány (Simk. 167) — Ma: Ivánbattyán (Horv. É. 11, **b. angustifolia** Borb. Horv. Borbásia II 28), Geresd, Kistótfalu (!) — H: Bakóca (Horv. É. 13) — SZ: Szekszárd (Hollós 108) — ZS: Kaposszentjakab, Cserénfa (!)
763. **V. striata** (Mnch.) M. B. (Csikos bükköny)
T: Pécs „környéke” (Sz! apud Horv. PM2 7) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Bödö” (Bartal 38), „gemenci út” (Hollós 108)
764. **V. sepium** L. (Gyepübükköny)
J: (!Simk. 167), Magyarürög (!), Orfű (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34, NV!), „Szkokó” (!), „Daíndol” (Kit. 1. 8) — Ma: Baksa, Villánykövesd (!) — H: Lengyel (Jáv.-Zóly.), Szatina (!) — SZ: Szekszárd „Gurovica” (Bs.) — D: Bokerdő (!)
765. **V. lutea** L. (Sárga bükköny)
J: Magyarürög (Simk. 167) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 34, Maj. 27, Sz!) — Z: Püspökszentlászló (Boros MBL 1924 39) — V: Villány (1. c., Simk. 167, Zsák) — Ma: Fazekasboda (!) — ZS: Kaposvár (KH! apud Horv. É. 15) — O: Kákics (!)
766. **V. sordida** W. et K. (Szennyos bükköny)
Vulgaris. Közönséges. — **b. Biebersteinii** (Bess.) Borb. — J: Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Borbás MOTV 1894 277) „Bányatelep” (!) — V: Harsány (Soó)
767. **V. grandiflora** Scop. (non typica, transiens in *sordidam*) (Nagyvirágú bükköny)
J: Hetvehely (Horv. PM4 19) — T: Pécs „környéke” (Sz! Horv. PM2 7)
768. **V. angustifolia** L. (incl. **b. segetalis** (Thuill.) Kostel.) (Szűklevelű bükköny)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34) — Ma: Szalánta-Túrony, Fazekasboda (!), Vokány „Terentás” (Simk. 167) — H: Bakóca (!) — SZ: Szekszárd, „Bat”, „Csatár” (Hollós 108)
769. **V. sativa** L. (Takarmány bükköny)
Culta et subspontanea. Művelik és elvadul. — Pécs (Nendtv. 34, NV!, Maj. 27, BKA) — Z: Magyaregregy (!) — SZ: Szekszárd (Bartal 38) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15) — D: Riha-tó (!)
770. **Lathyrus aphaca** L. (Levéltelen lednek)
J: Orfű (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (NT, K.-Nendtv. 567, Maj. 25, 27, Maj. K.)
771. **L. nissolia** L. (Kacstalan lednek)
J: (!Simk. 164), Petőc (Horv. PM4 19), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 25, Maj. 24, 27), „Büdöskút” (Bs.), „Lapis”, „Kis-

rét" (!), Komló (!) — V: Harsány (Simk. 164), Máriagyűd (!) — H: Högyész, Nagytérecsény (!) — ZS: Töröcske „Rapol” (!)

772. **L. hirsutus** L. (Borzas lednek)

J: (!), Kővágószőlős (Simk. 164), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 25, Simk. 164, Sz!) — Z: Szászvár „Dobogó” (!) — V: Villány (!. c.) — H: Palé (Horv. É. 13) — O: Sellye (!Simk. 164), Sósvertike, Páprád „Bükkhát” (!), Vajszló (**b. pusillus** Schuster Horv. Borbásia II 28)

773. **L. sphaericus** Retz. (Téglasszínű lednek)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, 15), „Makár” (!. c. 36, NV!), „Baránytető” (Horv. PM4 19), „Tettye” (!) — V: Villány (!Nendtv. 36), Máriagyűd (!)

774. **L. tuberosus** L. (Mogyorós lednek)

Vulgaris. Közönséges.

775. **L. pratensis** L. (Parlagi lednek)

J: (!), Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25), „Melegmányi völgy” (!) — V: Villány (Simk. 164) — Ma: Áta (!), Palotabozsok (Bs.) — H: Kisvaszar (**b. tenerrimus** Schur Horv. Borbásia II 28), Bakóca (É. Horv. 13) — SZ: Szekszárd, „Csatár”, „Keselyűs” (Hollós 108) — ZS: Kaposvár (KH!) — O: Páprád „Borostyánpusztá” (!)

776. **L. silvester** L. (Erdei lednek)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 57, BK 17, A), „Lapis” (!) — V: Harsány (Simk. 164) — Ma: Kistótfalu (!) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „várdomb”, Szálka, Bába (Hollós 108) — ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 40) — O: Alsószentmárton (**b. platyphyllus** (Retz.) Aschers. Horv. É. 16.)

777. **L. latifolius** L. (= **megalanthus** Steud.) (Nagyvirágú lednek)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 25, BKA) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Harsány (!Simk. 164), Máriagyűd (!) — H: Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Gurovica” (Bs.) — D: Dárda (Simk. 164)

778. **L. versicolor** (Gmel.) Beck (Koloncos lednek)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 28), „Lapis”, „Bálics” (Horv. PM2 9), „Szaniszló-pihenő” (!)

779. **L. niger** (L) Bernh. (Fekete lednek)

J: (!), Mecsekalja, Hetvehely (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 28, *lus. albiflora* Beck Horv. Borbásia II 28), „Daíndol”, „Kantavár” (Kit. 1. 8, 9), „Árpádtető”, Mánfa „Sikonda” (!) — Z: Pécsvárad (Soó) — V: Siklós (1. c. 14), Harsány (!) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11), Erdősmecske, Göröcsöny, Áta, Hercegszabar (!) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38), „Csatár”, Bábaapáti (Hollós 108), Szekszárd „Gurovica” (Bs.) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)

780. **L. vernus** (L) Bernh. (Tavaszi lednek)

J: Magyarürög, Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 28, **b. albiflorus** (Rchb.) Wohlf. Horv. Borbásia I 97), „Mélyvölgy”, „Bányatelep” (!), „Kantavár” (Kit. 1. 9), „Lapis” (!Bs.), „Istenkút”, Pécsbudafa (!) — Z: (Horv. TTK 1. c.), Váralja (Zóly.), Püspöknádasd-Váralja (**b. Horv. 1. c.**), Zobák (!) — Ma: Erdősmecske „Alapítványi erdő” (**c. angustifolius** (Endl.) Rouy Horv. É. 12) — H: Bakóca, Kisvaszar, Palé (Horv. É. 14, 12, 13), Szentkatalin, Högyész, Szentbalázs (!), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38), „Bat”, „Csatár” (Hollós 108) — ZS:

Kaposújlak (Boros VSz 1936 83), Kaposvár (KH! apud Horv. É. 15), „Nádasdi erdő”, Töröcske „Rapol” (!) — O: Szentegát „Pupos erdő” (!), Drávasztára-Zaláta (c. Horv. Borbásia I 97)

781. *L. venetus* (Mill.) Rouy (Tarka lednek)

J: (!), Hetvehely, Petőc (Horv. PM4 19), Orfű (*b. banaticus* (Wierzb.) Borb. Boros apud Horv. Borbásia I 97), Vöröshegy (Kárp.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, 28), „Lajostárna”, „Kantavár” (K.-Nendtv. 571), „Melegmányivölgy”, „Lapis”-Vágot, „Mélyvölgy”, „Árpádtető” (!, *c. rigidus* Láng Soó), Mecsekszabolcs, Mánfa „Sikonda” (!) — Z: Zobák, „Hidasi völgy” (Horv. PM4 19), Hosszúhetény (!) — V: Harsány (Jávorka: Magyar Flóra 656), „Feketehegy” (Kárp., Kistótfalu (!) — Ma: Erdősmecske „Alapítványi erdő” (Horv. É. 12), Baksa (!) — H: Bakóca, Kisvaszar (1. c. 13, 12), Högyész, Palé, Szentbalázs (!), Bükkösd (*b.!*) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)

L. sativus L. — Culta et subspontanea — Pécs „környéke” (Maj. 27, Sz!) — Z: Hosszúhetény (Simk. 164) — O: Harkányfürdő (!)

782. *Pisum elatius* Stev. (Magas borsó)

Z: Szászvár (!) — V: Villány (!Simk. 165, 166) — Ma: Fazekasboda (Horv. PM4 19), Vokány „Terentás” (Simk. 165, 166) — SZ: Szekszárd (Bs.) — O: Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 16), Sósvertike, Baranyahídvég-Vajszló (!)

P. arvense L. — Culta et subspontanea — Pécs „környéke” (Nendtv. 28, Maj. K.)

Spartium junceum L. — Pécs „környéke” (Maj. 26), forte culta (Horv. PM4 17)

Geraniaceae. Gólyaorrfélék.

783. *Geranium phaeum* L. (Fodros gólyaorr)

J: Orfű (Bs.), „Szuado” (!), Hetvehely, Szentlőrinc (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23), „Mélyvölgy” (!K.-Nendtv. 570, Maj.!), Komló, Mánfa „Sikonda” (!) — V: Villány (Simk. 170), Máriagyűd (!) — Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 170), Kistótfalu (!) — H: Palé, Kisvaszar (Horv. É. 13), Cserdi, Husztót (!) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14), Kaposújlak (Boros VSz 1936 83), Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O: Páprád „Tilos erdő” (Horv. É. 15)

784. *G. Robertianum* L. (Nehézságú gólyaorr)

Vulgaris. Közöséges. — f. *Bernettii* A. Schwartz — O: Czindery-bogád „Bükkhát” (Horv. Borbásia II 28)

785. *G. lucidum* L. (Csillogó gólyaorr)

T: Pécs „Mecsek” (!, Maj!), „Makár” (Sz!), „Lapis” (!) — Ma: Nagynyárad (Janka ÖBZ 1867 232)

786. *G. divaricatum* Ehrh. (Berzedt gólyaorr)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 23), „Makár” (Sz!), Mecsekalja, Mecsekszabolcs (K.-Nendtv. 570) — Z: Hosszúhetény (WK Ic. II. 31, cf. Kit. apud Jáv. AMNH 1929 163)

787. *G. molle* L. (Puha gólyaorr)

Baranya (Maj. 28) — O: Harkányfürdő (!) — *b. stipulare* (G. Kunze) K. Maly — H: Kisvaszar (!) — Ma: Kisasszonyfa (Nendtv. apud Simk. 170, NV!), Ócsárd (!)

788. *G. columbinum* L. (Galamb láb gólyaorr)
J: Abaliget (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!NT) — Z: (Kit. 1. 18), Vár-
alja (1. c. 24) — V: Villány, Harsány (!Simk. 170, Soó) — H: Feked
(Horv. É. 12) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 105) — O: Sellye
(Simk. 170), Kémes (Zsák)
789. *G. dissectum* Jusl. (Sallangos gólyaorr)
J: Abaliget (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 23, BK 11, A) —
Ma: Görcsöny (!) — SZ: Szekszárd „Kis-Bükk” (Hollós MBL 1914 59)
790. *G. rotundifolium* L. (Kereklevelű gólyaorr)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 23, Maj. 28) — V: Harsány (!Simk. 170)
791. *G. pusillum* Burm. (Apróvirágú gólyaorr)
Vulgaris. Közönséges.
792. *G. pyrenaicum* Burm. (Pireneusi gólyaorr)
T: Pécs „Mecsek” (!BKA apud Horv. Borbásia I 94)
793. *G. sanguineum* L. (Piros gólyaorr)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23, Kit. 1. 9), „Daindol” (1. c. 9.) — V:
Harsány (!1. c. 12), Beremend (1. c. 28) — H: Högyész (!) — SZ: Szek-
szárd „Remetekápolna” (Bartal 38), „Petre”, „Bat”, „Csatár” (Hollós 105)
794. *G. pratense* L. (Mezei gólyaorr)
Adventiva — Pécs „környéke” (Maj. 4 apud Horv. PM2 4) — ZS:
Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 40), Kaposvár (KH! apud
Horv. É. 15)
? *G. silvaticum* L. — Pécs (Maj. 4 apud Horv. PM2 4)
795. *Erodium cicutarium* (L.) L'Hérit. (Bürök gé Morr)
Vulgaris. Közönséges.

Oxalidaceae. Madársóska-félék.

796. *Oxalis acetosella* L. (Erdei madársóska)
J: Orfű „Szuado”, Szentkatalin (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 28),
„Mélyvölgy” (!Maj., Sz!), Pécsbudafa, Komló, Somogy (!) — Z: Szászvár
„Dobogó”, Püspöknádasd (!) — Ma: Erdősmecske (Horv. É. 12) — H:
Nagyterecsény, Szentkatalin (!), Kisvaszar (1. c. 13) — ZS: Kaposújlak
(Boros VSz 1936 38), Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)
797. *O. stricta* L. (Lóherelevelű madársóska)
T: Pécs (!Simk. 170, Maj.), „Makár” (Sz!) — SZ: Szekszárd „Csatár”
(Hollós 105) — O: Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 15)
798. *O. corniculata* L. (Szürke madársóska)
Pécs „környéke” (!Nendtv. 28, *b. subacaulis* Chast. Soó Bot. Arch.
1927 356)

Linaceae. Lenfélék.

799. *Linum catharticum* L. (Béka len)
J: (Kit. 1. 8) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25) — V: Villány
(Simk. 170) — Ma: Palotabozsok (Bs.) — SZ: Szekszárd (Hollós MBL
1924 59) — D: Riha-tó (!)
800. *L. flavum* L. (Sárga len)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 25), „Makár” (Maj. 4 apud Horv. PM4 15),
„Daindol” (Kit. 1. 8) — Z: Pécsvárad (1. c. 19) — V: Beremend (1. c. 28),

Harsány (Simk. 170) — SZ: Szekszárd „Remete”, „Bat” (Hollós 105) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14) — D: Dráva „torkolat” (Marsigli 64)

801. *L. gallicum* L. (= *trigynum* L.) (Francia len)

J: Boda (Kit. apud N I 309) — O: Harkány, Drávasztára (Simk. 170)

802. *L. hírsutum* L. (Borzas len)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 25), „Daindol” (Kit. 1. 8), „Bertalan-szikla” (Horv. PK 28 6), „Frühweiss” (BK 18, A) — Z: Hosszúhetény, Váralja (Kit. 1. 17, 24), Pécsvárad (!) — V: Harsány (!Simk. 170), Siklós (*b. glabrescens* Kováts exs.), Beremend (Kit. 1. 28) — Ma: Nagypall, Geresd (Kit. 1. 26) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 105)

803. *L. usitatissimum* L. (Házi len)

Culta et subspontanea. Művelik és elvadul. — Pécs (Nendtv. 25, Sz!) — V: Harsány (Simk. 170)

804. *L. tenuifolium* L. (Arlevelű len)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25), „Tettye”, „Havihegy” (!), „Frühweiss” (BK 18, A) — Z: Hosszúhetény, Váralja (Kit. 1. 17, 24) — V: Harsány (!Simk. 170) — Ma: Geresd (Kit. 1. 20), Erdőmecske (!), Feked (Horv. É. 12) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 105)

805. *L. austriacum* L. (Hegyi len)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25), „Bertalan-szikla” (Horv. PK 28 6) — V: Harsány (!Simk. 170) — Ma: Hercegszabar (!) — SZ: Szekszárd, „Bat” (Hollós 105)

806. *L. perenne* L. (Évelő len)

Baranya (Nendtv. 25, Maj. 25) — J: Abaliget (Kit. apud N I 309) — Z: Pécsvárad (1. c.), Hosszúhetény (*lus. albiflora!*) — Ma: Nagypall (Kit. 1. 20)

Rutaceae. Rutafélék.

807. *Dictamnus albus* L. (Ezerjófű)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 21, Kit. 1. 7), „Árpádtető” (!) — Z: Hosszúhetény (!1. c. 17), Magyaregregy (!) — V: Harsány (!Simk. 171), Máriagyűd (!) — Ma: Hercegszabar (!) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38), „Bat”, „Csatár”, „Éleshát” (Hollós 105), „Óriás-h.” (Bs.)

Polygalaceae. Pacsirtafüfélék.

808. *Polygala major* Jacq. (Nagy pacsirtafű)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 28, Maj! 31) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38)

809. *P. comosa* Schrk. (Üstökös pacsirtafű)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 28, Simk. 172), „Lapis” (Soó) — Z: Hosszúhetény-Zobák (!) — Ma: Kistótfalu (!), Feked (Horv. É. 12) — H: Bakóca (1. c. 13) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38), „Remete”, „Bat” (Hollós 105) — O: Drávaszabolcs, Kákics (!)

810. *P. amarella* Cr. (Kisvirágú pacsirtafű)

Pécs „környéke” (Sz! apud Horv. PM2 7)

Euphorbiaceae. Kutyatejfélek.

811. **Mercurialis annua** L. (Egynyári szélfü)
Pécs „környéke” (Nendtv. 26), „Basamalom” (!)
812. **M. perennis** L. (Évelő szélfü)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 26, NV!, Maj. 28), „Lapis”, „Istenkút” (!)
— Z: Hosszúhetény (Simk. 171) — V: Harsány, Villány (!1. c.) — H: Nagytérecsény (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38), „Bat”, „Csatár” (Hollós 105) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő”, Kaposszerdahely „Rapol” (!) — O: Szentegát (!)
813. **M. ovata** Sternb. et Hoppe (Tojásdad levelű szélfü)
J: Vöröshegy (Kárp.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 26), „Tettye”, „Szkokó” (!K.-Nendtv. 571), „Bányatelep”, „Lapis” (!), „Havihegy” (Simk. 171) — V: Villány (Simk. apud Pflanzenreich. IV. 147. 279)
814. **Euphorbia platyphylla** L. (Nagylevelű kutyatej)
Pécs „környéke” (Nendtv. 22, NV!, Simk. 171) — J: Magyarürög (Kit. 1. 8) — Z: Szászvár „Dobogó” (!) — V: Villány (Simk. 171) — SZ: Szekszárd „Bakta” (Hollós 105) — ZS: Kaposvár (KH!) — O: Sellye (Simk. 171), Nagypeterd (Kit. 1. 4), Sámód (!) — D: Dárda (1. c. 26), Mohács (Knapp)
815. **E. stricta** L. (Merev kutyatej)
V: Harsány (!Simk. 171) — O: Kákics (!)
816. **E. polychroma** Kern. (Színeváltó kutyatej)
J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22, Kit. 1. 6 *sub dulci*), „Bányatelep”, „Kisrét”, „Lámpás” (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Váralja (!1. c. 24) — V: Villány (!Simk. 171), Máriagyűd (!) — Ma: Fazekasboda, Németpalkonya, Baksa (!) — H: Högyész, Szentkatalin (!), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38), „Bat”, „Remete” (Hollós 105), „Gurovica” (Bs.) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O: Harkány (!)
817. **E. dulcis** L. (Édes kutyatej)
J: Magyarürög (Kárp.!) — V: Harsány (Simk. 171) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14)
818. **E. palustris** L. (Mocsár kutyatej)
O: Pécs „környéke” (!Nendtv. 22), Pellérd, Harkányfürdő, Nagyárpád (!), Drávaszabolcs (!Kit. 1. 14), Máriagyűd „Büdös-tó” (1. c.) — D: „Rét-erdő” (1. c. 29), Karapanca (Tuzson BK 1914 139), Kölked (!)
819. **E. helioscopia** L. (Napraforgó kutyatej)
Vulgaris. Közönséges.
820. **E. villosa** W. et K. (Bozontos kutyatej)
Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11) — O: Vajszló (!)
821. **E. Seguieriana** Neck. (Pusztai kutyatej)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22, Kit. 1. 6, **b. perumbellans** Borb. NV! apud Horv. Borbásia I 98, **c. homophylla** Láng! 1. c.), „Lapis” (!) — Z (!), Hosszúhetény (!Kit. 1. 17) — Ma: Nagypall (1. c. 20), Pécsudvard (Horv. É. 11), Feked (1. c. 12, **b.**!), Németpalkonya (!) — H: Högyész (!) — D: Mohács (Knapp)

822. *E. glareosa* Pall. (Magyar kutyatej)
 Pécs (Maj! apud Horv. PM2 6) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 105)
E. nicaeensis All. — Pécs „környéke” (Nendtv. 22, Maj! 28) = *glareosa* (Horv. 1. c.)
823. *E. salicifolia* Host (Füzlevelű kutyatej)
 Baranya (!K.-Nendtv. 567)
824. *E. cyparissias* L. (Közönséges kutyatej)
 Vulgaris. Közönséges.
825. *E. esula* L. (Sárfűtej)
 T: Pécs (!Maj. 26, 28), „Gyárváros” (Simk. 171) — Z: Püspöknádasd (!)
 — Ma: Kékesd (Kit. 1. 20) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 38) —
 O: Szentlőrinc (Kit. 1. 4) — D: Dárda (1. c. 26)
826. *E. virgata* W. et K. (Vesszős kutyatej)
 Vulgaris. Közönséges.
827. *E. lucida* W. et K. (Fényes kutyatej)
 T: Pécs (K.-Nendtv. 567) — SZ: Szekszárd (Hollós 105) — In planis
 vulgaris. Síkságon közönséges.
828. *E. amygdaloides* L. (Erdei kutyatej)
 In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 15)
829. *E. exigua* L. (Apró kutyatej)
 Pécs (Nendtv. 22, Maj! 28, Simk. 171) — O: Sellye (1. c.) — D: Mohács (Zsák)
830. *E. peplus* L. (Vézna kutyatej)
 Pécs (Maj. 28) — O: Harkány (Zsák)
831. *E. falcata* L. (Tarló kutyatej)
 T: Pécs (Nendtv. 22, Simk. 171) — V: Harsány (1. c.) — SZ: Szekszárd, „várdomb” (Hollós 105)

Callitrichaceae. Mocsárhúrfélék.

832. *Callitriche polymorpha* Lönnr. (Változó mocsárhúr)
 T: Pécs „Mecsek” (Simk.! 200, *b. limicola* Soó (sub *stagnali*) apud Soó MBIM 1928 63) — Z: Püspöknádasd „Lapátvár” (1. c. partim *b.*) —
 Ma: Vokány „Terentás” (1. c.) Palotabozsok (Boros apud Soó 1. c.)
833. *C. verna* L. (Tavaszi madárhúr)
 T: Pécs (Maj.! 29), „Nagymélyvölgy” (Simk. 200) — Ma: Palotabozsok „Weiher” (Boros MBL 1924 40, ad 832 pertineat?) — O: Pécs „Megyer” (Maj. K. apud Horv. PM2 10), Sellye (Simk.! 200, *b. minima* Rchb. apud Soó 1. c. 63)

Anacardiaceae. Szömörcefélék.

834. *Cotinus coggygria* Scop. (Cserszömörce)
 T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 30)

Celastraceae. Kecskerágófélék.835. *Euonymus verrucosa* Scop. (Bibircs kecskerágó)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — Z: Hosszúhetény (*b. laevifolia* Beck Horv. Borbásia II 29)

836. *E. europaea* L. (Csikos kecskerágó)

Vulgaris. Közönséges. — T: Pécs „Mecsek” (*b. angustifolia* (Schltz.) Roy Horv. 1. c.)

Staphyleaceae. Hólyagfafélék.837. *Staphylea pinnata* L. (Hólyagfa)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 32), „Lámpás” (!Kit. 1. 7), „Daindol” (1. c. 8), „Lapis” (!) — Z: (Fekete-Blattny 608), Pécsvárad (Soó) — V: Harsány (!Simk. 172, Kit. 1. 13), Veresmart (Marsigli 73) — Ma: Vokány (1. c. 11), Hercegszabar, Baksa (!) — H: Kisvaszar (!), Lengyel, Kurd (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd (Fekete-Blattny 611), „kapolna”, „Bat”, „Csatár” (Hollós 105) — ZS: Kishárság „Szenttamás-Cserhegy” (Kit. 2. 14), Gálosfa (1. c. 15)

Aceraceae. Juharfafélék.858. *Acer tataricum* L. (Feketegyűrű juharfa)

Baranya (!Kit. apud N I 298, apud Jáv. AMNH 1926 450) — J: Magyarürög (Kit. 1. 8), Hetvehely, Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 13, 16, Kit. 1. 7), „Istenkút” (!), „Lámpás”, „Daindol” (1. c. 8), „Luftkolonie” (Fekete-Blattny 609) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — V: Siklós, Máriagyúd, Beremend (1. c. 14, 30, 27) — Ma: Siklós-vokány (1. c. 16) — H: Szalatnak, Gödre-Gálosfa (1. c. 26) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 29), „Bat” (Hollós 105) — ZS: Kaposvár, Zselickisfalud (Fekete-Blattny 615), Gálosfa, Szentlászló, Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 15, 14) — O: Szentlőrinc (Kit. 1. 30) — D: Dunaszekcső, Bár-Mohács, „Réterdő” (1. c. 22, 28)

839. *A. platanoides* L. (Jókori juharfa)

M: (!Nendtv. 16) — Z: (Fekete-Blattny 608), Magyaregregy-Kárász (!) — V: Harsány (!) — Ma: Kistótfalu (!) — H: Nagytterecsény (!), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 105) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15), Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)

840. *A. pseudo-planatus* L. (Hegyi juharfa)

J: Mecsekalja, Hetvehely (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 16, Simk. 172, NV!) — Z: (!1. c.), Pécsvárad (!)

841. *A. campestre* L. (Mezei juharfa)

Vulgaris. Közönséges.

ssp. leiocarpum (Opiz) Pax *a. austriacum* (Tratt.) DC. — T: Pécs „Mecsek” (NT) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Bat” (Hollós 105) — *b. suberosum* (Dumort.) Rogow. — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 39)

ssp. marsicum (Guss.) Hay. *v. trifidum* Borb. — T: Pécs „Mecsek” (Horv. Borbásia I 98)

Balsaminaceae. Nenyuljhozzámfélék.842. *Impatiens noli-tangere* L. (Nenyuljhozzám)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 24, BK 22, A)

Rhamnaceae. Bengefélék.843. *Rhamnus cathartica* L. (Varjútövis)

Vulgaris. Közönséges.

? *Rh. tinctoria* W. et K. — M: (Janka apud N II 88)844. *Frangula alnus* Mill. (Kutyabenge)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 30), „Lámpás”, „Daíndol” (Kit. 1. 7, 8) — Ma: Hercegszabar (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Hollós MBL 1914 59) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15) — O: Sellye (Simk. 171), Gordisa (Boros MBL 1924 40), Siklós (Kit. 1. 14), Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 15), Okorág, Sósvertike (!) — D: „Réterdő” (Kit. 1. 28), Riha-tó (!)

Paliurus spina Christi Mill. — Culta et subspontanea — T: Pécs „Mecsek” (Soó)*Vitaceae*. Szőlőfélék.845. *Vitis silvestris* Gmel. (Ligeti szőlő)

SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 105) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15.) — O: Siklós (!), Máriagyűd (Kit. 1. 14, 28), Sósvertike, Endrőc (!) — D: „Réterdő” (1. c. 30)

Tiliaceae. Hársfafélék.846. *Tilia tomentosa* Mnch. (Magyar hársfa)In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Alsószentmárton, Szentegát (!) — a. *petiolaris* DC. — V: Harsány (!) — b. *calvescens* Schur — T: Pécs „Mecsek” (!) — Ma: Vilyánykövesd (!) — c. *sessilinguis* Borb. — Baranya (Wagner Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 1933. sep. 52) — d. *subcalvescens* Wagn. — Pécs (Wagner 1. c.)847. *T. cordata* Mill. (Kislevelű hársfa)

J: (Fekete-Blattny 607, Kit. 1. 8), Abaliget (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 32), „Daíndol”, „Kantavár” (Kit. 1. 8, 9) — Z: (1. c. 18), Máza (1. c. 25), Pécsvárad (!) — Ma: Püspöklak (1. c. 21) — H: Gödre (1. c. 26), Kisvaszar, Palé (Horv. É. 12, 13) — ZS: Szigetvár-Szentlászló (Kit. 2. 14), Kaposújlak (Bs.), Kaposvár (KH!)

848. *T. platyphyllos* Scop. (Nagylevelű hársfa)

J: (Kit. 1. 8) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 32, Kit. 1. 7), „Lámpás”, „Kantavár” (1. c., 9) — Z: (1. c. 18), Máza (1. c. 25), Püspöknádasd (Fekete-Blattny 607)

849. *T. rubra* DC. (Veres hársfa)b. *Frivaldszkyanorum* Borb. — Pécs (Wagner 1. c. 13)

Tiliarum species, formae et hybridae non expresse spontaneae notatae v. 1. c. apud Wagner.

Malvaceae. Mályvafélék.

850. **Abutilon Theophrasti** Medik. (= **Avicennae** Gärtn.) (Szépasszony tenyere)

O: Pécs „környéke” (Nendtv. 31, Maj. 29), Drávaszabolcs (Kit. apud N I 295), Sellye (Simk. 174) — D: Laskó (1. c.)

851. **Lavatera thuringiaca** L. (Papsajt)

Vulgaris. Közönséges.

852. **Althaea hirsuta** L. (Borzas ziliz)

T: Pécs „környéke” (!Nendtv. 16) — Z: (Simk. 174), Hosszúhetény, Pécsvárad (Janka apud N II 85) — V: Harsány (Simk. 174) — O: Pécs-Nagypárad (K.-Nendtv. 569) — D: Dráva „torkolat” (Marsigli 53)

853. **A. cannabina** L. (Kender ziliz)

T: Pécs „Mecsek” (!PM. It. 142), „Makár” (Maj. apud Horv. PM4 15), „Bálics” (Horv. Borbásia I 99) — Z: Pécsvárad (!Kit. apud N I 293), Vár-alja (Kit. 1. 24) — V: Máriagyűd „Tenkes” (Bs.) — Ma: Geresd (Kit. 1. 21) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Hollós 104)

854. **A. officinalis** L. (Orvosi ziliz)

Vulgaris. Közönséges.

855. **A. biennis** (Winterl) Borb. (Halvány ziliz)

Baranya (Kit. 1. 22, Simk. 175) — J: Magyarűrög (Kit. 1. 8), Szent-lőrinc (K.-Nendtv. 569) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 17) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Pécsvárad (K.-Nendtv. 569), Zengővárkony (!) — V: Harsány (Bs.) — Ma: Feked (!) Püspöklak (Kit. 1. 26) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár”, Belac (Hollós 104), Mórág (Bs.) — D: Kistapolca (Kit. 1. 14)

856. **Malva alcea** L. (Csillagszörös mályva)

Pécs „környéke” (Nendtv. 26, BKA, Maj., Balek!) — Ma: Nagynyárad (Janka ÖBZ 1867 404) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14) — O: Sellye (K.-Nendtv. 571), „Kápolnap.” (Simk. 175), Baranya-hídvég „Bükkhát” (Horv. É. 16)

857. **M. silvestris** L. (Erdei mályva)

Vulgaris. Közönséges. — **b. hispida** Beck — SZ: Szekszárd (Bar-tal 39)

858. **M. neglecta** Wallr. (Papsajt mályva)

Vulgaris. Közönséges.

859. **M. pusilla** With. (Apró mályva)

Pécs „környéke” (!Nendtv. 26) — SZ: Szekszárd „Remete” (Hollós 104) — D: Mohács (Knapp)

860. **Hibiscus trionum** L. (Varjúmák)

Vulgaris. Közönséges.

Hypericaceae. Orbáncfűfélék.

861. **Hypericum humifusum** L. (Heverő orbáncfű)

Pécs „környéke” (Maj.) — O: Sellye (!Simk. 174), Harkány (Zsák)

862. **H. acutum** Mnch. (Mocsári orbáncfű)

J: (!) — O: Pécs, Gordisa (Simk. 174), Páprád (!) — D: Dárda (Kit. 1. 26)

863. **H. perforatum** L. (incl. **b. angustifolium** DC.) (Közönséges orbáncfű)

Vulgaris. Közönséges.

864. **H. hirsutum** L. (Borzas orbáncfű)

J: (!), Kövágószőlős (Simk. 174), Vöröshegy, Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 24, Kit. 1. 7), „Daindol” (1. c. 8), „Kisrét” (!) — Z: Hosszúhetény, Szászvár (!) — V: Villány (Simk. 174), Siklós (Kit. 1. 14) — Ma: Borjád, Erdősmecske (Kit. 1. 11, 12), Németspalkonya, Hercegtöttös, Hercegszabar, Baksa, Görcsöny (!) — H: Kisvaszar, Bakóca, Palé (Horv. É. 12, 13), Högyész, Szentbalázs (!), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 104) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14), Kaposvár „Nádasdi erdő”, Töröcske „Rapol” (!) — O: Páprád „Tilos erdő”, „Bükkhát” (Horv. É. 15, 16), Szentegát, Alsószentmárton, Besence, Sellye, Sósvertike (!)

865. **H. montanum** L. (incl. **v. elegantissimum** Cr.) (Hegyi orbáncfű)

J: (!Kit. 1. 8), Magyarürög „Egervölgy”, Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (Maj. 30), „Kantavár” (Kit. 1. 9) — Z: Szászvár „Dobogó” (!) — V: Máriagyűd (Simk. 174) — Ma: Erdősmecske (Horv. É. 12) — H: Kisvaszar (1. c.) — SZ: Szekszárd „Csatár”, Szálka (Hollós 104)

H. elegans Steph. — M: (BK 21) = (secundum BKA) *perforatum*!

866. **H. maculatum** Cr. (Foltos orbáncfű)

M: (Nendtv. 24, Maj. 30., Maj. K.) — V: Harsány (Kit. Add. 245 secundum N I 296)

Elatinaceae. Látonyafélék.

867. **Elatine alsinastrum** L. (Pocsolya látonya)

O: Sellye „Kápolna p.” (Simk. 174, Moesz MBL 1908 16)

868. **E. ambigua** Wight. (Kétéltű látonya)

O: Sellye „Kápolna p.” (1. c.)

Tamaricaceae. Tamariskafélék.

869. **Myricaria germanica** (L) Desv. (Csermely ciprus)

Pécs „környéke” (Nendtv. 32, Maj. 30, rara Maj. K.)

Cistaceae. Szuharfélék.

870. **Helianthemum ovatum** (Viv.) Dun. (Közönséges tetemtoldó)

J: (!Kit. 1. 8), Orfű (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 175, Kit. 1. 6), „Bányatelep” (!), „Bertalan-szikla” (Horv. PK28 5) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — V: Harsány (!), Beremend (Kit. 1. 12, 28), Máriagyűd (!) — Ma: Feked (Horv. É. 12), Fazekasboda (!) — SZ: Szekszárd (Bartal 39), „Bat”, „Csatár” (Hollós 104) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15)

871. **H. nummularium** (L) Dun. (Molyhos tetemtoldó)

M: Pécs „környéke” (Nendtv. 24, NV!) — V: Harsány (!)

872. **H. canum** (L) Baumg. (Szürke tetemtoldó)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 24), Bánytető (!) — V: Harsány (!Kit. Add. 200, Kit. 1 apud Jáv. AMNH 1926 570)

873. *Fumana vulgaris* Spach. (Naprózsa)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 24, Kit. apud N I 269), „Tettye” (!) — V: Máriagyúd (Simk. 175)

Violaceae. Ibolyafélék.

874. *Viola odorata* L. (Illatos ibolya)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34) — Z: (!) — V: Harsány (!Simk. 175) — Ma: Nagynyárád (Janka ÖBZ 1867 161), Pécsudvard (Horv. É. 11), Baksa, Hercegszabar (!) — H: Kurd (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd, „Bat” (Hollós 104) — O: Málom, Sellye (!)

875. *V. cyanea* Cel. (Kék ibolya)

J: Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (Horv. PM4 13, lus. *roseiflora* et *pallidiflora*!), „Szkokó” (!), „Lapis” (Soó) — Z: (!) — V: Harsány (Horv. 1. c.) — ZS: Kaposvár (KH!)

876. *V. alba* Bess. (Fehér ibolya)

J: Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 175, b. lus. *violacea* Wiesb., Horv. PM4 14), „Bányatelep”, „Szkokó” (!), „Arpádtető”, Magyar-szék (!), Pécsbuda (b. Horv. 1. c.) — Z: (!Simk. 175, b. Horv. 1. c.), Hosszúhetény, Szászvár (!), Zobák, Püspöknádasd (b.!) — V: Harsány (!), Villány (Simk. 175) — Ma: Pécsudvard (b. Horv. É. 11), Baksa, Göröcsny, Hercegszabar (!) — H: Kurd (Jáv.-Zóly.), Högyész, Nagytterecsény, Magyar-szék, Szentkatalin (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 104) — ZS: Töröcske „Rapol” (!) — O: Marócsa (!)

877. *V. hirta* L. (Borzas ibolya)

J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34) — Z: Hosszúhetény (Simk. 175) — V: Harsány (1. c., Bs.), Németpalkonya (!) — Ma: Villánykövesd, Apátvarasd (Horv. É. 11, 12) — H: Kisvaszar (1. c.) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 104) — O: Sellye, Alsószentmárton (!)

878. *V. ambigua* W. et K. (Csuklyás ibolya)

Baranya (Nendtv. 34, Maj. 30, Maj. K.)

879. *V. mirabilis* L. (Csodás ibolya)

T: Pécs „Mecsek” (NV!, Soó) — V: Villány (Simk. 175) — Ma: Borjád (Horv. É. 11) — H: Lengyel (Jáv.-Zóly.), Högyész (!)

880. *V. rupestris* Schm. v. *arenaria* (DC.) Beck (Homoki ibolya)

Baranya (Nendtv. 34, Maj. 30, Maj. K.)

881. *V. silvestris* Lam. (Erdei ibolya)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — Lus: 1. *pallescens* Neum., 2. *albiflora* Lange, 3. *rosea* Neum., 4. *lilacina* Cell. — T: Pécs „Mecsek” (1, 2, 3, 4, Horv. Borbásia II 29) — O: Bánfa, Okorág, Marócsa, Szentegát (1, 2) — D: Mohács-Sátorhely (!)

882. *V. Riviniana* Rchb. (Nagyvirágú ibolya)

T: Pécs „Mecsek” (Horv. PM2 7), „Lámpás”, „Bányatelep” (!) — Z: Zobák (1. c.) — Ma: Hercegszabar (!) — H: Szatina-Kishajmás v. á., Nagytterecsény (!), Kurd-Lengyel (Jáv.-Zóly.), Palé, Bakóca (Horv. É. 13) — O: Sellye (!)

883. *V. canina* L. (Ebviola)

J: Petőc (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 34, Maj. 30, BK 7), „Lámpás” (Sz!) — Z: Zobák (!)

884. **V. montana** L. (Hegyi ibolya)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34) — Z: Hosszúhetény (!)
885. **V. erecta** Gilib. (= **elator** Fr.) (Nyulánk ibolya)
O: Pécs „környéke” (!Nendtv. 34), Szentlőrinc (Horv. PM4 19),
Bánfa, Vásárosszentgál (!)
886. **V. tricolor** L. (Háromszínű árvácska)
J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34), „Bálics” (!) — V: Harsány (!)
ssp. luteola (Schur) Soó — T: Pécs „Mecsek” (Horv. PM2 7) —
Z: (1. c.)
887. **V. arvensis** Murr. (Mezei árvácska)
Vulgaris. Közönséges. — **b. segetalis** (Jord.) Gr. — SZ: Szekszárd
„Remete” (Bartal 39) — **c. agrestis** Jord. — T: Pécs „Tettye” (Horv. Bor-
básia I 98) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 39)
888. **V. Kitaibeliana** R. et Sch. (Törpe árvácska)
T: Pécs „Mecsek” (non typica Horv. PM2 9) — V: Harsány (!Simk. 175)
889. **V. perplexa** Greml. (**V. mirabilis** × **V. silvestris**)
ZS: Töröcske „Rapol” (!)
890. **V. permixta** Jord. (**V. odorata** × **V. hirta**)
T: Pécs: Mecsek (Horv. PM2 14)
891. **V. vindobonensis** Wiesb. (**V. odorata** × **V. cyanea**)
Z: (1. c.) — V: Harsány (1. c.)
892. **V. adulterina** Godr. (**V. alba** × **V. hirta**)
V: Harsány (1. c.)
893. **V. intermedia** Rchb. (= **nemorosa** N. W. M.) (**V. silvestris** × **V. Riviniana**)
T: Pécs „Tettye” (Horv. Borbásia I 98), „Lámpás” (!) — Z: Váralja-
Püspöknádasd (!) — V: Harsány (!) — Ma: Baksa (!) — H: Szentbalázs (!)
ZS: Kaposvár „Nádasdi, Tótfalui erdő” (!)

Thymelaeaceae. Boroszlánfélék.

894. **Thymelaea passerina** (L.) Coss. (Cicó)
J: Boda (!) Magyarürög (Kit. 1. 10) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv.
32, NV!), „Makár” (Maj! apud Horv. PM4 15), Vasas (Kit. 1. 18) — V:
Harsány (Kit. 1. 12), Villány, Máriagyűd (Simk. 197) — Ma: Palotabozsok
(Bs.), Somberek (Zsák) — H: Bükkösd (Zsák) — O: Szentlőrinc (Kit. 1. 5),
Siklós, Harkány (Zsák) — D: Mohács (Zsák)
895. **Daphne cneorum** L. (Henyé boroszlán)
Pécs (Ballay exsicc. apud Horv. PM4 13)
896. **D. mezereum** L. (Farkas boroszlán)
M: (!Nendtv. 21) — J: Abaliget, Petőc (!), Hetvehely (Horv. Borbásia
I 99) — T: Mánfa „Sikonda” (Horv. 1. c.) — Z: Szászvár (!) — H: Kisvaszar,
Palé (Horv. É. 12, 13), Bakóca, Nagytetecsény, Szentbalázs, Egyházbér ad
Szatina (!) — ZS: Gálosfa, Szentlászló (Kit. 2. 15, 14), Kaposújlak
(Bs.), Kaposvár „Nádasdi erdő”, Kardosfa-pszt. „Rapol” (!) — O: Szent-
gát „Púpos erdő” (!)

Lythraceae. Füzényfélék.

897. **Peplis portula** L. (Tócsahúr)
T: Pécs „Mecsek” (Maj. 29, Simk. 169), Mecsekszabolcs (K.-Nendtv. 567, 571) — V: Villány, Máriagyüd (Simk. 169) — O: Sellye (1. c.)
898. **Lythrum hyssopifolia** L. (Törpe füzény)
Pécs „környéke” (Nendtv. 26, Simk. 169) — V: Villány, Máriagyüd (1. c.) — ZS: Bőszénfa „Lukafa-psz.” (K.-Nendtv. 571) — O: Dráva-szabolcs (Boros MBL 1924 41), Sellye (!)
899. **L. salicaria** L. (Réti füzény)
Vulgaris. Közönséges.
900. **L. virgatum** L. (Vesszős füzény)
Baranya (Nendtv. 26) — Ma: Nagynyárád (Janka apud N II 92) — SZ: Szekszárd (Hollós 106)

Oenotheraceae. Ligetszépefélék.

901. **Epilobium hirsutum** L. (Borzas füzike)
Vulgaris. Közönséges. — **b. villosissimum** Koch — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Bat”, Szálka (Hollós 106)
902. **E. parviflorum** Schreb. (Kisvirágú füzike)
Vulgaris. Közönséges.
903. **E. lanceolatum** Seb. et Mauri (Lándzsás füzike)
J: (Horv. Borbásia I 94), Mecsekalja (!) — Z: Szászvár „Dobogó” (1. c.), Pécsvárad (Boros apud Horv. 1. c.) — Ma: Geresd (Horv. 1. c.)
904. **E. montanum** L. (Hegyi füzike)
J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22), Komló (!) — Z: Magyar-egregy „Somos” (!), Püspöknádasd (Simk. 169) — Ma: Vokány „Terentás” (1. c.), Erdősmecke (Kit. 1. 12) — H: Kisvaszar, Palé (Horv. É. 12, 13) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Bat”, Szálka, Belac (Hollós 106) — O: Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 16)
905. **E. collinum** Gmel. (Dombi füzike)
Baranya (Jávorka: Magyar Flóra 745, v. subsequencia) — V: Harsány (!Simk! 169 sub *E. montanum b. lanceolatum* Koch, correxit Jávorka)
906. **E. roseum** Schreb. (Rózsás füzike)
Pécs „környéke” (Sz!) — J: Mecsekalja (!) — D: Mohács (Knapp)
907. **E. tetragonum** L. (= **adnatum** Griseb.) (Négyélű füzike)
Baranya (Nendtv. 22) — Z: Püspöknádasd (Simk. 169) — Ma: Nagy-árpád (NV!), Palotabozsok (Bs.) — O: Harkány (Simk. 169), Magyarbóly (Zsák), Sellye (!) — D: Mohács (Knapp)
908. **E. Lamyi** F. Schlitz. (Szürkezőld füzike)
T: Somogy „Ferkóirtás” (Boros apud Horv. Borbásia I 94)
909. **E. obscurum** Schreb. (Sötétzöld füzike)
D: Dárda (Simk. 169)
910. **E. palustre** L. (Mocsári füzike)
Pécs „környéke” (BK 23 A) — O: Sellye (Simk. 169)
911. **E. (= Chamaenerion) angustifolium** L. (Deréce)
Vulgaris. Közönséges.
912. **Oenothera biennis** L. (Ligetszépe)

Exceptis montanis vulgaris. Hegyvidéket kivéve gyakori.

Oe. muricata L. — Adventiva — J: Boda (Horv. Borbásia II 26)

913. *Circaea lutetiana* L. (Varázslófű)

J: (!Simk. 169) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 20), „Kisrét” (!), „Kantavár” (Kit. 1. 10), Somogy (!) — Z: (Kit. 1. 18), Püspöknádasd (Simk. 169), Szászvár, Magyaregregy „Márévár” (!) — V: Harsány (Simk. 169) — Ma: Borjád, Erdőmecske (Horv. É. 12) — H: Kisvaszar (1. c.), Nagytérecsény (!) — SZ: Szekszárd, „Csatár”, Szálka (Hollós 106) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — O: Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 15), „Tilos erdő”, Alsószentmárton, Kákics, Sellye, Sósvertike (!)

C. alpina L. — M: (Maj. 29) erroneo publicata (K.-Nendtv. 564)

Hydrocaryaceae. Sulyomfélék.

914. *Trapa natans* L. (Sulyom)

Baranya (Nendtv. 33, Kit. apud N I 314) — O: Gordisa (!Simk. 169, Maj!), „Ódráva” (!Boros MBL 1924 42), Drávasztára (!Simk. 169), Petárda (Kit. 1. 29) — D: Kisdárda (Knapp), Kopács, Bellye (Várady 74), Riha-tó (!)

Halorrhagidaceae. Süllőhínárfélék.

915. *Myriophyllum verticillatum* L. (Gyűrűs süllőhínár)

Baranya (Maj. 29, Maj. K.) — Ma: Villány (Simk. 169) — O: Drávasztára (1. c., typus cum *b. pinnatifidum* Wallr. Simk. 1 apud MBIM 1928 72), Gordisa „Ódráva” (!Boros 1. c., typus cum *b.* apud Soó 1. c.) — D: Kisdárda (Knapp), Riha-tó (!)

916. *M. spicatum* L. (Füzéres süllőhínár)

Baranya (Maj. 29, Maj. K.) — O: Gordisa (!Simk. 169) — D: Riha-tó (!Boros MBL 1922 71)

917. *Hippuris vulgaris* L. (Vizi lófark)

Baranya (Maj. K.) — O: Gordisa (Maj!, Simk. 169 apud Soó *b. terrestris* Schwarz 1. c. 75) — D: Laskó (Simk. 169), Földvári-tó (Boros! MBL 1922 71, apud Soó *c. fluvialis* Kunth 1. c.)

Araliaceae. Borostyánfélék.

918. *Hedera helix* L. (Borostyán)

J: (!), Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23) — Z: (Kit. 1. 18), Magyaregregy „Márévár” (!) — V: Harsány (Simk. 181, Kit. 1. 13) — Ma: Villánykövesd, Erdőmecske (Horv. É. 11, 12), Geresd, Baksa, Göröcsöny (!) — H: Kisvaszar, Palé, Bakóca (1. c. 12, 13). Lengyel, Kurd (Jáv.-Zóly.), Högyész, Szentbalázs (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 39), „Bat”, „Csatár” (Hollós 105) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15), Kaposújlak (Boros VSz 1936 83), Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasi erdő” (!) — O: Bánfa, Okorág, Szentegát, Marócsa, Páprád (!) — D: (Fekete-Blattny 771)

Umbelliferae. Ernyősök.

919. *Hydrocotyle vulgaris* L. (Vizi gázló)

O: Pécs „környéke” (forte ad Dráva) (Maj! apud Horv. PM2 4)

920. *Sanicula europaea* L. (Gömbernyő)

J: (!), Hetvehely (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30), „Árpádtető”, „Mélyvölgy” (!), „Büdöskút” (Bs.), Komló, Mánfa „Sikonda” (!) — Z: (!), Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Pécsvárad (!) — V: Harsány (Simk. 182) — Ma: Borjád (Horv. É. 11), Kistótfalu, Erdősmecske (!) — H: Kisvaszar, Bakóca (1. c. 13), Nagytterecsény, Högyész, Szentbalázs (!), Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 39), „Bat”, „Csatár” (Hollós 105), „Gurovica” (Bs.) — ZS: Kaposvár „Nádasdi, Tótfalui erdő” (!) — O: Páprád (Horv. É. 15), Marócsa, Szentegát (!)

921. *Astrantia major* L. (Zápóca)

Baranya (Maj. 31)

922. *Eryngium campestre* L. (Mezei iringó)

Vulgaris. Közönséges.

923. *Chaerophyllum aromaticum* L. (Fűrészbaraboly)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 27), „Lámpás” (Kit. 1. 7) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 106)

924. *Ch. aureum* L. (Arany baraboly)

b. maculatum (Willd.) Boiss. — J: (**b.**!), Hetvehely (!), Vöröshegy (Kárp.) — T: Pécs „Mecsek” (NT, !Kit. apud N I 222), „Lámpás” (Kit. 1. 23), „Kisrét” (!K.-Nendtv. 567, 570), „Mélyvölgy”, „Remeterét” (Simk. 181), „Lapis” (Maj. K. apud Horv. PM2 11, **b.**!), „Melegmányivölgy” (**b.**!), „Büdöskút” (**b.** Bs.), „Bertalan-kápolna” (Kit. 1. 10)

925. *Ch. temulum* L. (Bódító baraboly)

J: Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 27), „Kisrét” (!Simk. 181) — Z: (!Kit. 1. 18) — V: Villány, Harsány (Simk. 181) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11), Kistótfalu, Hercegszabar (!) — H: Kisvaszar (1. c. 13), Högyész, Nagytterecsény (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 106) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)

926. *Ch. bulbosum* L. (Csemege baraboly)

T: Pécs „környéke” (!Nendtv. 27, NV!) — V: Harsány (Simk. 181) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 106)

927. *Anthriscus vulgaris* Pers. (= *scandix* (Scop.) Aschers.) (Berzenke turbolya)

V: Harsány (Simk. 181) — SZ: Szekszárd (Bartal 39) — O: Pécs „környéke” (Maj. 32, NV!), „Megyer” (Maj. apud Horv. PM4 15)

928. *A. trichospermus* Schult. (Közönséges turbolya)

Vulgaris. Közönséges.

929. *A. silvester* (L) Hoffm. (Erdei turbolya)

T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 31), „Mélyvölgy” (Soó) — O: Pécs „Megyer” (Maj.!)

A. cerefolium (L) Hoffm. — Culta et subspontanea — Pécs (Nendtv. 20, Maj.!, Sz!)

930. *Torilis arvensis* (Huds.) Lk. (Vetési tüskemag)

J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 33, NV!) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Villány, Harsány (Simk. 182) — SZ: Szekszárd (Hollós 106) — O: Harkány (!1. c.), Drávaszabolcs (!), Szentlőrinc (Lengyel: A magyar lucernamag... 51)

931. *T. rubella* Mnch. (= *anthriscus* (L) Gmel.) (Bojtorjános tüskemag)

Vulgaris. Közönséges.

932. *Caucalis latifolia* L. (Begence)
Pécs „környéke” (Nendtv. 19, NV!, Maj.! 32, Maj. K.) — Z: Hosszúhetény (Simk. 182)
933. *C. lappula* (Weber) Grande (= *daucoides* L.) (Közönséges ördög-bocskor)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19), „Tettye”, „Szkokó” (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17, Simk. 181) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11), Fazekasboda (!) — H: Hőgyész (!) — SZ: Szekszárd „Gurovica” (Bs.), Bátapáti, Zsibrik (Hollós 106)
934. *C. muricata* Bischoff. (Bibircses ördög-bocskor)
D: Mohács (Zsák)
C. leptophylla L. — Pécs „környéke” (Nendtv. 19) erroneo publicata (Horv. PM4 17)
935. *Orlaya grandiflora* (L) Hoffm. (Nagyvirágú laputurbolya)
J: Magyarürög (Kit. 1. 8), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19), „Báránytető” (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — V: Harsány (!Simk. 181, Kit. 1. 12), Beremend (1. c. 28) — ZS: Gálósfa (Kit. 2. 15)
936. *Smyrnum perfoliatum* L. (Özsaláta)
T: Pécs „Mecsek” (Maj.! 32)
937. *Conium maculatum* L. (Foltos bürök)
Vulgaris. Közönséges.
938. *Bupleurum rotundifolium* L. (Kereklevelű buvákfü)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19, Kit. 1. 6), „Báránytető” (!) — Z: Hosszúhetény (1. c. 17) — SZ: Szekszárd „Remete” (Bartal 39), „Bakta” „Bat” (Hollós 105)
939. *B. tenuissimum* L. (Gindár buvákfü)
O: Pécs „környéke” (Maj. 32, herbario ejus autem deest)
940. *B. junceum* L. (Tejelő buvákfü)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 19) — V: Beremend (Kit. 1. 28), Harsány (Bs.)
941. *B. affine* Sadler (Vöröslő buvákfü)
Baranya (Kit. apud N I 208) — J: Magyarürög (Kit. 1. 8) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj.! 32) — Z: Hosszúhetény (Simk. 181) — V: Harsány (Boros BK 1923 70, Kit. 1. 12), Máriagyűd (Simk. 181) — O: Harkány (1. c.)
942. *B. falcatum* L. (Sarlós buvákfü)
T: Pécs „Mecsek” (!Maj.! 32, Maj. K.)
943. *Trinia glauca* (L) Dum. (Szürke trinia)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 33), „Frühweiss” (!BK 12, A), „Havi-hegy” (!) — V: Harsány (!Bs.), Máriagyűd (!) — Ma: Pécs „Megyer” (Maj.!)
944. *T. Kitaibelii* M. B. (Kitaibel triniája)
V: Harsány (Kit.! apud Jávorka AMNH 1934 195)
- Apium graveolens* L. — Culta et spontanea — Pécs (Nendtv. 17) — J: Abaliget (Bs.)
945. *Cicuta virosa* L. (Csomorika)
Pécs „környéke” (Nendtv. 20) — D: Laskó „Óduna” (Simk. 181)
946. *Falcaria vulgaris* Bernh. (Sarlófű)
Vulgaris. Közönséges.

947. *Carum carvi* L. (Kömény)

J: Kővágószőlős (Simk. 181), Abaliget, Hetvehely (!) — T: Pécs (Nendtv. 19), „Lámpás” (!), „Mélyvölgy” (Soó), Mánfa (!) — Z: Hosszúhetény (!Simk. 181), Zobák (!) — Ma: Erdősmecske, Villánykövesd (!) — H: Högyész, Szentkatalin (!), Lengyel (Jáv.-Zóly.) — ZS: Cserénfa (!)

948. *Pimpinella major* (L) Huds. (Nagy földi tömjén)

T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 32, Maj. K., Simk. 182) — Ma: Vokány „Terentás” (1. c.) — Z: Püspökszentlászló (K.-Nendtv. 571, NV!), Hosszúhetény (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 105) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — b. *rosea* (Koch) Hay. — T: Pécs „Mecsek” (!Soó)

949. *P. saxifraga* L. (Hasznos földi tömjén)

Vulgaris. Közönséges.

950. *Aegopodium podagraria* L. (Podagrafü)

J: Mecsekajla, Hetvehely (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 32), „Istenkút”, Mánfa „Sikonda”, Komló (!) — Z: (!), Püspöknádasd (!) — V: Harsány (Simk. 181) — Ma: Villánykövesd, Ivánbattyán (Horv. É. 11), Erdősmecske, Bisse (!) — H: Kisvaszar, Palé (1. c. 12, 13), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.), Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 105), „Gurovica” (Bs.) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő”, Töröcske „Rapol” (!)

951. *Sium erectum* Huds. (Kis békakorsó)

T: Pécs (Nendtv. 31), „Kismélyvölgy” (Simk. 182) — V: Villány (1. c.) — Ma: Vokány „Terentás” (1. c.), Nagypárad (K.-Nendtv. 572), Palotabozsok (Bs.)

952. *S. latifolium* L. (Nagy békakorsó)

Pécs „környéke” (Maj. 32) — V: Villány (Simk. 182) — SZ: Szekszárd „Keselyűs”, Bata (Hollós 105) — O: Sámod, Matty (!) — D: Mohács, Kisdárda (Knapp)

953. *Seseli hippomarathrum* L. (Szilkes gurgolya)

Baranya (Maj. 32, Maj. K.) — V: Harsány (!Kit. apud N I 211) — SZ: Szekszárd „kálvária”, „kapolna” (Hollós 106)

954. *S. annuum* L. (Közönséges gurgolya)

Vulgaris. Közönséges.

955. *S. osseum* Cr. (= *dévényense* Simk.) (Szürkezőld gurgolya)

T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 32), „Makár” (Simk. 182), „Lámpás”, „Daindol” (Kit. 1. 7, 9), „Tettye” (Horv. PK28 6) — V: Beremend (Kit. 1. 28), Harsány (!) — Ma: Geresd (Kit. 1. 20)

? *S. leucospermum* W. et K. — Baranya (WK. Ic. I. 92)

956. *Libanotis montana* Cr. (Tömjénillat)

T: Pécs (Maj. 32) — Ma: Geresd (Kit. 1. 21)

957. *Oenanthe aquatica* (L) Poir. (Mételykóró)

Pécs „környéke” (Nendtv. 27, Maj. 32) — In planis vulgaris. Síkságon közönséges.

958. *Oe. fistulosa* L. (Bördös borgyökér)

ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 43) — O: Pécs (Maj. 32), Sellye (Simk. 181), Páprád, Pellérd (!)

959. *Oe. silaifolia* M. B. (Gyűrűs borgyökér)

J: Kővágószőlős (b. *media* Griseb. Simk. 181) — T: Pécs (BK 19, A) — Ma: Nagynyárád (b. Janka ÖBZ 1867 231) — SZ: Bonyhád (b. Hollós 105)

960. *Aethusa cynapium* L. (Adáz)

J: Magyarürög (Simk. 181, NV!) — T: Pécs (!Nendtv. 16), „Kismély-völgy“ (Simk. 181), „Daindol“ (Kit. 1. 8), „Gyárváros“ (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — SZ: Szekszárd „Kis Bükk“, „Sötétvölgy“ (**b. cynapoides** (M. B.) Hall. Wohlf. Hollós MBL 1914 59) — O: Drávaszabolcs (Boros MBL 1924 43) — D: Mohács (Knapp)

Silaum silaus (L) Sch. et Th. (= *flavescens* Bernh.) — Pécs „környéke“ (Nendtv. 24) erroneo publicata (Horv. PM4 17)

961. *Selinum carvifolia* L. (Derezele)

M: (Maj. 32, Simk. 182, Kit. apud N I 214) — Z: Szászvár „Dobogó“ (!) — V: Villány (Simk. 182) — Ma: Vokány „Terentás“ (1. c.) — O: Sellye (1. c.) — D: „Réterdő“ (Kit. 1. 25)

962. *Angelica silvestris* L. (Angyalgyökér)

T: Pécs (Nendtv. 17, Maj. 32, Simk. 181, BKA, Kit. 1. 9), „Lámpás“ (1. c. 7) — V: Harsány (Simk. 181) — Ma: Palotabozsok (!) — H: Almamellék (!) — SZ: Szekszárd, Bata (Hollós 106) — O: Sósvertike (!) — D: „Réterdő“ (Kit. 1. 29)

A. archangelica L. — M: (BK 23) = (secundum picturam) *Laserpitium latifolium* (Horv. PM4 17)

963. *Peucedanum carvifolia* (Cr.) Vill. (Keménylevelű kocsord)

Baranya (Kit. apud N I 215) — T: Pécs „Mecsek“ (!Maj. 32, K.-Nendtv. 567, Kit. 1. 7), „Lámpás“, „Kantavár“ (1. c., 9) — Z: Hosszúhetény (!1. c. 17) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — O: Pécs „Megyer“ (Maj. K. apud Horv. PM2 11), Sellye (Simk. 182), Siklós, Nagypeterd (Kit. 1. 14, 31)

964. *P. arenarium* W. et K. (Homoki kocsord)

O: Pécs (Sadler! apud Reichenbach: Flora germanica excursoria 460)

965. *P. alsaticum* L. (Buglyos kocsord)

T: Pécs „Mecsek“ (Nendtv. 23, Simk. 182), „Lámpás“, „Daindol“ (Kit. 1. 7, 9) — Z: Hosszúhetény (!1. c. 17), Pécsvárad (!) — V: Máriagyűd (Simk. 182, Bs.), Beremend (Kit. 1. 28), Villánykövesd (!) — Ma: Kékesd (1. c. 20) — SZ: Szekszárd „Kálvária“, „Petre“, „Csatár“ (Hollós 106) — O: Sellye (Simk. 182)

966. *P. palustre* (L) Mnch. (Mocsári kocsord)

O: Sellye (Simk. 182)

967. *P. cervaria* (L) Lap. (Szarvas kocsord)

T: Pécs „Mecsek“ (IPM It. 142), „Daindol“, „Kantavár“ (Kit. 1. 8, 10), „Makár“ (Simk. 182), „Tettye“ (Horv. PK28 6), „Szkokó“, „Lapis“-Vágot (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Zengővárkony (!) — V: Siklós, Beremend (Kit. 1. 14, 28) — Ma: Nagypall (1. c. 20) — SZ: Szekszárd „Petre“, „Bat“, „Csatár“ (Hollós 106)

968. *P. oreoselinum* (L) Mnch. (Citrom kocsord)

Pécs „környéke“ (Nendtv. 31, Maj. K.) — V: Harsány (Simk. 182) — O: Sellye (1. c.), Siklós (Kit. 1. 14, Horv. É. 16)

? *P. officinale* L. — Baranya (Maj. 32)

969. *Pastinaca sativa* L. (Paszternák)

Vulgaris. Közönséges.

970. *Heracleum sphondylium* L. (Medvetalp)

J: Boda (!) — T: Pécs „Mecsek“ (!Nendtv. 24), „Daindol“ (Kit. 1. 8) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Pécsvárad (!) — V: Villány (!Simk. 181),

Kistótfalu (!) — Ma: Hercegszabar, Görcsöny (!) — H: Palé, Kisvaszar (Horv. É. 13) — SZ: Szálka (Hollós MBL 1914 59) — ZS: Töröcske „Rapol” (!) — O: Siklós-Alsószentmárton (!)

v. angustisectum Gremlí (= **angustifolium** auct.) — V: Villánykövesd (!Kárp. BK 1935 199)

v. angustissimum Wohlf. — V: Harsány (!)

ssp. sibiricum (L.) A. et G. (= **Heracleum sibiricum** L.) — Baranya (Janka apud N II 61)

971. Tordylium maximum L. (Magtaraj)

J: Magyarürög (Kit. 1. 8), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 32, Kit. 1. 7), „Makár” (Maj. apud Horv. PM4 15), „Szkokó” (!), Somogy (Bs.!) — V: Harsány (!Simk. 182) — Z: Hosszúhetény (1. c.), Pécsvárad (!) — Ma: Feked (Horv. É. 12) — H: Nagytterecsény (!) — SZ: Szekszárd „Remete”, „Bat” (Hollós 106) — ZS: Kaposvár-Töröcske (!)

972. Laser (= Siler) trilobum (L.) Borkh. (Háromkarjú sujtár)

T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 32), „Lapis” (Simk. 182) — Z: Püspök-nádasd (1. c.), Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Pécsvárad (!) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 106)

973. Laserpitium pruthenicum L. (Rutén bordamag)

J: Magyarürög (Kit. apud N I 219) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25, RK 565, Kit. apud Jávorka AMNH 1929 202), „Lámpás”, „Daindol” (Kit. 1. 7, 8) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Siklós (Kit. 1. 14) — Ma: Erdős-mecske (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 106) — ZS: Szentlászló (Kit. apud N I 219) — O: Drávaszabolcs (1. c.)

974. L. latifolium L. (Széleslevelű bordamag)

T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 32), „Lámpás”, „Daindol” (Kit. 1. 7, 8), „Makár” (Maj.!), „Lapis” (**b. asperum** (Cr) Neilr. Horv. Borbásia I 98), Somogy (Bs.) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17)

975. Daucus carota L. (Vad sárgarépa)

Vulgaris. Közönséges.

Cornaceae. Somfélék.

976. Cornus mas L. (Húsos som)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 20, Kit. 1. 7), „Daindol” (Kit. 1. 8), „Lapis” (Fekete-Blatny 612) — Z: (!1. c.), Hosszúhetény (Kit. 1. 18) — V: Harsány (!Janka ÖBZ 1867 127), Máriagyűd (!) — Ma: Fazekasboda (Kit. 1. 20), Nagýárpád, Pécsudvard (!) — H: Kisvaszar (Horv. É. 12), Szentkatalin (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 105) — ZS: Szigetvár-Kishárságy „Szenttamás”, Gálosfa (Kit. 2. 14, 15)

977. C. sanguinea L. (Veresgyűrű som)

Vulgaris. Közönséges.


Pyrolaceae. Körtikefélék.

978. Pyrola rotundifolia L. (Kereklevelű körtike)

T: Pécs-Zobák (Kárpáti! BK 1935 199)

979. P. minor L. (Kisleveű körtike)

T: Pécs-Zobák (!Kárpáti! 1. c.), Mánfa „Melegmányivölgy” (!) — Z: Szászvár „Dobogó” (!)



980. *Monotropa hypopithys* L. (Fenyőspárga)

J: (Maj. K. apud Horv. PM2 11), Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (NT, Simk. 182, BK 19, A), „Kantavár” (Simk. 182) — Z: Püspöknádasd (1. c.), Szászvár „Dobogó” (!) — Ma: Lovászhéty (Visnya!), Feked (!)

Primulaceae. Kankalinfélék.981. *Primula vulgaris* Huds. (Közönséges kankalin)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Sellye (Horv. PM4 19), Gyöngyfa-Magyarmecske, Bánfa, Okorág, Szentegát, Nagybicsérd, Siklós, Harkány, Vajszló (!) — b. *albiflora* Evers. — Magyarszentiván (1. c., Horv. Borbásia II 29) — D: Deest. Hiányzik.

P. veris Huds. — Pécs (Maj. 35), in territorio nostro non est spontanea!

982. *Androsace maxima* L. (Nagy gombafű)

T: Pécs (!Nendtv. 9, 17), „Szokókó”, „Bálics”, „Csoronika”, „Krumplivölgy” (!), „Frühweiss” (Horv. PM2 8) — Z: Hosszúhetény (Bs.) — V: Harsány (Simk. 182) — Ma: Himesháza (Horv. 1. c.)

983. *A. elongata* L. (Cingár gombafű)

T: Pécs „Mecsek” (Maj. apud Horv. PM2 6)

984. *Lysimachia nummularia* L. (Pénzlevelű lizinka)

Vulgaris. Közönséges.

985. *L. vulgaris* L. (Közönséges lizinka)

Vulgaris. Közönséges. — b. *paludosa* Baumg. — O: Pécs „környéke” (NT), Sellye (Maj. K., NV!)

L. thyrsiflora L. — Pécs (Nendtv. 26) postea ab ipso mutata est in *vulgarem* b. (Simk. 183)

L. nemorum L. — M: (Maj.!) spontaneitas est valde dubia (Horv. PM2 4)

986. *L. punctata* L. (Pettyegetett lizinka)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 26), „Bányatelep” (!), „Kantavár” (Kit. 1. 9) — Z: (Kit. 1. 18), Váralja (1. c. 24) — V: Harsány (Simk. 183) — Ma: Vokány „Terentás” (1. c.) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 101) — ZS: Szentlászló (Kit. 2, 14) — O: Sámod „Kígyós erdő” (!)

987. *Anagallis arvensis* L. (Piros tüköz)

Vulgaris. Közönséges.

b. *coerulea* (Schreb.) Baumg. (= *A. feminea* Mill. pro specie)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17, Sz!) — V: Harsány (!) — Ma: Fazekasboda (!) — SZ: Szekszárd, Bonyhád (Hollós 101)

988. *Centunculus minimus* L. (Centike)

Baranya (Simk. 183, Maj!) — J: (Simk. 183), Kővágószőlős (1. c.) — T: Pécs (1. c.) — Z: Hosszúhetény (1. c.) — V: Máriagyűd (1. c.) — O: Sellye, Harkány (1. c.)

989. *Cyclamen europaeum* L. (Vad ciklámen, disznórépa)

M: tantum culta! (Sz!, Horv. PM2 9) — Ma: Olim. Egykor. — Birján (K.-Nendtv. 570) — Ad limites territorii — ZS: Lipótfa „Csermely” (!), Szenna ad Kaposvár (Ex litteris inspectoris silvarum Papp Z.)

Plumbaginaceae — *Statice sinuata* L. — Culta et subspontanea — Pécs (Horv. PM2 7)

Oleaceae. Olajfafélék.

990. *Fraxinus ornus* L. (Virágos kőris)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — *b. rotundifolia* Lam. — Baranya (Rochel: Pl. Ban. 44)

991. *F. excelsior* L. (Magas kőris)

J: Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 28, *b. pendula* Ait. Maj. K.) — Z: (Fekete-Blattny 609) — SZ: Szekszárd (Hollós 97) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15), Kaposvár (KH!) — O: Páprád „Borostyánpuszta”, „Bükkhát” (Horv. É. 15), Okorág, Szentegát, Bánfa, Sósvertike (!) — D: Kölked (!)

992. *Ligustrum vulgare*. L. (Fágyal)

Vulgaris. Közönséges.

Syringa vulgaris L. — Culta et subspontanea — Pécs (!Nendtv. 13, 32, Sz!)

Gentianaceae. Tárnicsfélék.

993. *Centaurium uliginosum* (W. et K.) Beck (Keskenylevelű föld-epe)

J: Abaliget (Simk. 189, herbario ejus deest) — SZ: Szekszárd (Hollós 97)

994. *C. umbellatum* Gilib. (Százforintos fű)

Praecipue *typus* — *austriacum* Ronn. — J: (!), Abaliget (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22) — V: Villány, Harsány (Simk. 189, Zsák) — Ma: Vokány „Terentás” (1. c.), Feked (Horv. É. 12) — H: Kisvaszar (1. c.), Nagytetecsény (!), Lengyel (Hollós 97) — SZ: Bat, Csatár, Szálka (1. c.) — O: Sósvertike, Páprád „Borostyánpuszta”, Sellye (!) — D: Riha-tó (Boros MBL 1922 71)

b. stenanthum (Borb.) Ronn. — SZ: Szekszárd (Hollós apud Borbás Botan. Central. 1894 163)

ssp. austriacum Ronn. — T: Pécs (Nendtvich! apud Egey Ind. Horti 1932 3)

995. *C. pulchellum* (Sw.) Druce (Csinos föld-epe)

J: Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 22, Sz!) — V: Villány, Harsány (Simk. 189) — Ma: Palotabozsok (Bs.) — H: Nagytetecsény (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy”, Bába (hic etiam *lus. albiflora* Kit. Hollós 97), Szekszárd (*b. stenotomum* Borb. 1. c.) — O: Nagypárad, Sellye, Matty (!), Páprád (*c. emarginatum* (W. et K.) Borb. Horv. Borbásia I 98) — D: Riha-tó (!)

996. *Gentiana cruciata* L. (Szent László tárnics)

J: (!Maj. K. apud Horv. PM2 11) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 23, NV!), „Havihegy” (Horv. 1. c.), „Daindol” (Kit. 1. 9), Pécsbudafa (Bs.) — Z: (!Simk. 190), Püspöknádasd (1. c.), Hosszúhetény (!) — V: Harsány „Dobogó” (Simk. 190), Beremend (Kit. 1. 28) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 97), „Gurovica” (Bs.) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14), Töröcske „Rapol” (!) — D: Dárda (1. c. 26)

997. *G. pneumonanthe* L. (Kornis tárnics)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 23, Maj. 24, 32), „Gesztenyés” (Maj. K. apud Horv. PM2 11)

998. *Blackstonia acuminata* (Koch et Ziz) Dom. (= *serotina* (Koch) Beck) (Kései gyíkpohár)

D: Riha-tó (Boros MBL 1922 71)

999. *Menyanthes trifoliata* L. (Vidrafű)

Baranya (Nendtv. 26, Kit. apud N I 160) — O: Pécs (NV!), „Megyer” (Maj! apud Horv. PM4 15)

1000. *Nymphoides orbiculata* Gilib. (= *flava* Hill.) (Tündérfátyol)

O: Pécs „környéke” (Nendtv. 34), Gordisa (!Simk. 190), „Ódráva” (!Boros MBL 1924 44), Drávasztára-Zaláta (1. c.) — D: Dárda (Kit. 1. 26), Mohács, Földvári-tó (Boros MBL 1922 71), Riha-tó (!)

Apocynaceae. Télizöldfélék.

1001. *Vinca minor* L. (Télzöld meténg)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34, Kit. 1. 6), „Kantavár” (1. c. 10), „Bányatelep”, „Lapis” (!), „Büdöskút” (Bs.), Mánfa „Sikonda” (!) — Z: Szászvár, Püspöknádasd (!), Hosszúhetény (Simk. 190) — V: Villány (1. c.), Németpalkonya „Törökcser” (!) — Ma: Erdősmecske (Horv. E. 12), Németbóly, Görcsöny (!) — H: Lengyel (Hollós 97, Jáv.-Zóly.), Szentbalázs, Hőgyész, Nagytterecsény, Szentkatalin (!), Kisvaszar (Horv. E. 12) — SZ: Szekszárd „Remete” (Bartal 39), „Bat”, „Csatár”, „Sötétvölgy”, Szálka (Hollós 97), „Gurovica” (Bs.) — ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 44), Kaposújlak (Boros VSz 1936 83), Kaposvár „Tótfalui erdő”, Kaposszerdahely „Rapol” (!) — O: Okorág (!)

1002. *V. herbacea* W. et K. (Fülevelű meténg)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 34), „Tettye”, „Lapis” (!) — V: Harsány (!Simk. 190, Kit. 1. 12, 22) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 97)

V. major L. — Culta et subspontanea — Pécs (!Maj. 25, Horv. Borbásia I 95)

Asclepiadaceae. Méreggyilokfélék.

1003. *Cynanchum vincetoxicum* (L) Pers. (Méreggyilok)

Vulgaris. Közönséges.

Asclepias syriaca L. — Culta et subspontanea — Baranya (Maj. 32) — O: Drávaszabolcs (Horv. PM2 7), Feketevíz (Csapody BK 1935 196)

Convolvulaceae. Szulákfélék.

1004. *Cuscuta pentagona* Engelm. (Nagy aranka)

J: Abaliget (Bs.) — V: Villány (!, *b. calycina* Engelm. Boros MBL 1924 44), Siklós (Bs.) — Ma: Ata, Somberek (Zsák) — H: Bükkösd (Zsák) — O: Gyöngyfa (Rónádfa), Páprád (!), Drávasztára-Zaláta (Boros 1. c.) — D: Magyarbóly (Zsák), Mohács, Riha-tó (Boros MBL 1922 71)

1005. *C. breviflora* Vis. (Kisvirágú aranka)

D: Kopács (Simk. 186)

1006. *C. europaea* L. (Közönséges aranka)

Pécs „környéke” (Nendtv. 21, NV!, Maj. 33, Maj. K.) — SZ: Szekszárd (Bartal 39)

1007. *C. epithymum* (L.) Murr. (Kakukfűfajta aranka)
Baranya (Maj. 33, Simk. 186) — J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „Tettye” (!) — Ma: Palotabozsok (Bs.) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 94)

1008. *C. trifolii* Bab. et Gibs. (Herefajta aranka)
Z: Pécsvárad (Zsák) — V: Villány (Zsák), Siklós (!Zsák) — Ma: Ócsárd (Zsák) — H: Jágónak (Zsák), Bükkösd (Lengyel: A magyar lucernamag... 49) — ZS: Kaposvár (1. c.) — O: Pellérd, Harkány (Zsák, Bs.), Sellye (!) — D: Riha-tó (Boros MBL 1922 71), Mohács (Zsák)

1009. *Convolvulus arvensis* L. (Mezei szulák)

Vulgaris. Közönséges.

1010. *C. cantabrica* L. (Borzas szulák)

J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 20, Kit. apud N I 177, lus. *albiflora* Horv.), „Makár” (Nendtv. 14), „Lámpás” (Kit. 1. 7), „Istenkút”, „Havihegy”, „Tettye” (!) — V: Harsány (!Kit. apud N I 177), Máriagyűd (!)

1011. *Calystegia sepium* (L.) R. Br. (Sövény szulák)

Vulgaris. Közönséges.

Hydrophyllaceae — *Phacelia tanacetifolia* Benth. — *Culta et subspontanea* — Pécs (!BKA)

Borraginaceae. Erdeslevelűek.

1012. *Heliotropium europaeum* L. (Európai kunkor)

J: Boda (!Kit. 1. 15) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 24) — Z: Püspök-nádasd (Simk. 187) — Ma: Pécs „Üszög”, Nagypall (Kit. 1. 10, 20) — H: Szigetvár „Domolos” (1. c. 4) — O: Bolmány (1. c. 29), Harkány (Simk. 187) — D: Mohács (Knapp)

1013. *Omphalodes scorpioides* (Hke.) Schrk. (Békaszem)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 21), „Makár” (Horv. PM4 19) — Z: Pécsvárad (1. c.) — V: Harsány (1. c. 14)

1014. *Cynoglossum officinale* L. (Ebnyelvű fű)

Vulgaris. Közönséges.

C. creticum Mill. — *Introducta* — T: Pécs „Mecsek” (Simk.! 187) — V: Harsány (Kit. apud N I 176)

Rindera umbellata (W. et K.) Bunge. — Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 567) *erroneo publicata* (Horv. PM4 17)

1015. *Lappula myosotis* Mnch. (= *echinata* Gilib.) (Koldustetű)

Vulgaris. Közönséges.

L. deflexa (Whlbg.) Garcke — Pécs „környéke” (N I 177) *erroneo citata* (Nendtv. secundum Simk. 187, cf. Horv. PM4 17)

1016. *Asperugo procumbens* L. (Magiszák)

T: Pécs (!Nendtv. 18) — Z: Pécsvárad (!) — SZ: Szekszárd (Bartal 39) — O: Pécs (!)

1017. *Symphytum tuberosum* L. (Gumós nádalytő)

J: Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 32, *b. longifolium* Beck Maj.! apud Horv. Borbásia I 98), „Lapis”, „Kisrét”, „Bányatelep”, Komló (!) — Z: Püspök-nádasd-Váralja (*b.!*) — V: Villány (!Simk. 187) — Ma: Villánykövesd, Németpalkonya, Erdősmecske (Horv. É. 11, 12), Herceg-

szabar, Pellérd (!) — H: Kisvaszar, Palé, Bakóca (1. c. 12, 13, b.), Szentkatalin, Högyész (!), Kurd, Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Sötét-völgy” (Bartal 39), „Óriás-h.” (Bs.) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szent-tamás” (Kit. 2. 14), Kaposújlak (Boros VSz 1936 83), Kaposvár „Nádasdi erdő”, Töröcske „Rapol” (!) — O: Sellye (b. Horv. Borbásia I 98), Bogdása, Alsószentmárton, Páprád, Szentegát (!)

1018. **S. officinale** L. (Orvosi nadálytő)

Vulgaris. Közönséges. — **b. ochroleucum** DC. — O: Marócsa (!)

1019. **Anchusa Barrelieri** Vitm. (Ágас atracél)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 17), „Kálvária-Mecsek” (Maj. K. apud Horv. PM2 10), „Lapis”, „Báránytető” (!) — Z: Hosszúhetény (!), Pécsvárad (Janka apud N II 52), Váralja (Kit. 1. 24), Majos (Kit. 2. 14) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 94)

1020. **A. italica** Retz. (= **azurea** Mill.) (Kék atracél)

Baranya (!Kit. apud Jávorka AMNH 1926 476) — Pécs „környéke” (!Nendtv. 14, BK 13, A) — Z: Pécsvárad, Váralja (Kit. 1. 19, 24), Zóbák (Horv. PM4 18) — V: Harsány (Simk. 186, Zsák), Máriagyűd (Kit. 1. 14) — Ma: Kékesd, Püspöklak (1. c. 20), Fazekasboda (Horv. 1. c.), Görcsöny, Hercegszabar (!) — SZ: Szekszárd „gemencei út” (Hollós 94)

1021. **A. officinalis** L. (Orvosi atracél)

Vulgaris. Közönséges.

1022. **Lycopsis arvensis** L. (Farkasszem)

Pécs „környéke” (Maj. K.) — Z: Szászvár (!)

1023. **Nonnea pulla** (L) DC. (Apácavirág)

Vulgaris. Közönséges.

?? *Alkanna tinctoria* (L) Tausch. *b. parviflora* Borb. — Pécs „környéke” (Maj. 33)

1024. **Pulmonaria officinalis** L. (Orvosi tüdőfű)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Sellye (Horv. PM6 19), Páprád (Horv. É. 16), Bogdása, Lakócsa, Marócsa, Szentegát (hic cum lus. *albiflora* Tausch.)

1025. **P. mollissima** Kern. (Bársonyos tüdőfű)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29), „Bányatelep”, „Lapis” (!), „Büdös-kút” (Bs.) — Z: Hosszúhetény, Váralja-Püspöknádasd (!) — V: Harsány „Feketehegy” (!) — Ma: Nagynyárad (Janka 1. c. 232), Baksa (!) — H: Lengyel (Jáv.-Zóly.)

1026. **Myosotis scorpioides** L. (Mocsári nefelejts)

Vulgaris. Közönséges.

1027. **M. micrantha** Pall. (Apró nefelejts)

Vulgaris. Közönséges.

1028. **M. versicolor** (Pers.) Sm. (Tarka nefelejts)

Baranya (Nendtv. 27, Maj. 33, Maj. K.)

1029. **M. sparsiflora** Mikan. (Lazavirágú nefelejts)

J: Kővágószőlős (Simk. 187) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 27) — Z: Pécsvárad (Soó) — V: Harsány (Bs., Soó) — H: Kurd-Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Remete” (Bartal 39)

1030. **M. collina** Hoffm. (Borzas nefelejts)

T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 33), „Bányatelep” (!) — V: Harsány (!Simk. 187) — H: Bakóca (Horv. É. 13) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 94)

1031. **M. arvensis** (L.) Hill. (Parlagi nefelejts)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 27) — Ma: Fazekasboda, Baksa (!) — SZ: Szekszárd „Kálvária” (Bartal 39), „Csatár”, „Bat” (Hollós 94) — ZS: Kaposvár (KH!) — O: Sellye (!)

1032. **M. silvatica** (Ehrh.) Hoffm. (Erdei nefelejts)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 27), „Bányatelep” (*lus. lactea* Boenningh. Horv. Borbásia II 29), „Mélyvölgy” (!), Melegmányivölgy (Csapody!) — Z: Hosszúhetény (!) — H: Szentkatalin (!) — ZS: Kaposvár (KH! apud Horv. É. 15)

1033. **Lithospermum officinale** L. (Kőmagvú gyöngyköles)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Harsány (!Simk. 187) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 94)

1034. **L. arvense** L. (Mezei gyöngyköles)

Vulgaris. Közönséges. — **b. strigosum** Dom. — V: Harsány (Horv. Borbásia II 29)

1035. **L. purpureo-coeruleum** L. (Erdei gyöngyköles)

J: Abaliget (Bs.), Szentlőrinc, Hetvehely (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25, Kit. 1. 7), „Istenkút”, Mánfa „Sikonda” (!) — Z: Hosszúhetény (!Kit. 1. 17) — V: Harsány (Simk. 187) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11), Hercegszabar, Baksa, Görcsöny (!) — H: Bakóca (Horv. É. 13), Högyész, Nagytetecsény (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 39), „Bat” (Hollós 94) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14), Töröcske „Rapol” (!) — O: Alsószentmárton (!)

1036. **Onosma Visianii** Clem. (Borzas vértő)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 27 *verisimiliter ad arenarium* pertinet!) — V: Harsány (Kit. apud N I 171 *vide notam praecedentem*) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 94)

1037. **O. arenarium** W. et K. (Homoki vértő)

T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 187) — V: Harsány (!Kit. apud Jávorka AMNH 1906 428, Simk. 187), Máriagyűd (1. c.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Hollós 94)

O. stellulatum W. et K. — Baranya (Nendtv. 27) *erroneo publicata* (Horv. PM4 17)

1038. **Cerinth minor** L. (Szeplőlapu)

Vulgaris. Közönséges.

1039. **Echium italicum** L. (= *altissimum* Jacq.) (Magas kígyószisz)

J: Nagypeterd, Kővágószőlős, Magyarürög (Kit. 1. 4, 5, 8) — T: Pécs (!Nendtv. 21), „Tettye” (Borbás MOTV 1894 277) — V: Máriagyűd (Kit. 1. 14, 30), Harsány (Simk. 187) — Ma: Borjád (Horv. É. 12), Püspöklak (Kit. 1. 20) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 94) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14) — O: Kistapolca (Kit. 1. 14, Bs.), Páprád „Borostyánpusztá” (Horv. É. 15), Kákics, Magyarmecske, Szigetvár, Nagybecsérd (!)

1040. **E. vulgare** L. (Terjőke vagy közönséges kígyószisz)

Vulgaris. Közönséges. — **b. Wierzbickii** Haberle — V: Harsány (Simk. 187)

1041. **E. rubrum** Jacq. (Piros kígyószisz)

Baranya (Nendtv. 21, Maj. 33, *herbariis deest!*)

Verbenaceae. Vasfűfélék.

1042. *Verbena officinalis* L. (Vasfű)Vulgaris. Közönséges. — V: Villány (lus. *albiflora*!)

Labiatae. Ajakosak.

1043. *Ajuga chamaepitys* (L) Schreb. (Kalinca infű)

Vulgaris. Közönséges.

1044. *A. Laxmanni* (L) Benth. (Szennyevirágú infű)

Baranya (WK. Ic. I. 71) — Z: Pécsvárad (Janka 1. c. 66, Kit. 1. 18, Bs.), Pécsvárad-Bátaszék (K.-Nendtv. 572) — Ma: Fazekasboda (!), Geresd, Püspöklak (Kit. 1. 20, 22) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 39), „Csatár”, „Bat”, „Petre”, „Bakta” (Hollós 96), „Óriás-h.” (Bs.) — D: Bár-Mohács (Kit. 1. 21), Mohács (Kit. apud Jávorka AMNH 1936 72)

1045. *A. reptans* L. (Ostorindás infű)J: (!), Mecsekalja, Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 16) — Z: (!), Nagymányok-Hidas (lus. *albiflora* Zirpsi), Hosszúhetény (Simk. 188) — V: Villány (1. c.) — Ma: Baksa, Villánykövesd (!), Pécsudvard (Horv. É. 11) — H: Bakóca, Högyész, Kurd, Nagytterecsény, Szentbalázs, Szentkatalin (!), Lengyel (Jáv.-Zóly.) — ZS: Kaposújlak (Bs.), Kaposvár „Nádasdi erdő”, Töröcske „Rapol” (!) — O: Sellye, Bogdása, Nagybecsérd, Okorág, Bánfa, Szentegát, Marócsa, Lakócsa, Sellye (!), Czinderybogád „Bükkhát” (Horv. É. 16)1046. *A. genevensis* L. (Közönséges infű)Vulgaris. Közönséges. — lus. *roseiflora* Koch — T: Pécs (Horv. Borbásia II 29) — Ma: Pellérd, Hercegszabar (!) — lus. *albiflora* Syr. — J: Hetvehely (!)*A. pyramidalis* L. — M: (Nendtv. 16, Maj. 34) = *genevensis* (Horv. PM4 17)1047. *Teucrium scordium* L. (Vízi gamandor)

O: Pécs (Nendtv. 32), Drávasztára (Simk. 189), Drávaszabolcs (Kit. 1. 14), Magyarbóly (Zsák), Kistapolca (Bs.) — D: Dárda (Kit. 1. 26)

1048. *T. chamaedrys* L. (Sarlós gamandor)Vulgaris in regione montana collinaque. Hegy- és dombvidéken közönséges. — V: Pécs „Mecsek” (lus. *albiflora* Horv.!)1049. *T. botrys* L. (Fürtös gamandor)

Pécs „környéke” (Nendtv. 32, NV!) — Z: (RK 564), Pécsvárad (Kit. apud Jávorka AMNH 1936 72, Zsák), Hosszúhetény (Simk. 189)

1050. *Scutellaria hastifolia* L. (Dárdalevelű csukóka)

T: Pécs (Nendtv. 31, Borbás MOTV 1894 277, Maj. NV!) — V: Villány (Simk. 189) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, Belac (Hollós 96) — O: Sellye (!Simk. 189), Páprád, Nagypárad, Pellérd (!)

1051. *S. galericulata* L. (Vizparti csukóka)Pécs „környéke” (Nendtv. 31, BK 19, A) — Ma: Villány (Simk. 189) SZ: Szekszárd (Hollós 96) — O: Sellye (Simk. 189), „Kápolnapusztá” (!), Drávaszabolcs (Kit. 1. 14), Gusztávműve (*b. hirsuta* Sauter in Dalla Torre et Sarnthein Horv. Borbásia II 29)

1052. **S. altissima** L. (Magas csukóka)

J: (!), Mecsekalja, Vöröshegy (Kárp.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 31), „Lámpás”, „Kantavár” (Kit. 1. 23, 9), „Melegmányivölgy” (Horv. PM2 8), „Lapis” (!), Mecsekszentkút (!FEA IX. 568) — V: Harsány (!Simk. 189) — Z: (!Simk. 189, Kit. 1. 18), Pécsvárad (WK. Ic. II. 133), Szászvár „Dobogó” (!) — Ma: Németbóly, Nagynyárad (!Janka apud N II 50), Borjád (Horv. É. 12) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Ebes”, „Sötétvölgy” (Hollós 96), „Óriás-h.” (Bs.)

S. simplex Nendtv. — Pécs „környéke” (NT) = *hastifolia* non ramosa? (Simk. 189)

S. latifolia Kit. — Z: (RK 6) = *altissima* (Janka apud N II 50)

Lavandula officinalis Chaix (= *spica* L.) — Culta et subspontanea — M: (!Maj. 33)

1053. **Marrubium vulgare** L. (Orvosi pemetefű)

Vulgaris. Közönséges.

1054. **M. peregrinum** L. (Fehér pemetefű)

J: Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 26, Kit. 1. 6) — V: Harsány (!I. c. 12) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 95) — D: Mohács (Knapp)

1055. **M. remotum** Kit. (Korcs pemetefű)

Pécs „környéke” (Kit. apud Schultes II. 161, Nendtv. 14, 26) — V: Harsány (!) — Ma: Nagynyárad (Janka apud N II 51)

1056. **Sideritis montana** L. (Sármányvirág)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 31, Kit. 1. 6, 15), „Makár” (BKA) — Z: Hosszúhetény, Váralja (Kit. 1. 17, 24) — V: Harsány (!Simk. 189) — Ma: Kékesd (Kit. 1. 20) — SZ: Szekszárd (Hollós 95) — ZS: Kaposvár (Lengyel: A magyar lucernamag... 55)

1057. **Nepeta pannonica** L. (Bugás macskamenta)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 27, Maj. 34, Maj. K.)

1058. **N. cataria** L. (Illatos macskamenta)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 27, Maj. 34, Maj. K.) — Z: (Kit. 1. 18) — V: Villány (Simk. 189) — SZ: Szekszárd „Bat”, Bonyhád (Hollós 95) — O: Sellye (Simk. 189)

1059. **Glechoma hederacea** L. (Kerek repkény)

Vulgaris. Közönséges. *b. magna* Mérat. — Ma: Baksa (!)

ssp. hirsuta (W. et K.) Herm. — Vulgaris. Közönséges. — In multis formis.

1060. **Prunella grandiflora** (L.) Jacq. (Nagyvirágú gyíkfű)

M: (Nendtv. 29) — J: (Simk. 189) — Z: (Kit. 1. 18) — V: Harsány „Dobogó” (Simk. 189) — Ma: Nagypárad (1. c.) — SZ: Szekszárd, „Bat”, „Csatár” (Hollós 96)

1061. **P. vulgaris** L. (Közönséges gyíkfű)

Vulgaris. Közönséges.

1062. **P. laciniata** L. (Fehér gyíkfű)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 29, Kit. 1. 6.) — V: Villány (Simk. 189) — Ma: Feked (Horv. É. 12) — H: Palé (1. c. 13) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 96) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15), Töröcske „Rapol” (!) — O: Harkány (!)

1063. *P. intermedia* Link (= *pinnatifida* Pers.) (*P. laciniata* × *P. vulgaris*)

J: Kővágószőlős (!) — Z: Zengővárkony, Szászvár „Dobogó” (Horv. Borbásia I 98) — Ma: Gilvánfa (1. c.) — *b. elatior* Salis-Marschl. — Ma: Erdősmecske (!)

1063. a. *P. bicolor* Beck (*P. grandiflora* × *P. laciniata*)

SZ: Szekszárd (Hollós ! apud Borbás: A Balaton flórája 369)

1064. *Melittis melissophyllum* L. (Mecsektea, méhfű)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges.

1065. *Phlomis tuberosa* L. (Macskahere)

Pécs „környéke” (Maj. ! 34)

1066. *Galeopsis ladanum* L. (Piros kenderkefű)

T. Pécs „Mecsek” (Nendtv. 23, NV!, Maj. ! 34, Maj. K.), „Daindol” (Kit. . 8)

1067. *G. angustifolia* Ehrh. (Keskenylevelű kenderkefű)

T: Pécs (!) — Z: Hosszúhetény (Simk. 188) — V: Harsány (1. c.) — SZ: Szekszárd, „Csatár” (Hollós 96) — O: Drávaszabolcs (*b. canescens* (Schult.) Rchb. Boros MBL 1924 44)

1068. *G. tetrahit* L. (Tarka kenderkefű)

T: Pécs (Nendtv. 23, NT!, Maj. 34, Maj. K.) — Z: (Kit. 1. 18)

1069. *G. speciosa* Mill. (Szörös kenderkefű)

J: Boda, Magyarürög „Egervölgy” (!) — T: Pécs (Nendtv. 23, Borbás Term. Füv. 1879 69, BK 24, A), „Daindol” (Kit. 1. 8.) — H: Kisvaszar (!) — Z: Szászvár (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, Bába (*b. sulphurea* Jord. Hollós 96) — O: Sellye (*b. Simk. 188, Borbás 1. c. 70, Siklós (!)*)

1070. *G. pubescens* Bess. (Pelyhes kenderkefű)

J: Vöröshegy (!) — T: Pécs (Nendtv. 23, Maj. 34), Komló (!) — Z: Hosszúhetény, Püspöknádasd (Simk. 188), Szászvár „Dobogó” (!) — Ma: Erdősmecske-Geresd (!) — H: Kisvaszar (!), Lengyel (Hollós 96) — SZ: Bonyhád, Szekszárd „Bat” (cum typo: *b. heterotricha* Borb. Hollós 96) — ZS: Kaposszerdahely „Rapol” (!) — O: Sellye (Simk. 188), Páprád (Horv. É. 15)

G. dubia Leers. — Pécs „környéke” (Maj. 34, K.-Nendtv. 567) = (secundum plantam Nendtvichi) *speciosa* b. *sulphurea* (Simk. 188)

1071. *Lamium galeobdolon* (L) Cr. (Sárga árvacsalán)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Marócsa, Páprád „Bükkhát” (!)

1072. *L. amplexicaule* L. (Bársonyos árvacsalán)

Vulgaris. Közönséges.

1073. *L. purpureum* L. (Piros árvacsalán)

Vulgaris. Közönséges. — lus. *niveum* Baumg. — O: Pécs (!)

1074. *L. album* L. (Fehér árvacsalán)

M: (Nendtv. 25, Maj. 34, Maj. K.) — V: Harsány (!) — H: Kurd (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd (Bartal 39)

1075. *L. maculatum* L. (Foltos árvacsalán)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Marócsa (!) — *b. nemorale* Rchb. — T: Pécs „Lapis” (!) — Z: Pécsvárad (Soó) — *c. crenatum* (Peterm.) Beck — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 39)

1076. *Leonurus cardiaca* L. (Szúrósgyöngyajak)

Vulgaris. Közönséges.

1077. *L. marrubiastrum* L. (Pemete gyöngyajak)

Pécs „környéke” (Nendtv. 25, Maj. 34, Maj. K.) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 95) — O: Sellye (Simk. 188), Gordisa (NV! apud Horv. PM4 15) — D: Mohács (Knapp), Magyarbóly (Zsák)

1078. *Ballota nigra* L. (Peszterce)

Vulgaris. Közönséges. — lus. *leucantha* Beck — V: Harsány (!)

1079. *Stachys officinalis* (L) Trevis. (Orvosi tisztesfű)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Sellye (!) — *b. glabrata* Koch — Pécs (Simk. 189) — *c. hirsuta* L. — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 95)

1080. *S. annua* L. (Tarlóvirág)

Vulgaris. Közönséges.

1081. *S. recta* L. (Hasznos tisztesfű)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 32), „Bányatelep”, „Báránytető” (!), „Tettye” (*b. angusta* Borb. Soó) — Ma: Fazekasboda (*b.* Horv. Borbásia II 29) — V: Beremend (Kit. 1. 28), Harsány, Máriagyűd (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 95)

1082. *S. silvatica* L. (Erdei tisztesfű)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Páprád „Tilos erdő”, „Bükkhát” (Horv. É. 15, 16), Kákics (!)

1083. *S. palustris* L. (Mocsári tisztesfű)

Vulgaris. Közönséges. — *b. petiolata* Čelak. — O: Sellye (Horv. Borbásia II 29) — *c. sessilis* Čelak. — Baranya (Horv. 1. c.)

1084. *S. alpina* L. (Havasi tisztesfű)

J: (!), Vöröshegy, Orfű (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 14, 32), „Kisrét”, „Remeterét” (!) — Z: Püspöknádasd (Simk. 189), Szászvár „Dobogó”, Pécsvárad (!)

1085. *S. germanica* L. (Fehér tisztesfű)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 32, NV!, Maj. 24, 34, BK 24, A) — V: Villány (Simk. 189) — Ma: Borjád (Horv. É. 12), Hercegtöttös (!) — SZ: Szekszárd (Hollós 95) — ZS: Szigetvár (Kit. 2. 14) — O: Matty (1. c.), Sellye, Czinderybogád „Borostyánpusztá”, „Bükkhát” (Horv. É. 15, 16)

? *S. arvensis* L. — Baranya (Maj. 34, herbario ejus autem deest!)

1086. *Salvia glutinosa* L. (Enyves zsálya)

J: Magyarürög „Égervölgy” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 30), „Makár”, „Árpádtető” (!), „Daindol”, „Kantavár” (Kit. 1. 8, 9), „Nagy-mélyvölgy” (Bs.) — Z: Püspöknádasd (Simk. 189), Szászvár (!) — Ma: Erdősmecske (Horv. É. 12), Göröcsöny (!) — H: Palé, Kisvaszar (l. c. 13), Högyész, Nagytrecsény (!), Kurd, Nagymányok (Hollós 95), Lengyel (Jáv.-Zóly.) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Sötétvölgy” (Hollós 95) — ZS: Szigetvár (Kit. 2. 14), Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O: Siklós (!Kit. 1. 14)

1087. *S. verticillata* L. (Lózsálya)

Vulgaris. Közönséges. — *b. polytoma* Borb. — Ma: Borjád, Erdősmecske (Horv. Borbásia I 98)

1088. *S. aethiopsis* L. (Magyar zsálya)

Baranya (Maj. 33, Maj. K.-Nendtv. 568)

1089. *S. austriaca* Jacq. (Osztrák zsálya)
J: Mecsekalja (Horv. PM4 19) — T: Pécs (Maj. 33, Maj. K., K.-Nendtv. 568), „Daindol” (Kit. 1. 8) — Z: Zobák-Hosszúhetény (Horv. 1. c.) — SZ: Szekszárd, Szálka (Hollós 95)
1090. *S. nemorosa* L. (Ligeti zsálya)
Vulgaris. Közönséges.
1091. *S. pratensis* L. (Réti zsálya)
Vulgaris. Közönséges. — *b. laciniata* (Jord.) Gren. — J: Mecsekalja (Horv. PM2 7) — lus. *rubicunda* (Wenderoth) Vilmorin — T: Pécs „Mecsek”, „Bányatelep” (!) — H: Kisvaszar (Horv. Borbásia II 29)
1092. *S. silvestris* L. (*S. pratensis* × *S. nemorosa*)
Pécs „környéke” (Maj. 33, Maj. K., Simk. 189, Ballay exsicc.) — J: Mecsekalja (!) — Z: (!) — SZ: Szekszárd, Belac, Szálka, Bonyhád (Hollós 95)
- S. sclarea* L. — Subspontanea — Pécs (Nendtv. 13, 30, Ballay exsicc.) — T: „Daindol”-Magyarürög (RK 6, Kit. apud Jávorka AMNH 1936 23, Kit. 1. 8)
- S. officinalis* L. — Culta et subspontanea — J: (Maj. 25, 33)
1093. *Melissa officinalis* L. (Mézfü)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 26, Kit. 1. 9), Mecsekszentkút (K.-Nendtv. 571), Somogy (Bs.) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17)
1094. *Satureja vulgaris* (L) Fritsch (Borsfű pereszleny)
Vulgaris. Közönséges.
1095. *S. acinos* (L) Scheele (Csombor pereszleny)
Vulgaris. Közönséges.
1096. *S. silvatica* (Bromf.) K. Maly (Erdei pereszleny)
J: (!Kit. 1. 8), Boda (1. c. 15) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 32, Kit. 1. 7), „Kantavár” (1. c. 9), „Nagymélyvölgy” (Bs.) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Püspöknádasd (Simk. 188) — V: Harsány (!) — H: Nagytrecsény (!) — Ma: Hercegtöttös (1. c.), Vokány, Fazekasboda, Virágos (Kit. 1. 11, 20, 27) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár”, Szálka (Hollós 95) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14) — O: Vajszló „Cseri erdő” (Horv. E. 16)
1097. *S. Pillichiana* J. Wagner (*S. intermedia* × *S. vulgaris*)
O: Harkány (Pillich apud Horv. Borbásia II 29)
S. montana L. — M: (Maj. 33) = (secundum Maj!) *Thymus vulgaris* L. (Horv. PM4 17)
1098. *Origanum vulgare* L. (Szurokfű)
Vulgaris. Közönséges.
1099. *Thymus Marschallianus* Willd. (Keskenylevelű kakukfű)
T: Pécs „Mecsek” (??Nendtv. 32, BK 18) — SZ: Szekszárd (Borbás MTK 1892 90, *b. subhirtus* Borb. Bartal 39), Bonyhád, Bátaapáti, Zsibrik, Mórág (Hollós 95)
1100. *Th. brachyphyllus* Opiz (Rövidlevelű kakukfű)
b. stenophyllus Opiz — SZ: Szekszárd „Öcsényi-h.” (Bs.)
1101. *Th. decipiens* H. Br. (Kisdud kakukfű)
b. tirolensis Lyka — V: Harsány (Bs.) — *c. trichophorus* Lyka

(× **Ortmannianus** Opiz) — V: Harsány (Bs.) — **d. pachyneurus** Lyka — V: Harsány (Soó)

1102. **Th. glabrescens** Willd. (Kopaszodó kakukfű)

Vulgaris. Közönséges. — **a.** (× **euryphyllus** Lyka) — J: Abaliget (Bs.) — **b. sparsipilus** Borb. (× **albipellis** Lyka) — T: Pécs „Mecsek” (Lengyel!) — **c. euryphyllus** Borb. — J: Abaliget (Bs.!) — T: Pécs (Borbás MTK 1892 103, Nendtv.!, Lengyel!) — V: Harsány (Bs.) — (× **euryphyllastrum** Lyka) — T: Pécs (Soó) — (× **serpens** Opiz) — T: Pécs (Csapody!) — **d. cyclophyllus** Lyka — J: Abaliget (Bs., locus classicus!) — **e. bu-densis** Lyka — V: Harsány (Soó) — **f. euryphyllastrum** Lyka — T: Pécs „Mecsek” (!Lyka! apud Jávorka: Magyar Flóra 894) — V: Harsány (Bs.!) — **g. serpens** Opiz — J: Abaliget (Bs.) — T: Pécs (Lengyel), „Büdöskút” (Bs.) — Z: (Csapody!), Pécsvárad (Soó) — V: Harsány (Bs.!) — **h. loessaceus** Lyka — V: Harsány (Soó) — **i. transdanuvianus** Lyka — T: Pécs (Nendtv.!, Lengyel!) — SZ: Szekszárd „Öcsényi-h.” (Bs.) — (× **albipellis** Lyka) — V: Villány (Wagner!) — (× **euryphyllastrum** Lyka) — T: Pécs (Nendtv.!) — (× **Th. decipiens** H. Br. **b. tirolensis** Lyka) — V: Villány (Wagner!) — **j. albipellis** Lyka — T: Pécs „Mecsek” (Soó) — (× **sparsipilus** Borb.) — T: Pécs (Lengyel!) — (**Th. auctus** Lyka f. *ellipticus* Opiz) — T: Pécs (Küm-merle-Jávorka!)

1103. **Th. auctus** Lyka (Termetes kakukfű)

b. Eisenstenianus Opiz — V: Harsány (Bs.) — **c. Hackelianus** Opiz (× **Th. glabrescens** Willd. f. *euryphyllastrum* Lyka) — T: Pécs (Jávorka et Kümmerle!) — **Th. glabrescens** Willd. (× **d. ellipticus** Opiz) — V: Harsány (Bs.)

1104. **Th. clivorum** Lyka (Dombvidéki kakukfű)

Baranya (!Lyka apud Jávorka: Magyar Flóra 895) — J: Mecsek-alja (!) — T: Pécs (!) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Harsány (!) in formis. — **b. Borosianus** Lyka — Baranya (Lyka in Jávorka 1. c.) — T: Pécs „Mecsek” (!) — V: Harsány (!Trautmann!, Bs.), Máriagyúd (!) — O: Harkányfürd: (Lyka!) — **Th. glabrescens** Willd. (× **clivorum** Lyka **b. Boro-sianus** Lyka) — O: Harkány (Lyka!) — **c. Trautmannii** Lyka — V: Har-sány (locus classicus! Lyka MBL 1930 2) — **d. Huljakii** Lyka — V: Har-sány (Trautmann!)

1105. **Th. praecox** Opiz (Korai kakukfű)

V: Harsány (Simonkai MTK 1892 593)

1106. **Th. montanus** W. et K. (Hegyi kakukfű)

J: (!Kit. 1. 8) — T: Pécs (Nendtv. 32, Maj. 33) — Z: Váralja (Kit. 1. 24) — V: Villány (Simk. 189) — Ma: Püspöklak (Kit. 1. 21) — ZS: (Kit. ined.) — **b. eunervius** Lyka — J: Abaliget (Bs.!) — T: Pécs (Boros MBL 1924 45) — O: Sellye (1. c.), Harkányfürdő (Lyka!) — **c. danubialis** Simk. — O: Sósvertike (!)

1107. **Th. parviflorus** Opiz (Kisvirágú kakukfű)

J: Abaliget (Bs.!) — V: Harsány (Bs.!) — Z: Pécs (Boros MBL 1924 45)

1108. **Th. chamaedrys** Fr. (Vékony kakukfű)

b. ovatus Mill. — O: Rónádfa (Borbás MTK 1892 69) — **c. pallens** Opiz — Z: Pécsvárad (!) — **d. procerus** Lyka — Z: Zengővárkony (!)

Th. effusus Host — Ad limites territorii — ZS: Kaposmérő (Já-vorka!)

1109. *Lycopus europaeus* L. (Vízi peszérce)

Vulgaris. Közönséges.

1110. *L. exaltatus* L. (Magas peszérce)

Baranya (Kit. apud N I 161) — T: Pécs „környéke” (NT, Maj. I 33), Pécs „Kismélyvölgy” (Simk. 188) — O: Sellye (1. c.), Pécs „Megyer” (Maj. K. apud Horv. PM2 11), Nagypeterd, Beremend, Drávaszabolcs (Kit. 1. 4, 13, 14)

1111. *Mentha pulegium* L. (Csombor menta)

In planis vulgaris. Síkságon közönséges. — **b. erecta** Wirtbg. — H: Almamellék „Sasrét” (!) — **c. sphenoides** Top. — O: Sósvertike (!) — **d. strongylophylla** Top. — J: (!)

1112. *M. longifolia* (L) Huds. (Erdei menta)

Vulgaris. Közönséges. — **b. transmota** Des. et Dur. (× **planitiensis** (Top.) Trtm.) — Z: Hosszúhetény (!) — **c. balsamiflora** (H. Br.) Trtm. — O: Drávaszabolcs (Boros MBL 1924 49) — **d. pachyloides** (Bq.) Trtm. — O: Gordisa (1. c.) — **e. brevifrons** Borb. — T: Pécs „Mecsek” (!) — (× **planitiensis** (Top.) Trtm.) — O: Matty (!) — **f. paramecophyllon** (Top.) Trtm. — Z: Hosszúhetény (!) — **g. Hollósyana** Borb. — SZ: Szekszárd „Petre”, „Bat” (Hollós 95) — O: Gordisa (Boros 1. c.), Harkányfürdő (Bs.) — **h. leioneura** Borb. — O: Sellye (1. c.) — **i. phaecoma** (Bq.) Trtm. — O: Zaláta (1. c.) — **j. Rocheliana** (Borb. et Br.) Trtm. — ZS: Kardosfa (!), Almamellék „Sasrét” (!) — (× **planitiensis** (Top.) Trtm. — H: Kisvaszar (!) — **k. planitiensis** (Top.) Trtm. — Z: Hosszúhetény (!) — **f. brevifolia** Trtm. — Pécs (!) — **l. planitiensis** (Top.) Trtm. vergens in **Porcii** (Prod.) Trtm. — Z: Hosszúhetény (!) — O: Szentlőrinc (!) — **m. planitiensis** (Top.) Trtm. (× **tomentosa** d'Urv.) — O: Máriagyűd (Boros BK 1937 98) — **n. illyrica** (Borb. et Br.) Trtm. — O: Pécs „Megyer” (!) — **o. Dumortieri** Des et Dur. — O: Sellye (Boros MBL 1924 49)

1113. *M. excedens* Trtm.

Baranya (Horv. Borbásia II 26) — O: Sellye (1. c.), Gordisa „Dázsonypusz.” (!) — **b.** (× *M. longifolia* (L) Huds. **f. integerrima** Trtm.) — O: Sósvertike (!)

1114. *M. excedentiformis* Trtm.

b. brevifrondosa Lengy. et Trtm. (× *M. longifolia* (L) Huds. **p. integerrima** Trtm.) — Pécs (Maj. I) — **b. brevifrondosa** Lengy. et Trtm. (× *M. longifolia* (L) Huds. **l. planitiensis** (Top.) Trtm.) — Pécs (Maj. I)

1115. *M. dumetorum* Schult. (Zöld menta)

b. viridior (Borb.) Trtm. — O: Gordisa (Boros MBL 1924 49)

1116. *M. aquatica* L. (Vízi menta)

Ad ripas aquarum vulgaris. Vízpartokon közönséges. — **b. polyanthetica** (Top.) Trtm. — Ma: Palotabozsok (Bs.) — D: Mohácssziget (Bs.) — **b. denticulata** Strail. **f. pontica** Top. — O: Zaláta (Boros MBL 1924 49) — **c. riparia** (Schreb.) Trtm. **f. Lobeliana** Becker — Pécs (!Maj. I) — **d. perhirsuta** (Borb.) Trtm. (× **c. riparia** (Schreb.) Trtm. **f. Ortmannia** Op.) — Baranya (Bs.) — **e. perhirsuta** (Borb.) Trtm. (× **incisoserrata** Strail) — O: Máriagyűd (Boros BK 1937 98) — **f. perhirsuta** (Borb.) Trtm. (× **purpurea** Host) — O: Máriagyűd (1. c.)

1117. *M. arvensis* L. (Mezei menta)
In planis vulgaris. Sikságon közönséges. — SZ: Szekszárd (Hollós 95)
— *b. austriaca* Jacq. f. *obtusodentata* Top. — O: Drávaszabolcs (!)
1118. *M. gentilis* L. (Nemes menta)
Culta et subspontanea. Művelik és elvadul. — O: Sellye (Simk. 189)
— D: Laskó (1. c.) — *b. resinosa* Opiz — Pécs (Maj.!)
1119. *M. verticillata* L. (Örvös menta)
ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14) — *b. ballotaeifolia*
Op. f. *ovatifolia* Top. — D: Mohácssziget (Bs.)

Solanaceae. Burgonyafélék.

1120. *Nicandra physaloides* (L) Gärtn. (Szilkesark)
Adventiva — Pécs „környéke” (NT) — T: Mecsekszabolcs (K.-Nendtv.
571) — O: Gordisa (Maj. K. apud Horv. PM2 11)
1120. a. *Lycium halimifolium* Mill. (*Indogecérna*)
Subspontanea. Meghonosodott. — T: Pécs (!Nendtv. 13, 26) — SZ:
Szekszárd (Bartal 39)
1121. *Atropa belladonna* L. (Maszlagos nadragulya)
J: Boda, Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 18), „Mély-
völgy” (!NV!), „Büdöskút” (Bs.), „Melegmányivölgy”, „Létics”, „Lapis”-
Vágot, Komló (!) — Z: Szászvár, Magyaregregy „Márévár” (!) — H: Lengyel
(Filarszky!) — V: Harsány (Simk. 186) — ZS: Kishárság „Margita-psz.”
(Kit. 2. 14)
? *Scopolia carniolica* Jacq. — Ad limites territorii — ZS: Kishárság
„Szenttamás” (Kit. apud N I 179)
1122. *Hyosciamus niger* L. (Beléndek)
Vulgaris. Közönséges.
1123. *Physalis alkekengi* L. (Zsidócsereznye)
J: Boda (!), Orfű (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 28), „Daindol”
(Kit. 1. 8) — Z: Szászvár, Magyaregregy „Márévár” (!) — V: Harsány (!) —
H: Szentbalázs (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 39), „Remete”,
„Csatár”, „Bat” (Hollós 94) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás”
(Kit. 2. 14) — O: Gordisa (Boros MBL 1924 49), Kistapolca (Bs.)
1124. *Solanum dulcamara* L. (Ebszóló)
Vulgaris. Közönséges.
1125. *S. luteum* Mill. (= *villosum* (L) Lam.) (Bozontos csucsor)
Pécs (NV! apud Horv. PM2 6)
1126. *S. nigrum* L. (Fekete csucsor)
Vulgaris. Közönséges.
1127. *Datura stramonium* L. (Csattanó maszlag)
Vulgaris. Közönséges.

Scrophulariaceae. Tatógatók.

1128. *Verbascum phoeniceum* L. (Lila ökörfarkkóró)
J: Mecsekalja, Hetvehely (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 33) —
V: Harsány (!Kit. 1. 12) — Ma: Kistótfalu, Hercegszabar (!) — H: Hö-
gyész (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 39) — D: Dráva „tor-
kolat” (Marsigli 55)

1129. **V. blattaria** L. (incl. **b. blattariforme** Griseb.) (Molyüző ökörfarkkóró)

J: (!), Vöröshegy (!), Abaliget (Bs.) — T: Pécs (Nendtv. 33), Mánfa „Sikonda” (!) — V: Villány (Simk. 185) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 39), „Bat”, „Petre” (Hollós 96) — O, D: Vulgaris. Közönséges.

1130. **V. phlomoides** L. (Szöszös ökörfarkkóró)

Vulgaris. Közönséges.

1131. **V. thapsus** L. (Molyhos ökörfarkkóró)

Pécs „környéke” (Nendtv. 33, Maj. 24, 34, Maj. K.) — O: Sellye (NV!)

1132. **V. lychnitis** L. (Csilláros ökörfarkkóró)

Pécs „környéke” (Nendtv. 33, BK 16, A) — V: Harsány (!), Villány (!Simk. 185, Kit. 1. 12)

1133. **V. speciosum** Schrad. (Kiváló ökörfarkkóró)

J: Vöröshegy (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 34, Maj. K.), „Lámpás”, „Havihegy”, „Bányatelep” (!), „Lapis” (Soó) — Ma: Görcsöny (!)

1134. **V. pulverulentum** Vill. (Pamutos ökörfarkkóró)

O: Pécs „környéke” (Nendtv. 33), Pécs-Szigetvár (K.-Nendtv. 568), Kemse (Simk. 185), Drávaszabolcs, Drávasztára-Zaláta (Boros MBL 1924 50), Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 16), Sellye, Baranyahídvég, Harkány-fürdő (!)

1135. **V. austriacum** Schott (Osztrák ökörfarkkóró)

J: (!), Abaliget (Bs.) — T: Pécs (!Simk. 185, Maj!) — Z: Pécsvárad (Bs.) — V: Harsány (!Simk. 185) — Ma: Palotabozsok (Bs.), Feked (Horv. É. 12) — SZ: Szekszárd „Bonyhád” (**b. virens** Host.), „Csatár” (Hollós 96) — ZS: Kaposmérő (Jávorka apud Boros MBL 1924 50), Kaposvár (!) — O: Drávaszabolcs, Drávasztára-Zaláta (Boros 1. c.)

1136. **V. nigrum** L. (Fekete ökörfarkkóró)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 33, BK 21, A, Kit. 1. 7), „Daindol” (Kit. 1. 5) — Z: Hosszúhetény (1. c. 17) — Ma: Feked (Horv. É. 12) — H: Újdombóvár (Bs.), Kisvaszar (!) — SZ: Bába (Hollós 96) — ZS: Kaposvár (KH!) — O: Szigetvár (Kit. 1. 4), Pécs „Balokány”, „Megyer” (!) — D: Riha-tó (Boros MBL 1922 71)

1137. **V. Schottianum** Schrad. (**V. austriacum** × **V. speciosum**)

J: Mecsekalja (Jávorka!)

1138. **V. crenatum** Borb. (**V. phlomoides** × **V. austriacum**)

T: Pécs „Nagymélyvölgy” (Simk. 186)

1139. **V. rubiginosum** W. et. K. (**V. phoeniceum** × **V. austriacum**)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 13, 33, NT, Maj. 24, 34, Maj. K.), „Lapis” (K.-Nendtv. 572)

1140. **V. mixtum** Ram. (**V. floccosum** × **V. nigrum**)

O: Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 568), Drávasztára (Simk.! apud Borbás ÖBZ 1879 318), Drávaszabolcs, Gordisa, Drávasztára-Zaláta (!Boros 1. c.), Kemse (Simk. 186 *sub floccosum* × *austriacum* Boros 1. c.)

1141. **V. ignescens** Tausch. (= **Schmidlii** Kern.) (**V. lychnitis** × **V. phoeniceum**)

V: Harsány (Boros apud Horv. Borbásia I 98)

Cymbalaria muralis C. M. Sch. — Subspontanea — T: Pécs (Maj. 35, Sz!), Pécsbudafa (Bs.) — O: Kistapolca (Boros BK 1937 99)

1142. *Kickxia spuria* (L) Dum. (Kétszínű tática)

J: Abaliget (Simk. 184) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 25, Maj. 35, Maj. K.) — Ma: Somberek (Zsák) — O: Harkány (Zsák)

1143. *K. elatine* (L) Dum. (Cseplesz tática)

J: Abaliget (Simk. 184) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 25, NV!, Simk. 184) — Z: Pécsvárad (Zsák) — V: Máriagyűd (Simk. 184), Siklós (Zsák) — Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 184), Ócsárd, Somberek (Zsák) — H: Jágónak, Bükkösd (Zsák) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 96) — O: Drávaszabolcs (Boros 1. c.), Pellérd (Zsák) — D: Mohács, Magyarbóly (Zsák)

1144. *Linaria vulgaris* L. (Közönséges gyujtoványfű)

Közönséges. Vulgaris. — *b. monstr. peloria* — T: Pécs (!Róna PTTK 1909 124) — Z: Hosszúhetény (!) — SZ: Bába (Hollós 96)

1145. *L. angustissima* (Lois.) Borb. (Keskenylevelű gyujtoványfű)

Baranya (Maj. 34, Maj. K.) — J: (!Simk. 184), Kővágószőlős (1. c.), Mecsekalja (!)

1146. *L. genistifolia* (L) Mill. (Rekettylevelű gyujtoványfű)

J: (!Kit. 1. 8., *b. angustifolia* Schur Horv. Borbásia I 98), Magyarürög (*b. 1. c.*), „Égervölgy” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25, Kit. 1. 7) — Z: Hosszúhetény (1. c. 17) — V: Harsány (!Simk. 184, Kit. 1. 12), Bere-mend, Máriagyűd (1. c. 28, 14, 30) — Ma: Pécs „Üszög” (1. c. 10), Fazekasboda (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár”, „Éleshát”, „Várdomb”, „vám” (Hollós 96)

1147. *Antirrhinum orontium* L. (Vetési oroszlánszáj)

Baranya (Kit. apud N I 185, Nendtv. 17, Maj. 34, Maj. K.)

A. majus L. — *Culta et subspontanea* — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 17, Kit. 1. 6)

1148. *Chaenorhinum minus* (L) Lge. (Tátos fű)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25) — V: Villány, Harsány (Simk. 184) — O: Drávasztára (1. c.)

1149. *Scrophularia vernalis* L. (Tavaszi görvényfű)

J: (NV! apud Horv. PM4 15) — Z: (!Kit. 1. 18), Hosszúhetény (!K.-Nendtv. 572), Püspöknádasd (Simk. 184), Magyaregregy (Kit. apud Jávorka AMNH 1936 40), „Márévár” (Kit. 1. 25), Hármashégy (Kárp.), Vár-alja (!)

1150. *S. Scopolii* Hoppe (Bársonyos görvényfű)

J: Orfű (Boros MBL 1924 51), Vöröshegy (Kárp.) — T: Pécs (Maj. 34, Simk. 184), Mecsekszabolcs (Maj. K. apud Horv. PM2 11) — Z: Hosszúhetény (Horv. PM2 8) — H: Szigetvár „Domolos” (Balek ÖBW 1852 14) — O: Harkány (Zsák)

1151. *S. nodosa* L. (Közönséges görvényfű)

J: (!), Kővágószőlős (Simk. 184) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 31), „Daindol” (Kit. 1. 8), „Kisrét”, Komló (!) — Z: (!Kit. 1. 18) — V: Harsány (Simk. 184) — Ma: Áta, Görcsöny (!) — H: Kisvaszar, Palé (Horv. É. 13), Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Remete” (Hollós 96) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O: Marócsa, Vajszló (!) — D: Dárda (Simk. 184)

1152. **S. alata** Gilib. (Vízi görvényfű)

Baranya (Nendtv. 31) — J: Abaliget (!) — Z: Magyaregregy „Máré-vár” (!) — V: Villány (Simk. 184) — Ma: Feked (Horv. É. 12) — H: Lengyel (Jáv.-Zóly.)

1153. **Gratiola officinalis** L. (Csikorgófű)

J: (!), Kővágószőlős (Simk. 184) — SZ: Belac (Hollós 96) — In planis vulgaris. Sikon közönséges.

1154. **Limosella aquatica** L. (Iszaprojt)

Ma: Villány (Simk. 184) — O: Pécs „környéke” (Maj. 34, Maj. K. NV!), Gordisa (Maj! apud Horv. PM4 15, **b. tenuifolia** (Hoffmann) Fiek. Borbásia II 29), Sellye (Simk. 184) — D: Mohács (Knapp)

1155. **Lindernia pyxidaria** All. (Lindernia)

O: Sellye „Kápolnapsz.” (Simk. 184), Gordisa (Boros 1. c. 51) — D: Jenőfalva (Zsák)

1156. **Veronica scutellata** L. (Mocsári veronika)

Baranya (Nendtv. 33) — Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 185) — O: Drávaszabolcs (Kit. 1. 14), Sellye (!)

1157. **V. anagalloides** Guss. (Póleképű veronika)

J: Mecsekalja (**b. levistipes** Borb. Soó) — Ma: Villány (Simk. 184) — O: Gordisa (Boros 1. c.), Matty (!) — D: Dárda (Kit. 1. 26)

1158. **V. anagallis-aquatica** L. (Póle veronika)

Ad aquas vulgaris. Vizek partján közönséges.

1159. **V. scardica** Griseb. (Kislevelű veronika)

Ma: Palotabozsok „Weiher” (Boros BK 1920 43)

1160. **V. beccabunga** L. (Deréce veronika)

J: Boda (!) — T: Pécs „környéke” (Nendtv. 33, Simk. 185) — Z: Magyaregregy „Hidasi völgy” (!)

1161. **V. chamaedrys** L. (Ösztörüs veronika)

Vulgaris. Közönséges. — **b. pilosa** (Schm.) Keller (BK 1940 153) — T: Pécs „Mecsek” (Simk.! apud Keller 1. c. 154) — H: Vaszar (**b.** Horv. Borbásia II 29)

1162. **V. officinalis** L. (Orvosi veronika)

J: (!Kit. 1. 8), Mecsekalja, Magyarürög „Egervölgy” (!), „Pálirtás” (Jávorka-Kümmérle! apud Keller BK 1940 148) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 33) — Z: (!Kit. 18), Zengővárkony, Magyaregregy „Hidasi völgy” (!) — Ma: Baksa, Geresd, Hercegszabar, Erdősmecske (!) — H: Palé (Horv. É. 13), Högyész, Nagytrecsény (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 96)

1163. **V. montana** Jusl. (Hegyi veronika)

J: (Simk. 185), Orfű „Szuado” (Kárp.) — T: Pécs „Mecsek” (!K.-Nendtv. 568, 573), „Kisrét-Lapis” (!), „Arpádtető”-Zobák (!) — Z: Hosszúhetény (Kárp.! apud Keller 1. c. 158) — ZS: Kishárság „Margita-psz. (Kit. 2. 14), Cserénfa (!)

1164. **V. prostrata** L. (Lecsepült veronika)

Vulgaris. Közönséges.

1165. **V. Jaquinii** Baumg. (Szabdaltlevelű veronika)

Ma: Püspöklak (Kit. apud N I 188) — **b. latisecta** (Borb.) Keller — Z: Hosszúhetény (Horv.! apud Keller 1. c. 138) — **c. pinnatifida** Koch — Baranya (Maj!) — Z: Pécsvárad (Janka! apud Keller 1. c.), Hosszú-

hetény (!) — Ma: Fazekasboda (!) — **d. transitus bihariensis** (Kern.) Keller — Z: Pécsvárad (Janka! apud Keller 1. c. 140)

1166. **V. austriaca** L. (= **dentata** Schm.) (Fogaslevelű veronika)

T: Pécs „Mecsek” (!K.-Nendtv. 568) — V: Harsány (!Simk. 184, lus. *albiflora* Horv.!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 40), „Csatár” (Hollós 97) — **b. praeterita** (Beck) Watzl — T: Pécs (Richter! apud Keller 1. c. 143) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 40) — **c. stenophyllos** Keller (*angustifolia* Kern.) — SZ: Szekszárd (Hollós 97)

1167. **V. teucrium** L. (= **pseudo-chamaedrys** Jacq.) (Gamandor veronika)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 33), „Kantavár” (Kit. 1. 9), „Remeterét”, „Havihegy” (!) — V: Harsány (!Simk. 184) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Bat” (Hollós 97)

1168. **V. maritima** L. (Hosszúlevelű veronika)

O: Pécs „környéke” (NT), Sellye (K.-Nendtv. 572), Matty (Simk. 185) — **b. geniculata** Host — O: Gordisa „Dázsony” (Horv. PM2 7)

1169. **V. spuria** L. **ssp. foliosa** (W. et K.) Härle (Fattyú veronika)

D: Laskó (Simk. 185)

1170. **V. incana** L. (Szürke veronika)

V: Harsány (Kit. Add. 141, **b. canescens** Schrad. Kit.! apud Jávorka AMNH 1936 103)

1171. **V. spicata** L. (Macskafarkú veronika)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — **b. hybrida** (L) Huds. — Baranya (Nendtv. 33) — V: Villány (Simk. 185) — O: Drávasztára (1. c.) — **c. ramosa** Fr. Zimmermann — J: (Horv. Borbásia II 29) — **d. subcanescens** Schur — T: Pécs „Mecsek” (!Simk.!, Nendtv. T.!) — V: Villány (!Simk., f. *harsányensis* Horv. 1. c.)

1172. **V. orchidea** Cr. (Pompás veronika)

T: Pécs „környéke” (Maj. 35, Maj. K., K.-Nendtv. 56), Pécs „Mecsek” (Nendtv. 33), „Makár” (1. c. 14) — V: Villány (Simk.!) — SZ: Szekszárd, „Bat”, „Csatár” (Hollós 96) — O: Drávasztára (Simk.!) —

1173. **V. triphyllus** L. (Ujjaslevelű veronika)

T: Pécs (!Nendtv. 33) — V: Harsány (!Simk. 185) — Ma: Németpal-konya, Téseny (!), Ata (Zsák) — SZ: Szekszárd (Hollós 96) — ZS: Kapos-újlak (Bs.)

1174. **V. verna** L. (Tavaszi veronika)

Baranya (Maj. 35, Maj. K.)

1175. **V. Dillenii** Cr. (Dillenius-veronika)

J: Kővágószőlős (*V. verna* (cf. Simk.! 185) correxit Jávorka in *Dil-lenii* Horv. Borbásia I 94)

1176. **V. acinifolia** L. (Démutkalevelű veronika)

J: „Pöcökhegyoldal” (Simk.! 184)

1177. **V. arvensis** L. (Ugari veronika)

Vulgaris. Közönséges.

1178. **V. praecox** All. (Korai veronika)

J: (Simk. 184) — V: Harsány (1. c.)

1179. **V. serpyllifolia** L. (Kakuk veronika)

J: Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 33) — Z: (Kit. 1. 18) —

V: Villány (Simk. 185) — Ma: Baksa (!) — ZS: Szigetvár-Kishárság
„Szenttamás” (Kit. 2. 14) — O: Sellye (!)

1180. *V. hederifolia* L. (Borostyánlevelű veronika)

Vulgaris. Közönséges.

1181. *V. persica* Poir. (Perzsa veronika)

Vulgaris. Közönséges.

1182. *V. polita* Fr. (Mezei veronika)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 33, Simk. 185) — Z: Püspöknádasd (l. c.)
— V: Harsány (Bs.) — Ma: Nagynyárád (Janka ÖBZ 1867 161) — SZ:
Szekszárd (Bartal 40), „Bat” (Hollós 96)

V. cymbalaria Bodard — Adventiva — Pécs (NV! apud Horv. PM2 4)

V. angustifolia Nendtv. — Pécs „környéke” (NT) = (secundum Simk. 185) *maritima*.

1183. *Digitalis grandiflora* Mill. (= *ambigua* Murr.) (Sárga gyűszűvirág)

J: (Simk. 184, Kit. 1. 18) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 21), „Lapis” (!)
— V: Harsány (!Simk. 184, Kit. 1. 12) — Ma: Hercegszabar, Geresd
(**b. ramosa** Horv. in Borbásia II 29) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd
„Bat”, „Csatár” (Hollós 96) — O: Siklós-Alsószentmárton (Horv. É. 16)

1184. *D. lanata* Ehrh. (Gyapjas gyűszűvirág)

Baranya (Nendtv. 14, 21) — Ma: Nagyárpád (K.-Nendtv. 570, Balek!
apud N I 185, NV!, Simk. 184) — O: Kácsfalu-Pélmonostor (Janka apud
N II 54), Magyarszentiván (Horv. PM4 19)

1185. *D. ferruginea* L. (Rozsdás gyűszűvirág)

Baranya (NT) — V: Villány (!K.-Nendtv. 570), Beremend (Kit. 1. 27) —
Ma: Nagynyárád (Janka ÖBZ 1867 56), Majs-Nagynyárád (Janka apud
N II 54), Borjád-Hercegtöttös (Horv. Borbásia I 99) — D: Mohács (Simk.
184, Nendtvich K.!)

? *D. lutea* L. — M: (NT!, Maj. 34, Maj. K., K.-Nendtv. 567), spon-
tanea?

D. laevigata W. et K. — M: (Nendtv. 21) = (secundum K.-Nendtv. 565)
ferruginea!

1186. *Melampyrum cristatum* L. (certe tantum) **ssp. Ronnigeri** Pöverl.
(Taréjos csormolya)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 26, Horv. PM4 13) — H: Nagymányok
(Hollós 97) — **b. solstitiale** Ronn. — T: Pécs „Tettye” (Horv. Borbásia I 98)

1187. *M. arvense* L. (Mezei csormolya)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 26), „Havihegy” (!), „Daíndol” (Kit. 1. 9)
— Z: Hosszúhetény (!) — Ma: Fazekasboda, Feked (!)

1188. *M. barbatum* W. et K. (Szakállas csormolya)

J: Kővágószőlős (!Kit. 1. 16) — T: Pécs (!Nendtv. 14, 26) — Z: Vár-
alja (Kit. 1. 24) — Ma: Tésény (Zsák) — SZ: Szekszárd, Bataapáti (Hol-
lós 97) — O: Harkány, Alsócún (Zsák) — **b. purpureobracteatum** Schur —
Z: Pécsvárad, Hosszúhetény (Boros! apud Soó Rep. 1926—7 138) — O:
Rónádfa (Richter L. 1. c.), Drávaszabolcs (Boros! 1. c.)

1189. *M. nemorosum* L. (Kéküstökű csormolya)

In regione montana colinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közön-
séges. — O: Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 16) — **b. heterotrichum** Ronn.
— J: Abaliget (Boros apud Soó 1. c. 147) — V: Harsány (Simk.!, Boros!

1. c.) — O: Rónádfa, Lakócsa (Borbás! et Boros! 1. c.) — **c. latissimum** Borb. — J: Abaliget (Bs. apud Horv. Borbásia I. 98) — Ma: Geresd (1. c.) — **d. albidum** Svanlund — T: Pécs „Mecsek” (Horv. Borbásia I 98)

ssp. silesiacum Ronn. **b. diversipilum** Ronn. et Hay. — Z: Püspök-nádasd (Soó 1. c. 149)

1190. **M. pratense** L. (Réti csormolya)

J: (!Kit. 8) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 26) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár”, Szálka (Hollós 97)

ssp. vulgatum Pers. **b. lanceolatum** Spenn.

J: (!) — T: Pécs „Kisrét” (!), Somogy „Csatornavölgy” (tantum ssp. Bs.) — Z: Pécsvárad, Szászvár „Dobogó” (!) — Ma: Erdősmecske (Horv. É. 12) — H: Palé (1. c. 13) — O: Sellye — **c. commutatum** Tausch. f. *murorum* Beauv. — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv.!, Simk.! apud Soó 1. c. 179) — O: Sellye (Boros apud Soó 1. c.)

M. silvaticum L. — Baranya (Maj. 35) erroneo publicata (Horv. PM4 17)

1191. **Euphrasia Rostkoviana** Hayne (Orvosi szemvidító)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 22, Maj. 35, Maj. K.) — V: Villány, Máriagyűd (Simk. 184, herbario eius deest)

1192. **E. ericetorum** Jord. (Közönséges szemvidító)

T: Pécs „Mecsek” (!NV! Kit. 1. 7), „Daindol” (1. c. 9) — Z: Zengővárkony (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Hollós 97) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14)

E. gracilis Fr. — M: (BK 17) erroneo publicata (Horv. PM4 17)

1193. **Orthantha lutea** (L) Kern. (Fogörömfű)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 22, Kit. 1. 7), „Daindol” (1. c. 9), „Tettye” (Horv. PK28 6), „Havihegy” (!) — V: Harsány, Beremend (Kit. 1. 12, 28) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 97)

1194. **Odontites rubra** Gilib. (Fogfű)

Pécs „környéke” (!Nendtv. 22) — Z: Hosszúhetény (Simk. 184)

1195. **Rhinanthus crista-galli** L. (Csörgő kakascímer)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 16), „Mánfa” (Soó) — Z: Hosszúhetény (!) — Sz: Szekszárd „Bat” (Hollós 96) — ZS: Cserénfa (!) — O: Kákics, Pécs-Arpád (!) — **b. stenophyllus** (Schur) Wettst. — J: Abaliget (Boros apud Soó Rep. 1929 208—9), Hetvehely (Horv. Borbásia I 98) — Z: Hosszúhetény, Püspökszentlászló (f. *elator* (Schur) Soó Boros! apud Soó Rep. 1. c.) — Ma: Áta (Horv. Borbásia I 98) — O: Drávaszabolcs (1. c.)

1196. **Rh. major** Ehrh. (Nagy kakascímer)

J: Magyarürög (Soó 1. c. 216) — T: Pécs (!Nendtv. 16, Nendtv.! apud Soó 1. c.) — Z: Hosszúhetény, Püspökszentlászló (Boros! apud Soó 1. c.) — V: Máriagyűd (!)

1197. **Pedicularis palustris** L. (Posvány kakastaréj)

O: Gordisa (Maj.! apud Horv. PM2 7)

1198. **Lathraea squamaria** L. (Vicsorgó)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25), „Bálics” (BKA), „Mélyvölgy” (!), „Istenkút”, Pécsbudafa (!) — Z: (!) — O: Szentegát (!)

Orobanchaceae. Szádorgófélék.

1199. *Orobanche ramosa* L. (Dohányfőjtő szádorgó)
Baranya (Nendtv. 28) — V: Máriagyűd (Simk. 184) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Dorog” (Hollós 97) — O: Gordisa (Boros MBL 1924 52), Pécs „Újhegy” (!)
1200. *O. arenaria* Borkh. (Homoki szádorgó)
Baranya (Maj. 34) — SZ: Szekszárd, „Csatár” (Hollós 97)
1201. *O. purpurea* Jacq. (Bíbor szádorgó)
T: Pécs (Nendtv. 29, NV!, Sz!) — Z: Szászvár (!)
1202. *O. alba* Steph. (Kakukfű szádorgó)
J: „Zsongorkő” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 34, NV!, b. *hololeuca* Borb. Horv. Borbásia I 98), „Tettye” (!) — V: Harsány (Simk. 183) — SZ: Szekszárd „Petre”, „Éleshát” (Hollós 97), „Öcsényi-h.” (Bs.)
1203. *O. reticulata* Wallr. (Recés szádorgó)
T: Pécs „Tettye” (f. *pallidiflora* W. et Gr. Soó), Pécs (Beck in Pflanzenreich IV. 261. 157) — Ma: Nagýárpád (Simk. 183)
1204. *O. minor* Smith. (= *barbata* Poir.) (Lóhere szádorgó)
Baranya (Maj. 34) — V: Harsány (Simk. 183)
1205. *O. picridis* F. Schltz. (Keserű gyökér szádorgó)
V: Harsány (Boros! apud Horv. Borbásia I 94, Beck: Monographie der Gattung Orobanche. 1890. Bibl. Bot. 19. 247, Beck 1. c. 202)
1206. *O. lutea* Baumg. (Sárga szádorgó)
T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 184, BKA), Komló (!) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Harsány (Soó) — SZ: Szekszárd „Óriás-h.” (Bs.)
1207. *O. caryophyllacea* Sm. (Galajfőjtő szádorgó)
T: Pécs (Nendtv. 28, Sz!), Mecsekszentkút (Soó) — V: Harsány (Simk. 183, Bs.) — Ma: Nagýárpád (1. c.), Málom (!)
1208. *O. major* L. (Nagy szádorgó)
Baranya (Nendtv. 29, NT, Maj. 34, Maj. K.) — SZ: Szekszárd „Éleshát”, „Kálvária” (Hollós 97)
- O. crenata* Forsk. — Baranya (Maj. 34) erroneo publicata (Horv. PM4 17)

Lentibulariaceae. Rencefélék.

1209. *Utricularia vulgaris* L. (Közönséges rence)
Ma: Villány (Simk. 183) — O: Gordisa „Ódráva” (Boros MBL 1924 52) — D: Mohács (!Boros MBL 1922 71), Riha-tó (!)
1210. *U. Bremii* Heer. (Bremi-rence)
Ma: Villány (Simk.! Jávorka: Magyar Flóra 1028)
U. minor L. — Ma: Villány (Simk.! 183) ipse correxit in *Bremii*!

Globulariaceae. Gubóvirágfélék.

1211. *Globularia Willkommii* Nym. (Közönséges gubóvirág)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Bat” (Hollós 97)

Plantaginaceae. Útifűfélék.

1212. *Plantago indica* L. (Homoki útifű)
 O: Pécs „környéke” (Maj. 37), Sellye (!Simk. 197, NV!), Máriagyűd (Simk. 197, Kit. 1. 14), Siklós (1. c.)
 1213. *P. argentea* Chaix (Ezüstös útifű)
 T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 197), „Bertalan-szikla” (Horv. PK28 4) — V: Harsány (WK. Ic. II. 165, Kit. 1. apud Jávorka AMNH 1935 57, Bs.)
 1214. *P. lanceolata* L. (Lándzsás útifű)
 Vulgaris. Közönséges. — **b. sphaerostachya** M. et K. — Z: Zobák (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 97) — **c. dubia** (L) Bég. — Pécs (Nendtv. 28)
 1215. *P. altissima* L. (Magas útifű)
 Pécs (Simk. 197) — SZ: Szekszárd (Hollós 97) — D: Dárda (Simk. 197), Mohács (!Knapp)
 1216. *P. media* L. (Közepes útifű)
 In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges.
 1217. *P. major* L. (Nagy útifű)
 Vulgaris. Közönséges. — **b. pauciflora** (Gilib.) f. *uliginosa* Schm. — Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 197)
 ? *P. Gerardi* Schult. (= *carinata* Schrad.) — O: Sellye „Endesi pusztá” (Horv. PM2 4)

Rubiaceae. Buzérfélék.

1218. *Sherardia arvensis* L. (Csillagfű)
 J: Kövágószőlős (Simk. 191) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 37, Sz. 1) — Z: Püspöknádasd (Simk. 191), Pécsvárad (Soó), Váralja (Kit. 1. 24) — V: Harsány, Máriagyűd (!) — Ma: Villánykövesd (Horv. É. 11), Vokány, Kistótfalu (!), Téseny (Zsák) — H: Mecsekjános (K.-Nendtv. 572) — ZS: Kaposvár (Lengyel: A magyar lucernamag. . 55) — O: Pécs „Megyer” (!), Kémes, Alsócún, Szentlőrinc (!)
 1219. *Asperula taurina* L. v. *leucanthera* Beck (incl. *lus. lilacina* Horv.) (Olasz müge)
 J: Magyarürög (Kárp.), „Égervölgy” (Horv. PM4 18), Vöröshegy (Horv. PM4 18) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 18), „Mélyvölgy”, „Lapis” (!K.-Nendtv. 569), „Remeterét” (!Simk. 190), „Kozári vadász-ház” (!) — Z: (Simk. 190), Pécsvárad (!Janka apud N II 47), Magyar-egregy „Hidasi völgy” (Horv. l. c.) — V: Harsány (!Simk. 190), Máriagyűd (!) — Ma: Németpalkonya (Horv. É. 11)
 1220. *A. odorata* L. (Szagos müge)
 In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Páprád „Bükkhát”, „Tilos erdő” (Horv. É. 16, 15), Marócsa, Szentegát, Sámód, Baranyhídvég, Sellye, Siklós (!)
 1221. *A. glauca* (L) Bess. (Szürke müge)
 T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 18, **b. hirsuta** Wallr. Horv. Borbásia I 98), „Kantavár” (Kit. 1. 9), „Frühweiss” (BKA), „Melegmányivölgy” (!) — V: Harsány (!Simk. 190) — Ma: Nagynyárad (Janka apud N II 47) — SZ: Szekszárd „Remete” (**b. Bartal** 40), Mórág, Bátaapáti (Hollós 97)

1222. **A. tinctoria** L. (Festő müge)
Baranya (Maj. 32) — Ma: Geresd (Kit. apud N I 152)
1223. **A. cynanchica** L. (Ebfojtó müge)
In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Drávaszabolcs (!) — D: Dárda (Simk. 190)
1224. **Galium pedemontanum** (Bell.) All. (incl. **b. reflexum** Presl.) (Apró galaj)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 13, 23, Simk. 191) — V: Harsány (l. c.) — Z: Hosszúhetény (!) — SZ: Zsibrik, Palatinca (Hollós 98)
1225. **G. cruciata** (L) Scop. (Keresztes galaj)
Vulgaris. Közönséges.
1226. **G. verum** Scop. (Tavaszi galaj)
J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 23), „Kisrét”, „Lapis”, „Árpádtető” (!) — Z: Hármashegy (Kárp.) — Ma: Nagynyárád (Janka ÖBZ 1867 161), Fazekasboda (!) — H: Szentbalázs (!) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)
1227. **G. aparine** L. (Ragados galaj)
Vulgaris. Közönséges.
ssp. spurium (L) Hartm. **b. Vaillantii** (DC.) Koch
Pécs (Simk. 191) — H: Jágónak (Zsák) — O: Alsócún (Zsák)
1228. **G. uliginosum** L. (Posvány galaj)
Baranya (Maj. 32)
1229. **G. divaricatum** Lam. (Berzedt galaj)
J: (!Simk. 191), Kővágószőlős (l. c.), Magyarürög (Bs.), Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (Simk. 191) — V: Máriagyűd (l. c.) — O: Harkány (l. c.)
1230. **G. palustre** L. (Mocsári galaj)
J: Magyarürög (!) — T: Pécs (Maj. 32, Simk. 191) — Z: Hosszúhetény, Püspöknádasd (l. c.) — V: Villány (l. c.) — Ma: Fazekasboda (!) — O: Nagypárad, Alsószentmárton, Marócsa, Pellérd, Páprád (!), Harkány (!, Simk. 191) — **b. lanceolatum** Uechtr. — O: Harkány (Horv. PM4 13) [Drávasztára (Simk. 191), Harkány (!)]
1231. **G. Schultesii** Vest. (Fénytelen galaj)
J: Boda, Abaliget (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Borbás MOTV 1894 277), „Lapis” (Soó), Komló (!) — Z: Hosszúhetény, Szászvár „Dobogó” (!) — Ma: Erdősmecske (Horv. É. 12), Görcsöny (!) — H: Palé (l. c. 13), Nagytérecsény, Szentbalázs (!) — SZ: Szekszárd „Csatár”, Szálka (Hollós 98) — ZS: Töröcske „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi erdő” (!)
- G. silvaticum** L. — M: (Nendtv. 23) = *Schultesii* (Horv. PM4 17)
1232. **G. verum** L. (Tejoltó galaj)
Vulgaris. Közönséges. — **b. verosimile** R. et Sch. — J: (Horv. Borbásia II 29) — T: Pécs „Mecsek” (l. c. I 98) — Z: (Bs.)
1233. **G. mollugo** L. (Közönséges galaj)
Vulgaris. Közönséges. — **b. pycnotrichum** H. Br. — Pécs (Simk. 191)
ssp. elatum (Thuill.) Lange — J: Abaliget (Horv. Borbásia I 98) — T: Pécs „Mecsek” (l. c.) — Z: Hosszúhetény (!) — Ma: Hercegszabar (!) — H: Kisvaszar (Horv. É. 13), Palé (!) — O: Páprád „Bükkhát” (l. c. 16), Vajszló (f. *brachystrum* Borb. et H. Br. Horv. Borbásia II 30)

1234. *G. erectum* Huds. (Felálló galaj)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 23, *b. transsilvanicum* Schur Borbás: A Balaton flórája 359, *c. eriosomum* 1. c.)

1235. *G. lucidum* All. (Spárgalevelű galaj)

J: Abaliget (!, *b. scabridum* DC.!) — T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 191, *b. Horv.* PM4 13), Mecsekszentkút (!) — Z: (Horv. PM2 8), Szászvár „Dobogó” (!) — V: Harsány (!Simk. 191) — Ma: Erdősmecske (!)

G. pumilum Murr. — M: (Nendtv. 23) erroneo publicata (Horv. PM4 17)

Rubia tinctorum L. — Olim residuum culturae — Pécs (Maj. 32, NV!, K.-Nendtv. 568, 672)

Caprifoliaceae. Bodzafélék.

1236. *Sambucus ebulus* L. (Földi bodza)

Vulgaris. Közönséges.

1237. *S. nigra* L. (Fekete bodza)

Vulgaris. Közönséges.

1238. *S. racemosa* L. (Fürtös bodza)

T: Pécs „Mecsek” (Maj. 32, Maj. K., Borbás! 1. c.)

1239. *Viburnum opulus* L. (Kánya bangita)

T: Pécs (!Nendtv. 34, Kit. 1. 9), „Kismélyvölgy” (Simk. 190), Komló (!), Mánfa (Soó) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Zobák, Magyaregregy „Hidasi völgy” (!) — H: Kisvaszar (Horv. É. 12), Sásd (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Sötétvölgy” (Hollós 98) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15) — O: Páprád (!) — D: „Rét erdő” (Kit. 1. 28), Mohács, Bokerdő (!)

1240. *V. lantana* L. (Ostorménfa)

J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34), „Bálics” (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — Ma: Fazekasboda (1. c. 20), Villánykövesd, Feked (Horv. É. 11, 12), Hercegszabar (!) — H: Kisvaszar (1. c.), Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár”, Bataapáti (Hollós 98), Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 40)

1241. *Lonicera caprifolium* L. (Jerikói lonicer-cserje)

T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 25, 32), „Lapis”, „Árpádtető”, „Tettye”, „Bányatelep” (!) — V: Villány-Máriagyűd (!Simk. 160, 190, Kit. 1. 14), Németspalkonya „Törökcsér” (Horv. PM4 19) — Ma: Pécsudvard (Horv. É. 11), Erdősmecske, Villánykövesd, Kistótfalu, Fazekasboda, Görcsöny, Baksa, Hercegszabar (!), Dunaszekcső (Kit. 1. 21) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 40), „Bükk”, „Bat” (Hollós 58), „Óriás-h.” (Bs.) — O: Siklós (!)

1242. *L. xylostemum* L. (Ükörke)

T: Pécs „Mecsek” (Maj. 25, 32, Maj. K., Simk. 190)

L. periclymenum L. — M: (Nendtv. 25) = *caprifolium* (Simk. 190)

Adoxaceae. Pézsmaboglárfélék.

1243. *Adoxa moschatellina* L. (Pézsmaboglár)

J: (Simk. 181) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 32), „Lapis” (K.-Nendtv. 569), „Rigóder” (Maj. K. apud Horv. PM2 10), „Szt. János-kút” (Maj. apud Horv. PM4 15) — H: Szentbalázs (!) — ZS: Kaposújlak (Boros VSz 1936 83)

Valerianaceae. Macskagyökérfélék.

1244. *Valerianella coronata* (L) DC. (Koronás galambbegy)
V: Harsány (!Janka! apud N II 30)
1245. *V. dentata* Poll. (Fogas galambbegy)
J: Kővágószőlős (Simk. 197) — T: Pécs (!Nendtv. 22) — V: Harsány (Simk. 197) — Ma: Ata, Tésény (Zsák) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 40) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15) — O: Kémes, Alsócún (Zsák)
1246. *V. rimosa* Bast. (Füles galambbegy)
J: Orfű (Simk. 197), Abaliget (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 197) — V: Harsány (!Janka apud N II 30) — Ma: Nagynyárád (1. c.) — H: Palé (!) — SZ: Szekszárd „Kis Bükk” (Hollós MBL 1914 58) — O: Sellye (Boros MBL 1924 52), Kákics (!)
1247. *V. pumila* (Willd.) DC. (= *membranacea* Lois.) (Hártyás galambbegy)
T: Pécs „Mecsek” (Simk. 197, Nendtv. T.I) — V: Harsány (1. c.)
1248. *V. olitoria* (L) Poll. (Saláta galambbegy)
Vulgaris. Közönséges.
1249. *V. carinata* Lois. (Hasábos galambbegy)
T: Pécs (Simk. 197) — V: Harsány (Simk. 197)
- V. eriocarpa* Desv. — Pécs (K.-Nendtv. 565, 567) erroneo publicata!
1250. *Valeriana officinalis* L. (Mezei macskagyökér)
J: Abaliget (Bs.) — T: Pécs (!Nendtv. 33), „Lapis”, „Istenkút”, „Árpádtető” (!) — Ma: Erdősmecske (!) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 98) — O: Drávaszabolcs (!)
1251. *V. dioica* L. (Kétlaki macskagyökér)
J: Magyarürög (!) — T: Pécs (Nendtv. 33, BKA), Mecsekszentkút (Sz!) — Z: Hidas (!) — O: Pécs „Balokány” (Simk. 197), Kovácshida (!)

Dipsacaceae. Mácsonyafélék.

1252. *Dipsacus pilosus* L. (Szőrös mácsonya)
M: (Maj. 37) — Z: (Simk. 195), Püspöknádasd (1. c.) — SZ: Szekszárd, Bata (Hollós 98)
1253. *D. laciniatus* L. (Héjakút mácsonya)
J: Abaliget (Simk. 196, lus. *albiflora* Bs.) — T: Pécs (Nendtv. 21) — Z: Szászvár (!) — H: Kisvaszar (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy”, Bata (Hollós 98) — O: Nagypárad, Szentlőrinc (!), Sellye (Simk. 196)
1254. *D. silvester* Huds. (Erdei mácsonya)
J: Abaliget (Simk. 196) — T: Pécs (Nendtv. 21) — H: Kisvaszar (!) — SZ: Szekszárd, Bata, Szálka (Hollós 98) — O: Páprád (!), Sellye (Boros MBL 1924 52) — D: Mohács (!)
1255. *D. pseudosilvester* Schur (*D. laciniatus* × *D. silvester*)
O: Sellye (Boros 1. c.)
1256. *Cephalaria transsilvanica* (L) Schrad. (Fejvirág)
Vulgaris. Közönséges.
1257. *Succisa pratensis* Mnch. (Ördögharaptafű)
Pécs (Nendtv. 32) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — O: Pécs (!b. hirsuta Rchb.)

1258. *Succisella inflexa* (Kluk) Beck (Csonkaír)

O: Pécs „környéke” (Maj.! 37, Sz!), Sellye (Simk. 196), Gordisa (Boros MBL 1924 52), Gilvánfa (Maj. K. apud Horv. PM2 11)

1259. *Knautia arvensis* (L) Coult. (Mezei varfű)

Vulgaris. Közönséges. — f. *pratensis* (Schm.) Szb. — O: Pécs, Baranya-hídvég „Bükkhát” (Horv. É. 16) — b. *rosea* (Baumg.) Borb. — Ma: Nagynyárad (Janka! apud Szabó Mon. Knautia 249) — c. *budensis* Simk. — T: Pécs „Mecsek” (Borbás Knautia 71) — V: Harsány (Soó), Villánykövesd (!) — Ma: Feked (Horv. É. 12), Hercegszabar (!)

1260. *K. drymeia* Heuff. (Magyar varfű)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Páprád (Horv. É. 15), Marócsa (!)

1261. *K. Szabói* Lengy. (*K. drymeia* × *K. arvensis* f. *pratensis*)

T: Pécs „Mecsek” (Lengyel MBL 1926 402)

K. dipsacifolia (Host) Gren. et Godr. — M: (Nendtv. 31) = *drymeia*!

1262. *Scabiosa ochroleuca* L. (Vajszinű ördögyszem)

Vulgaris. Közönséges.

1263. *S. columbaria* L. (Galambszinű ördögyszem)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 18, Maj.! 37, Maj. K., BK 24)

Cucurbitaceae. Tököfélék.

1264. *Bryonia alba* L. (Gönye)

J: Kövágószőlős (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19), „Havihegy” (!) — V: Villány (!Simk. 175) — Ma: Feked (Horv. É. 12) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Bakta” (Hollós 101)

Elaterium cordifolium Mnch. (*Ecballium elaterium* (L.) Rich.) — Culta et forte olim subspontanea — Pécs „környéke” (Maj.! 30)

Campanulaceae. Harangvirágfélék.

1265. *Campanula glomerata* L. (Csomós harangvirág)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19), „Daíndol” (Kit. 1. 8) — Z: Pécs-várad (!) — V: Beremend (Kit. 1. 28) — H: Nagymányok (Hollós 100) — SZ: Szekszárd, Szálka, Alsónána (Hollós 100) — b. *farinosa* Roch. — J: (Horv. Borbásia II 30) — T: Pécs „Mecsek” (1. c., f. *rotundata* Beck, f. *glaucophylla* Schloss. et Vuk.) — Z: Zobák (1. c.) — O: Sámod (1. c.) — c. *aggregata* (Willd.) Koch — V: Harsány (1. c.)

1266. *C. cervicaria* L. (Villás harangvirág)

Baranya (Kit. apud N I 147) — J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19) — H: Kisvaszar (Horv. É. 13) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 100) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14) — O: Siklós (!Kit. 1. 14), Páprád „Borostyán-psz.” (Horv. É. 15), Sellye (!)

1267. *C. sibirica* L. (Pongyola harangvirág)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19, lus. *albiflora* Horv.!) — Z: Váralja (Kit. 1. 24) — V: Harsány (!Simk. 191), Máriagyűd (!) — Ma: Villánykövesd, Feked (Horv. É. 11, 12), Kistótfalu, Hercegszabar (!) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Bartal 40), „Petre”, „Éleshát” (Hollós 100), „Öcsényi-h.” (Bs.) — D: Mohács (Simk. 191)

1268. *C. rapunculoides* L. (Kánya harangvirág)

J: (!Simk. 191), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19) — Z: Hosszúhetény (!) — Ma: Erdősmecske (Horv. É. 12) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 100)

1269. *C. trachelium* L. (Csalánlevelű harangvirág)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — H: Nagytetcsény (lus. *albiflora* Horv.!) — O: Siklós (!)

1270. *C. bononiensis* L. (Olasz harangvirág)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19, Kit. 1. 6) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — V: Harsány (!Simk. 191) — H: Kisvaszar (Horv. É. 13) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár”, Belac (Hollós 100—1)

1271. *C. rotundifolia* L. (Kereklevelű harangvirág)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19), „Tettye” (K.-Nendtv. 569), „Havi-hegy” (!Simk. 191)

1272. *C. persicifolia* L. (Baracklevelű harangvirág)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — *b. dasycarpa* Kit. — V: Harsány (Soó) — SZ: Szekszárd (Hollós 100) — *c. hispida* Lej. — Ma: Feked (Horv. É. 12) — *d. lus. pleniflora* — Z: (!)

1273. *C. rapunculus* L. (Répagyökerű harangvirág)

Baranya (Maj. 35, Maj. K) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — V: Máriagyűd (Simk. 191)

1274. *C. patula* L. (Terebélyes harangvirág)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19), „Mélyvölgy” (!) — Z: (!), Hosszúhetény (!) — Ma: Hercegszabar (!) — H: Lengyel (Hollós 100), Kisvaszar (Horv. É. 13), Högyész (!) — SZ: Szekszárd, „Bat”, „Csatár”, Szálka (l. c. 100) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14), Cserénfa (!) — *b. flaccida* Wallr. — J: Orfű (Simk. 191) — V: Villány (l. c.) — H: Palé (Horv. É. 13)

? *C. macrostachya* Kit. — Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 191, herbario ejus deest)

? *C. lingulata* W. et K. — ZS: Kaposvár (Portenschlag apud N I 147)

1275. *Legousia speculum-Veneris* (L) Fisch. (Tükkörvirág)

J: Mecsekalja (!) — T: Pécs (Nendtv. 19) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Villány (NV! apud Horv. PM4 15, Soó) — Ma: Nagypárad (K.-Nendtv. 569), Némethölly (!) — SZ: Mórág (Hollós 101) — O: Magyarszentiván, Sellye, Pécs (!)

1276. *Asyneuma canescens* (W. et K.) Griseb. et Sch. (Harangcsillag)

T: Pécs „Mecsek” (? Soó) — V: Harsány (WK. Ic. I. 13)

? *Phyteuma spicatum* L. — M: (Maj. 35, herbario ejus deest) ? (Horv. PM4 17)

? *Ph. orbiculare* L. — Pécs (Maj. 1 apud Horv. PM2 4)

1277. *Jasione montana* L. (Csékcillag)

M: (!Nendtv. 24, Kit. 1. 16) — J: (!Simk. 191), Abaliget (Kit. 1. 16), Magyarürög (!Bs.), Mecsekalja (!), „Makár” (BK 17, A)

Compositae. Fészkesek.

1278. *Eupatorium cannabinum* L. (Sédkender)
In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Páprád „Bükkhát” (!) — D: Dráva „torkolat” (Marsigli 62)
1279. *Solidago serotina* Ait. (Kései istápfű)
Z: Hidas-Bonyhád (Boros! apud Soó Bot. Archiv. 1927 358) — Ma: Baksa (!) — ZS: Kaposmérő (Jávorka apud Boros MBL 1924 53) — O: Gordisa (!), Drávaszabolcs (!Boros 1. c.), Sósvertike (!), Páprád (Horv. É. 15)
S. canadensis L. — Subspontanea — T: Pécs „Kismélyvölgy” (Simk. 196)
1280. *S. virga-aurea* L. (Aranyvessző)
J: Kővágószőlős (Simk. 196), Magyarürög „Égervölgy” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 31) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 98)
1281. *Bellis perennis* L. (Százszorszép)
In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Endrőc, Okorág (!) — f. *colorata* Peterm. — T: Pécs „Istenkút” (Horv. Borbásia II 30)
1282. *Aster linosyris* (L) Bernh. (Aranyfürt)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 20), „Daindol” (Kit. 1. 9), „Havihegy” (!) — V: Harsány (!Kit. 1. 12), Beremend (l. c. 28) — Ma: Geresd (l. c. 20) — Sz: Szekszárd „Petre”, „Csatár” (Hollós 98)
1283. *A. punctatus* W. et K. (Réti őszirózsa)
O: Siklós „Alt-psz.” (Koch! apud Soó BK 1924—5 62), Pécs-Nagyárpád (cum *b. canescens* Simk. Horv. Borbásia I 99) — D: Nagynyárád-Sátorhely (Janka apud N II 31, Janka! apud Soó 1. c.)
1284. *A. amellus* L. (Csillag őszirózsa)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 18), „Havihegy” (!Horv. PM2 10) — V: Harsány (!), Máriagyűd (Bs.!) — Ma: Nagypall (Kit. 1. 20), Apátvarasd (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 98)
1285. *A. pannonicus* Jacq. (*tripolium* auct.) (Magyarföldi őszirózsa)
O: Pécs (Nendtv. 18, Maj! apud Horv. PM2 6) Olim. Egykor.
1286. *A. salignus* Willd. (Bugás őszirózsa)
Subspontanea. Elvadultan. — Pécs (!Maj.!)
A. versicolor Willd. — Subspontanea — Pécs (Horv. Borbásia I 95)
A. lanceolatus Willd. — Subspontanea — T: Pécs „Mecsek” (!) — D: Kisdárda, Jenőfalva (Zsák! apud Soó 1. c. 60)
- A. dumosus* L. — Subspontanea — Pécs (Horv. Borbásia II 26)
1287. *Stenactis ramosa* (Walter) B. S. P. (Ligeti seprence)
Vulgaris. Közönséges.
1288. *S. annua* (L) Nees. (Egynyári seprence)
O: Páprád, Czinderybogád (!)
1289. *Erigeron canadensis* L. (Betyárkóró)
Vulgaris. Közönséges.
1290. *E. acer* L. (Küllőrojt)
J: Abaliget (Simk. 193) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 22, Simk. 193, *b. serotinus* (Weihe) Wirtgen Maj! apud Horv. Borbásia II 30, Sz!) — Z: Püspöknádasd (Simk. 193) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 98)

1291. *Micropus erectus* L. (Topagyom)
Pécs (K.-Nendtv. 567, Maj. K.)
1292. *Filago germanica* L. (Német penészvirág)
J: (!, et *b. virescens* W. et Gr. Simk. 193), Mecsekalja (!), Magyar-
ürög (*b. Bs.*) — T: Pécs (!Nendtv. 23, Kit. 1. 6) — V: Harsány (Simk. 193),
Villány (1. c., Zsák) — Ma: Feked (!) — H: Nagytrecsény (!) — O:
Matty (*b. Simk. 193*), Harkány (Zsák), Sellye, Páprád, Baranyahidvég (!)
1293. *F. arvensis* L. (Mezei penészvirág)
J: Boda, Vöröshegy (!) — T: Pécs (Nendtv. 23), „Makár” (BKA) —
H: Lengyel (Hollós 99) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Éleshát” (1. c.)
1294. *F. minima* (Sm.) Pers. (= *montana* L.) (Hegyi penészvirág)
M: (Nendtv. 23) — J: (!, Kit. 1. 8), Magyarürög (Maj. K. apud Horv.
PM2 11) — O: Harkány-Matty (Simk. 193)
1295. *Antennaria dioica* (L.) Gärtn. (Macskatalp)
M: (Nendtv. 23, Maj.) — J: Magyarürög (NV!), „Égervölgy” (!)
1296. *Gnaphalium uliginosum* L. v. *pilulare* (Wahlbg.) Koch (Iszap-
gyopár)
T: Pécs (Maj. 35, Maj. K., Simk. 194) — V: Villány, Máriagyűd
(1. c.) — H: Mecsekjányosi (K.-Nendtv. 570), Nagytrecsény (!) — SZ:
Báta (Hollós 99) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14) —
O: Páprád „Borostyán-psz.” (!), Harkány (Zsák), Sósvertike (!)
1297. *G. luteo-album* L. (Halvány gyopár)
T: Pécs (Simk. 193) — V: Villány (!1. c.) — D: Laskó (1. c.)
1298. *G. silvaticum* L. (Erdei gyopár)
M: (NT, Maj. 35) — J: (!), Abaliget (Bs.) — Ma: Vokány „Terentás”
(Simk. 193)
1299. *Helichrysum arenarium* (L.) DC. (Szalmagyopár)
M: (Nendtv. 23, Maj. K.) — T: Pécs „Makár” (Maj. apud Horv.
PM4 16)
1300. *Inula helenium* L. (Örvénygyökér)
T: Pécs (Nendtv. 24), „Kismélyvölgy” (Simk. 194) — Ma: Szilvás
(Maj. apud Horv. PM4 16) — H: Mágocs (Bs.), Kisvaszar (!), Bonyhád-
varasd (Kit. 2. 14)
1301. *I. conyza* DC. (Erdei peremizs)
T: Pécs „Mecsek” (!PM. It. 142), „Lámpás”, „Kantavár” (!Kit. 1. 7, 9),
„Szkokó” (!) — Z: Hosszúhetény (1. c. 17) — V: Harsány (Simk. 194) —
SZ: Szekszárd „Csatár”, Alsónána, Szálka (Hollós 98)
1302. *I. ensifolia* L. (Kardos peremizs)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 24), „Daíndol” (Kit. 1. 8.), „Havihegy” (!)
— Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Pécsvárad (!) — V: Harsány (!Simk. 194),
Beremend (Kit. 1. 28) — Ma: Geresd (1. c. 20) — SZ: Szekszárd „Csatár”
(Hollós 98) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15)
1303. *I. salicina* L. (Fűzlevelű peremizs)
M: (Nendtv. 24, Maj. 35) — T: Pécs „Daíndol” (Kit. 1. 8) — Z: Pécs-
várad, Hosszúhetény (!) — V: Villány (!Simk. 194) — SZ: Szekszárd
„Csatár”, „Bat” (Hollós 98) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O:
Siklós (Kit. 1. 14) — D: Dárda (Simk. 194)

1304. *I. spiraeifolia* L. (Baranyai peremizs)
T: Pécs „Mecsek” (!PM. It. 142, *b. pseudolitoralis* Borb. Borbás!,
c. simplex Rohl Horv. Borbásia II 30), „Makár” (Simk. 194), „Tettye”,
„Frühweiss”, „Bányatelep” (Horv. PM2 8) — V: Harsány (!Kit. 1. 12),
„Dobogó” (Simk. 194)
1305. *I. hirta* L. (Borzas peremizs)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 24), „Lapis” (!) — SZ: Szekszárd „Bat”
(Hollós 98)
1306. *I. germanica* L. (Aranyka)
M: (Nendtv. 24) — J: Mecsekalja (!) — T: Pécs „Makár” (K.-Nendtv.
570, 571, Simk. 194) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 98)
1307. *I. britannica* L. (Réti peremizs)
Vulgaris. Közönséges.
1308. *I. oculus-Christi* L. (Selymes peremizs)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 24, Maj. 35)
1309. *I. hybrida* Baumgt. (*I. ensifolia* × *I. germanica*)
T: Pécs „Mecsek” (Balek ÖBW 1852 14), „Makár”, „Havihegy”
(Maj. K. apud Horv. PM2 11)
1310. *I. Vrabélyiana* Kern. (*I. salicina* *b. aspera* (Poir.) Hay. × *ensifolia*)
V: Harsány „Dobogó” (Simk. 194)
1311. *I. litoralis* Borb. (*I. ensifolia* × *I. spiraeifolia*)
V: Harsány (Zsák)
1312. *I. adriatica* Borb. (*I. hirta* × *I. spiraeifolia*)
T: Pécs „Mecsek” (Horv. Borbásia I 98), „Tettye” (Soó)
1313. *I. microcephala* Borb. (*I. salicina* × *I. spiraeifolia*)
T: Pécs „Mecsek” (Horv. 1. c., Soó)
1314. *Pulicaria vulgaris* Gärt. (Parlagi bolhafű)
Vulgaris. Közönséges.
1315. *P. dysenterica* (L) Bernh. (Réti bolhafű)
Baranya (Nendtv. 24) — J: Magyarürög „Égervölgy” (!) — T: Pécs
„Kismélyvölgy” (Simk. 194), „Lámpás” (Kit. 1. 7) — SZ: Bonyhád,
Belac, Szálka (Hollós 98) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit.
2. 14) — O: Nagypeterd, Máriagyűd „Büdös-tó” (Kit. 1. 4, 14), Kákics,
Sellye, Siklós, Drávaszabolcs (!)
1316. *Carpesium cernuum* L. (Bókoló türempik)
Baranya (Kit. apud N I 114, Nendtv. 19, Maj. 36) — Z: (Simk. 192),
Hosszúhetény (l. c.) — Ma: Vokány (Kit. 1. 10) — SZ: Szekszárd „Sötét-
völgy” (Hollós 99) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — O: Sellye (Boros
MBL 1924 53) — D: „Réterdő” (Kit. 1. 29)
1317. *C. Wulfenianum* Schreb. (Fürtös türempik)
Baranya (Kit. apud N I 114, Nendtv. 19) — O: Kemse, Drávasztára
(Simk. 192), Gordisa (l. c., Maj.!), Harkányfürdő (Boros l. c.) — D:
„Réterdő” (Kit. 1. 29)
- Buphthalmum salicifolium* L. — M: (BK 12) = (secundum BKA) *Doro-
nicum hungaricum* (Horv. PM2 9)
1318. *Ambrosia artemisiifolia* L. (Ambrózia)
H: Palé (!) — O: Gordisa „Dázsony” (Horv. Borbásia I 95), Endrőc,
Páprád (!)

1319. *Xanthium spinosum* L. (Szúrós szerbtövis)
Vulgaris. Közönséges.
1320. *X. strumarium* L. (Bojtorjános szerbtövis)
Vulgaris. Közönséges.
1321. *Bidens tripartita* L. (Subás farkasfog)
In humidis vulgaris. Vizes helyeken közönséges.
1322. *B. cernua* L. (Bókoló farkasfog)
Baranya (Nendtv. 18) — Ma: Erdősmecske (Kit. 1. 21) — O: Sellye (Simk. 192)
1323. *Galinsoga parviflora* Cav. (Gombvirág)
Pécs (!Maj. 25, 35, BK 25, A) — Z: Hosszúhetény (!)
1324. *Anthemis cotula* L. (Büdös pipitér)
Baranya (Nendtv. 17) — Z: Pécsvárad (!) — V: Beremend (Kit. 1. 13)
— Ma: Nagyrápád (Simk. 192), Somberek (Zsák) — SZ: Bonyhád (Kit. 2. 14), Szekszárd, Bataapáti, Zsibrik (Hollós 99) — O: Szigetvár (Kit. 1. 4) — D: Mohács (Knapp)
1325. *A. austriaca* Jacq. (Szöszös pipitér)
T: Pécs (Nendtv. 17), „Makár” (Simk. 192) — Z: Hosszúhetény (!) —
Ma: Feked (Horv. É. 12) — SZ: Szekszárd (Bartal 40), „Öcsényi-h.” (Bs.),
Bataapáti (Hollós 99)
1326. *A. tinctoria* L. (Festő pipitér)
J: (!Kit. 1. 8, Simk. 192), Mecsekalja (!) — T: Pécs (!Nendtv. 17,
Kit. 1. 7, *b. tomentosa* Beckhaus. Horv. Borbásia II 30), „Daindol”
(Kit. 1. 8) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — SZ: Szekszárd, „Csatár”,
„Bakta” (Hollós 99)
1327. *A. arvensis* L. (Mezei pipitér)
T: Pécs (!Nendtv. 17) — H: Majos (Kit. 2. 14)
1328. *A. ruthenica* M. B. (Homoki pipitér)
T: Pécs (Simk. 192) — SZ: Szekszárd (Hollós 99)
1329. *Achillea ptarmica* L. (Kenyérbél cickafark)
Baranya (Maj. 36)
1330. *A. nobilis* L. v. *ochroleuca* Boiss. (= v. *Neilreichii* (Kern.)
Beck) (Nemes cickafark)
Baranya (Nendtv. 16, Maj. 36) — Z: Pécsvárad-Püspöknádasd (K.-
Nendtv. 566, 569) — D: Dráva „torkolat” (Marsigli 53)
1331. *A. setacea* W. et K. (Sertelevelű cickafark)
T: Pécs (Nendtv. 16), Mecsekszentkút (K.-Nendtv. 569)
1332. *A. asplenifolia* Vent. (Piros cickafark)
T: Orfű (!), Pécs „Istenkút” (!) — Ma: Palotabozsok (Boros apud
Horv. Borbásia I 95), Erdősmecske, Olasz (!) — H: Högyész, Palé (!) —
ZS: Kaposszerdahely „Rapol” (!) — O: Sósvertike (!)
1333. *A. millefolium* L. (Közönséges cickafark)
Vulgaris. Közönséges.
ssp. collina (Becker) Weiss — Vulgaris. Közönséges.
ssp. pannonica (Scheele) Hay. — T: Pécs (!Nendtv. 16)
A. crithmifolia W. et W. — Pécs „környéke” (Nendtv. 16) = *nobilis*
(K.-Nendtv. 565)
A. tanacetifolia All., *ssp. stricta* (Schleich.) Hay. (Nendtv. 16), *distans*

W. et K. — Pécs „környéke“ (K.-Nendtv. 566) erroneo publicata (Horv. PM4 17)

1334. **Matricaria matricarioides** (Less.) Porter (Sugártalan székfű)

Adventiva — O: Kákics (Horv. PM4 13)

1335. **M. chamomilla** L. (Orvosi székfű, kamilla)

Vulgaris. Közönséges.

1336. **M. inodora** L. (Ebszékfű)

Vulgaris. Közönséges. — **b. monocephala** Junge — T: Pécs „Lapis“ (Horv. Borbásia II 30)

1337. **M. tenuifolia** (Kit.) Simk. (Bánsági székfű)

T: Pécs „Lapis“ (Horv. PM4 13)

1338. **Chrysanthemum vulgare** (L) Bernh. (Varádics)

Vulgaris. Közönséges.

1339. **Ch. segetum** L. (Vetési aranyvirág)

Baranya (Maj. 36) Olim. Egykor.

1340. **Ch. corymbosum** L. (Sátoros aranyvirág)

T: Pécs „Mecsek“ (!Nendtv. 29, Kit. 1. 7), „Lapis“ (!) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17), Pécsvárad (!) — V: Harsány, Beremend (Kit. 1. 12, 28) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy“ (Bartal 40), „Bat“, „Csatár“, „Remete“ (Hollós 99) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás“ (Kit. 2, 14)

1341. **Ch. parthenium** (L) Pers. (Őszi aranyvirág)

Subspontanea. Elvadultan. — J: Magyarűrög (Horv. PM2 8) — T: Pécs „Mecsek“ (!Nendtv. 29), „Bányatelep“ (Horv. PM4 18)

1342. **Ch. serotinum** L. (= **uliginosum** (W. et K.) Pers.) (Tiszaparti aranyvirág)

O: Pécs „környéke“ (NT), Sellye (K.-Nendtv. 572, NV!) — D: Dárda-Bellye, Eszék (Kit. Add. 79), Kisdárda (Knapp)

1343. **Ch. leucanthemum** L. (Margaréta)

Vulgaris. Közönséges.

1344. **Artemisia salina** Willd. (Sziki üröm)

O: Pécs „környéke“ (Maj.!) Olim. Egykor.

1345. **A. absinthium** L. (Fehér üröm)

Vulgaris. Közönséges.

1346. **A. vulgaris** L. (Fekete üröm)

Vulgaris. Közönséges.

1347. **A. campestris** L. (Mezei üröm)

T: Pécs „Mecsek“ (Nendtv. 18, Maj. 36) — V: Harsány (Kit. 1. 12), Máriagyűd (Bs.) — Z: Szászvár (**b. lednicensis** Roch.) — Ma: Geresd (**b.** Kit. 1 apud Jáv. AMNH 1926 492, 494) — SZ: Bába (Hollós 99)

1348. **A. austriaca** Jacq. (Selymes üröm)

M: (Maj. 36)

1349. **A. pontica** L. (Bárány üröm)

V: Harsány (Kit. 1. 12 et apud Horv. Borbásia I 95) — SZ: Szekszárd „Petre“, „Bat“, „Csatár“, Bába (Hollós 99)

1350. **A. Lobelii** All. v. **saxatilis** (W. et K.) Borb. (Sziklai üröm)

T: Pécs „Mecsek“ (!PM. It. 142), „Tettye“, „Szkokó“, „Havihegy“, „Báránytető“ (!) — V: Harsány (!RK 563, Kit. 1 apud Jávorka AMNH 1926 494), Máriagyűd (Bs.)

1351. **A. scoparia** W. et K. (Seprő üröm)
J: Abaliget (Simk. 192) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 18), „Havi-hegy” (!) — Z: Hosszúhetény, Váralja, Pécsvárad (Kit. 1. 16, 19, 24) — V: Harsány (!), Máriagyűd (Kit. 1. 14, 30) — Ma: Újpetre (RK 563), Nagypall, Pécs „Üszög” (Kit. 1. 20, 9) — H: Szalatnak (1. c. 22) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15) — O: Sellye (Simk. 192), Gordisa (Horv. PM2 10), Becefa (Kit. 1. 4)
1352. **A. annua** L. (Egyéves üröm)
Subspontanea. Elvadultan. — Pécs (Boros apud Horv. Borbásia I 95)
1353. **Tussilago farfara** L. (Martilapu)
In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Páprád „Bükkhát” (!) — D: (Csapó J. o. c. 164), Mohács (!)
1354. **Petasites hybridus** (L) G. M. Sch. (Közönséges acsalapu)
J: Magyarürög (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 33), „Kisrét”, „Gyárváros”, Pécsbudafa (!) — Z: Váralja, Püspöknádasd, Zobák, Magyaregregy „Márévár”, Hosszúhetény (!Simk. 195) — H: Szentkatalin, Kisvaszar (**b. cinereo-tomentosus** Ortm. Horv. É. 12) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Hollós 98) — ZS: Cserénfa (!) — D: Kisdárda (Knapp), Mohácsziget (Jávorka: A magyar flóra kis határozója 2. k. 311)
1355. **Erechtites hieracifolia** (L) Raf. (Keresztlapu)
H: Nagytrecsény (!) — SZ: Szekszárd „Remetekápolna” (Bartal 40)
1356. **Doronicum hungaricum** (Sadl.) Rchb. f. (Magyar zergevirág)
J: (!), Mecsekalja (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 21), „Lapis”, „Kisrét” (!BK 8, A), „Büdöskút” (Bs.) — V: Máriagyűd (Horv. PM4 14), Harsány (Jávorka: Magyar Flóra 1135, Kárp.)
1357. **D. caucasicum** M. B. (Kaukázusi zergevirág)
J: Orfű „Szuado” (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 21), „Kisrét” (!1. c. 30), „Bányatelep” (Horv. PM2 8) — V: Harsány (!Boros BK 1923 70), „Feketehegy” (Kárp.) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 99), „Gurovica”, Szálka (Hollós MBL 1914 58)
1358. **D. Sopianae** Gay. et Szita (**D. caucasicum** × **D. hungaricum**)
T: Pécs „Mecsek” (!Gayer MBL 1932 44—5, Nendtvich apud Janka ÖBZ 1867 232), „Lapis” (Gayer 1. c.)
1359. **Senecio vulgaris** L. (Közönséges aggófű)
Vulgaris. Közönséges.
1360. **S. silvaticus** L. (Erdei aggófű)
J: (Simk. 195, NV!) — T: Pécs „Mecsek” (1. c., NT, Maj. 36) — Z: Püspöknádasd (Simk. 195) — SZ: Szekszárd „Csatár”, Szálka (Hollós 99)
1361. **S. viscosus** L. (Enyves aggófű)
J: (K.-Nendtv. 568, 572, Simk. 195) — T: Pécs „Mecsek” (Simk. 195) — Z: Püspöknádasd (1. c.)
1362. **S. erucifolius** L. **b. tenuifolius** (Jacq.) A. et G. (Keskenylevelű aggófű)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 31), „Daindol” (Kit. 1. 9) — V: Bere-mend, Siklós (1. c. 28, 30) — Ma: Pécs „Üszög” (1. c. 10) — SZ: Szekszárd (Hollós 99) — ZS: Gálosfa (Kit. 2. 15) — O: Sellye (Simk. 195), Matty (!) — D: Földvári-tó (Boros MBL 1922 71)

1363. *S. jacobea* L. (Szent jakabnap i aggófű)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges.

1364. *S. erraticus* Bertol. (incl. *ssp. barbareifolius* Krockner) (Víz i aggófű)

J: (Bs.) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 31), „Kisrét” (!) — Z: (Simk. 195), Püspöknádasd (1. c.), Szászvár „Dobogó” (!) — Ma: Nagyárpád (!NV! apud Horv. PM4 16), Borjád (!) — SZ: Szekszárd, Bonyhád (Hollós 99) — O: Pécs „Balokány”, Kákics, Sellye (!)

1365. *S. nemorensis* L. (Berki aggófű)

J: Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (Kit. 1. 7, *b. ovatus* Willd. Nendtv. 31) — Z: Püspöknádasd „Újbánya” (Simk. 195)

S. Fuchsii Gmel. — M: (Maj. 36) erroneo publicata!

1366. *S. doria* L. *ssp. Biebersteinii* Lindem. (Kövér aggófű)

Baranya (Maj. 36) — Ma: Nagynyárad (Janka apud N II 36) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Hollós 99) — O: Siklós (Kit. apud N I 119), Tapolca (Kit. 1. 14)

1367. *S. paludosus* L. (Mocsári aggófű)

SZ: Szekszárd „Bat”, Bába (Hollós 99) — O: Matty (Simk. 195), Sellye (K.-Nendtv. 568, 572), Pécs „Megyer” (Horv. PM4 16), Gordisa (Boros MBL 1924 54), Drávaszabolcs (!) — D: Harsány (PM. It. 16), Dráva „tor-kolat” (Marsigli 58)

S. abrotanoides L. — Pécs (Maj. 36) erroneo publicata (K.-Nendtv. 564)

1368. *Calendula officinalis* L. (Körömvirág)

Subspontanea. Elvadultan. — M: (Nendtv. 19) — V: Harsány (Soó) — Ma: Nagyárpád (K.-Nendtv. 569) — SZ: Szekszárd, „Bakta”, „Remete” (Hollós 99)

1369. *Echinops multiflorus* Lam. (Szamárkenyér)

J: Magyarürög (!Kit. 1. 8, NV!), „Mecsekalja”, Magyarürög (!NV!) — T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 21), „Tettye” (Simk. 193), „Lámpás” (Kit. 1. 8) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Bat” (Hollós 99) — O: Pécs „Balokány” (!)

1370. *Xeranthemum annuum* L. (Ékes vasvirág)

J: Magyarürög, Kövágószőlős (Kit. 1. 5, 10) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 34) — Z: Hosszúhetény (!) — V: Harsány (!Simk. 195) — Ma: Geresd (Kit. 1. 21)

1371. *X. foetidum* Mnch. (Hengeres vasvirág)

Baranya (Nendtv. 34) — V: Villány (Janka apud N II 36)

1372. *Carlina vulgaris* L. (Közönséges bábakalács)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19) — Ma: Püspöklak (Kit. 1. 21) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14)

ssp. intermedia (Schur) Hay. — J: (Horv. Borbásia I 95) — V: Harsány (1. c.) — H: Nagytrecsény (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, Alsónána, Szálka (Hollós 99)

1373. *Arctium tomentosum* Mill. (Pókhálós bojtorján)

T: Pécs (!Nendtv. 17) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Csatár”, „Bat” (Hollós 100) — D: Sellye (!)

1374. *A. lappa* L. (Közönséges bojtorján)

Vulgaris. Közönséges.

1375. **A. minus** (Hill) Bernh. (Kis bojtorján)
Vulgaris. Közönséges.
1376. **A. subracemosum** (Simk.) Nym. (**A. lappa** × **A. minus**)
D: Püspökpuszta (Boros MBL 1922 71)
1377. **A. mixtum** Nym. (**A. minus** × **A. tomentosum**)
T: Pécs „Mecsek” (Simk.! apud Máthé in Tisia 1937 240)
1378. **Jurinea mollis** (L) Rchb. (Hangyabogáncs)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 13, 31), „Bárányút”, „Tettye” (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Éleshát” (Hollós 100)
1379. **Carduus nutans** L. (Bókoló bogáncs)
Baranya (Nendtv. 19) — H: Högyész (!) — SZ: Szekszárd, „Petre” (Hollós 100)
1380. **C. hamulosus** Ehrh. (Horgas bogáncs)
Baranya (Nendtv. 19, Maj. 36, Maj. K., herbariis deest!)
1381. **C. collinus** W. et K. (Magyarföldi bogáncs)
Olim introducta. Egykor behurcolták. — Pécs „környéke” (NT, K.-Nendtv. 566, Maj. 36, Maj. K.)
1382. **C. acanthoides** L. (Ütszéli bogáncs)
Vulgaris. Közönséges.
1383. **C. crispus** L. (Fodros bogáncs)
Baranya (Nendtv. 19, Maj. 19, herbario ejus deest, Maj. K.)
1384. **Cirsium vulgare** (Savi) Airy-Shaw (= **lanceolatum** (L) Scop.)
(Lándzsás aszat)
Vulgaris. Közönséges.
1385. **C. Boujartii** (Pill. et Mitterp.) Schltz. Bip. (Pécsvidéki aszat)
T: Pécs „Tettye” (Simk.!) — O: Pécs (PM. It. 143)
1386. **C. eriophorum** (L) Scop. (Gyapjas aszat)
T: Pécs (1. c. 142, Simk. 192) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 16) — O: Szentlőrinc (1. c. 5)
1387. **C. arvense** (L) Scop. (Vetési aszat)
Vulgaris. Közönséges. — **b. horridum** W. et Gr. — J: (Simk. 192) — **c. vestitum** W. et Gr. — Pécs (Horv. Borbásia I 98)
1388. **C. brachycephalum** Jur. (*Chailletii* Jur.) (Kisfészkü aszat)
O: Máriagyűd „Büdös-tó” (Boros BK 1937 38), Pécs „környéke” (!Maj. 36), „Megyer” (Maj.! apud Horv. PM4 16), Nagypárad (!) — D: Laskó (Simk. 192)
1389. **C. palustre** (L) Scop. (Mocsári aszat)
Pécs „környéke” (Maj.! 36, K.-Nendtv. 567)
1390. **C. canum** M. B. (Szürke aszat)
Vulgaris. Közönséges.
1391. **C. pannonicum** (L. f.) Lk. (Pannoniai aszat)
T: Pécs (Nendtv. 20, Maj. 36, Maj. K. Simk. 192) — V: Villány (1. c.)
1392. **C. oleraceum** (L) Scop. (Halvány aszat)
H: Szentbalázs-Szigetvár (!) — ZS: Kaposmérő (Jáv. apud Boros MBL 1924 54), Kaposszerdahely „Rapol”, Kaposvár-Szigetvár (!), Szentlászló (Kit. 2. 14)
- C. rivulare** (Jacq.) All. — Ad limites territorii — ZS: Kaposmérő (Jávorka apud Boros MBL 1922 55), Kaposújlak (Boros VSz 1936 83)

1393. *Onopordon acanthium* L. (Szamártövis)
Vulgaris. Közönséges.
1394. *Crupina vulgaris* Cass. (Magvasodró)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19) — V: Harsány (!Simk. 192) — Z: Hosszúhetény (Horv. PM2 8)
1395. *Serratula tinctoria* L. (Festő zsoltina)
Formae: **a. lancifolia** Gray — **b. heterophylla** Wallr.
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 31, **b.!**), „Daindol” (Kit. 1. 8), „Remete-rét” (**a.**, **b.!**) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 17) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 100) — ZS: Szentlászló (Kit. 2. 14) — O: Nagypárad (**b.!**)
1396. *S. lycopifolia* (Vill.) Kern. (Fénylő zsoltina)
T: Pécs „Mecsek” (!Lengyel BK 1932 155)
1397. *S. radiata* (W. et K.) M. B. (Súgaras zsoltina)
T: Pécs „Mecsek” (!PM. It. 142, WK. Ic. I. 9, Kit.!) apud Jávorka AMNH 1926 533), „Lapis” (!) — V: Harsány (!WK. Ic. I. 9)
1398. *Centaurea solstitialis* L. (Sáfrányos búzavirág)
T: Pécs „környéke” (Nendtv. 19, Maj! 36, **b. Adami** (Willd.) Heuff. f. *semi-Adami* (Simk.) Hay. Nendtv.!) apud Wagner in *Centaurea* 53) — Z: Hosszúhetény (Kit. 1. 16) — V: Harsány (!Simk. 193), Siklós, Mária-gyűd (Kit. 1. 30, 11) — SZ: Szekszárd, „Bat” (Hollós 99)
1399. *C. calcitrapa* L. (Útmenti búzavirág)
T: Pécs (PM. It. 142, Maj! 36, Simk. 193) — Ma: Pécs „Üszög” (Kit. 1. 10) — SZ: Szekszárd, „Bat” (Hollós 99) — ZS: Szigetvár-Csertő (Kit. 2. 14) — O: Harkány (Simk. 193), Nagypeterd, Beremend, Magyarbóly, Bolmány, Botykapeterd (Kit. 1. 4, 13, 27, 29, 31), Gordisa, Kistapolca (Bs.), Alsószentmárton (!)
1400. *C. jacea* L. (Imola búzavirág)
J: (!), Magyarürög (!) — T: Pécs (Nendtv. 19, BKA) — H: Lengyel (Hollós 99) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár”, Bonyhád (1. c.) — O: Sellye (!)
1401. *C. pannonica* (Heuff.) Hay. (Magyar búzavirág)
Baranya (Wagner o. c. 126, non ad 1402 petineat, saltem ex parte?) — SZ: Szekszárd, „Bat”, „Gurovica” (Hollós 99) — ZS: Kaposvár (Lengyel 1. c.), Töröcske „Rapol” (!)
1402. *C. banatica* Roch. (Bánsági búzavirág)
J: Abaliget (Boros MBL 1922 71), Boda (!) — T: Pécs(!. c.), „Tettye”, Mecsekszabolcs (!), Somogy (Bs.) — Z: Magyaregregy „Márévár” (!) — Ma: Palotabozsok (1. c.), Borjád, Apátvarasd (Horv. É. 12), Fazekasboda, Baksa, Pécsdevecser, Görcsöny, Németbóly, Hercegtöttös, Erdősmecske (!) — H: Palé, Kisvaszar (Horv. É. 13), Nagyterecsény (!) — ZS: Kaposvár (!) — O: Sellye (Boros MBL 1924 55), Vásárosszentgál, Matty, Pécs „Balokány” (!) — D: Veresmart (Marsigli 63), Riha-tó (!Boros MBL 1922 71)
1403. *C. carniolica* Host (Kereklevelű búzavirág)
D: Riha-tó (Boros MBL 1922 71)
1404. *C. stenolepis* Kern. (Keskenypikkelyű búzavirág)
J: (Simk. 193) — T: Pécs „Mecsek” (!Maj.!) apud Horv. PM2 9), „Lámpás”, „Daindol” (Kit. 1. 7, 8) — Z: Hosszúhetény (1. c.) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 99)

1405. *C. axillaris* Willd. (Tarka búzavirág)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19, *b. stricta* W. et K. Nendtv. apud Wagner 63), „Tettye” (!), „Makár” (K.-Nendtv. 570)
1406. *C. rhenana* Bor. (Rajnavidéki búzavirág)
O: Drávaszabolcs (Horv. PM2 7)
1407. *C. micranthos* Gmel. (Közönséges búzavirág)
Vulgaris. Közönséges.
1408. *C. cyanus* L. (Kék búzavirág)
Vulgaris. Közönséges. — H: Baranyajenő (lus. *pallidiflora* Horv. Borbásia II 30)
1409. *C. Sadleriana* Janka (Magyarföldi búzavirág)
H: Lengyel (Hollós 99) — SZ: Szekszárd „Petre”, „Csatár” (1. c.)
1410. *C. spinulosa* Roch. (Töviskés búzavirág)
Baranya (Bohatsch! apud Wagner 74) — J: Mecsekalja (!, *b. hajdonicalis* Wagn. Soó) — T: Pécs „Mecsek” (!) — SZ: Szekszárd (Hollós 99) — O: Sellye (!)
1411. *C. scabiosa* L. (Vastövű búzavirág)
T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19) — Z: Hosszúhetény (!Kit. 1. 17) — V: Harsány (!), Beremend (1. c. 28) — Ma: Pécs „Üszög”, Püspöklak (1. c. 10, 20) — D: Mohács (Knapp)
1412. *C. Lengyelii* Wagn. (*C. carniolica* × *C. banatica*)
O: Drávasztára-Zaláta (Boros MBL 1924 56), Sellye-Sósvertike (!) — D: Riha-tó (!Boros MBL 1922 71)
- C. montana* L. — M: (Nendtv. 19, Maj. 36) = (secundum Maj.!) *axillaris* (Horv. PM4 17)
- C. austriaca* Willd. — M: (Kit. apud N I 123, Maj. 36) = (secundum Maj.!) *austriaca* (1. c.)
- C. nigra* L. — T: Pécs „Kantavár” (Kit. apud N I 122, Nendtv. 19) = *stenolepis* (? 1. c.)
1413. *Carthamus lanatus* L. (Vadsáfrány)
Baranya (!Kit. apud N I 125) — J: Kővágószőlős (Kit. 1. 5), Boda (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 19, Kit. 1. 10), „Kismélyvölgy” (Simk. 194), Somogy (Bs.) — Z: Hosszúhetény (Simk. 194), Pécsvárad (Kit. 19) — V: Harsány (!Simk. 194, Kit. 1. 12), Siklós (1. c. 30) — Ma: Pécs „Üszög” (1. c. 10) — O: Szabadszentkirály (1. c. 30)
1414. *Cichorium intybus* L. (Katáng)
Vulgaris. Közönséges. — lus. *roseum* Alef. — O: Sellye (!), Pécs „környéke” (Horv. Borbásia I 98)
1415. *Lapsana communis* L. (Bojtorjánsaláta)
J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 25), „Kantavár” (!Kit. 1. 9) — V: Villány (Simk. 194) — SZ: Szekszárd (Bartal 40), „Remete”, „Csatár”, „Bat” (Hollós 100) — O: Drávaszabolcs (!)
1416. *Hypochaeris radicata* L. (Kacúros pelyvahordó)
J: (!, *b. hispida* Peterm. Horv. Borbásia II 30), Kővágószőlős (Simk. 194), Mecsekalja (!), Hetvehely (*b.* Horv. 1. c.) — T: Pécs „Mecsek” (NT, Simk. 194), „Lajostárna” (K.-Nendtv. 567) — Z: Hosszúhetény (!Simk. 194) — Ma: Erdősmecske (*b.* Horv. 1. c.) — ZS: Kaposmérő (Jávorka apud Boros MBL 1924 56) — O: Matty (Simk. 194), Harkány (1. c., Zsák), Kákics (!), Pécs „Megyer” (Maj.!)

1417. **H. maculata** L. (Kórós pelyvahordó)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 24, Maj. 36, Simk. 194) — SZ: Szekszárd „Csatár”, Szálka (Hollós 100)
H. glabra L. — Baranya (Kit. apud N I 129, Simk. 194) = (secundum Simk.!) *radicata*!
1418. **Thrinicia nudicaulis** Lowe (= **taraxacoides** (Vill.) Gaud.) (Trincia)
Pécs (Schultes o. c. II. 411, Ballay apud Horv. PM4 14)
1419. **Leontodon hispidus** L. (Közönséges oroszánfőg)
Vulgaris. Közönséges.
1420. **L. danubialis** Jacq. (= **L. hispidus b. glabratus** (Koch) Bischoff)
(Kopasz oroszánfőg)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 25, Simk. 195), „Lajostárna” (K.-Nendtv. 566, 569) — Z: Zobák (!) — Ma: Vokány „Terentás” (Simk. 195) — SZ: Szekszárd (Hollós MBL 1914 59), Bonyhád (Hollós 100) — ZS: Szentlászló (Kit. apud Horv. Borbásia II 30) — O: Harkány (1. c.)
1421. **L. autumnalis** L. (Őszi oroszánfőg)
Vulgaris. Közönséges.
? *L. asper* (W. et K.) Poir. — Pécs „környéke” (Nendtv. 25)
? *L. incanus* (L) Schrk. — Pécs „környéke” (Nendtv. 25) — SZ: Szekszárd (Bartal 40, ?Degen MBL 1910 379)
1422. **Helminthia echioides** (L) Gärtner. (Helmintia)
V: Villány (Simk. 194) — ZS: Kaposvár (Lengyel 1. c. 53) — O: Szentlőrinc (Lengyel 1. c. 49), Magyarbóly (Zsák)
1423. **Picris hieracioides** L. (Keserűgyökér)
Vulgaris. Közönséges. — **b. horrida** Borb. — O: Nagyárpád (!) — **c. ruderalis** (Schmidt) Beckh. — V: Harsány (!)
1424. **Tragopogon dubius** Scop. (Nagy bakszakáll)
T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 196, BK 14, A) — SZ: Szekszárd „Petre”, „Bat”, Bata (Hollós 100) — O: Sellye (!)
1425. **T. orientalis** L. (*pratensis* auct.) (Közönséges bakszakáll)
Vulgaris. Közönséges.
1426. **Scorzonera hispanica** L. (Spanyol pozdor)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 31, Maj. 36, Simk. 195), „Daíndol” (Kit. 1. 8) — V: Harsány (Simk. 195, Bs.) — Ma: Geresd (Kit. 1. 20)
1427. **S. humilis** L. (Alacsony pozdor)
Baranya (Maj. 36, Maj. K., herbario ejus deest!)
1428. **S. parviflora** Jacq. (Kisvirágú pozdor)
Baranya (NT, K.-Nendtv. 568, Maj. 36!, Maj. K.) — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy” (Hollós MBL 1914 59)
1429. **S. cana** (C. A. Mey.) Griseb. (Ütszéli pozdor)
Pécs (Maj. 36., Maj. K., Sz!)
1430. **S. austriaca** Willd. (Osztrák pozdor)
Baranya (Maj. 36, Maj. K.)
1431. **S. laciniata** L. (Sallangos pozdor)
T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 31, NT, Maj. 36, Maj. K, Simk. 195)
1432. **Chondrilla juncea** L. (Nyúlparéj)
J: Abaliget (Simk. 192), Bakonya ad Kövágószőlős (Kit. 1. 16) — T: Pécs (!Nendtv. 20) — Z: Hosszúhetény (1. c. 17) — V: Harsány (!), Bere-mend (1. c. 13, 28) — Ma: Pécs „Üszög” (1. c. 10), Kékesd (1. c. 20) — SZ:

Szekszárd, Bába (Hollós 100) — O: Becefa (Kit. 1. 4), Alsószentmárton (Horv. É. 16), Sósvertike (!)

Willemetia stipitata (Jacq.) Cass. — M: (Maj. 37) erroneo publicata (K.-Nendtv. 564)

1433. *Taraxacum serotinum* (W. et K.) Poir. (Kései pitypang)

Pécs „környéke” (Nendtv. 32, Maj. K.) — SZ: Szekszárd „Petre”, „Bat”, „Csatár” (Hollós 100)

1434. *T. levigatum* (Willd.) DC. (Szarvas pitypang)

T: Pécs „Mecsek” (!) — V: Harsány (!Simk. 191), Máriagyüd (!) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 100)

1435. *T. officinale* Webb. (Pongyola pitypang, gyermekláncfű)

Vulgaris. Közönséges.

ssp. palustre (Lyons) Becherer — Z: Hidas (!) — Ma: Nagynyárád (Janka 1. c. 231) — O: Szentlőrinc (Boros MBL 1924 56), Mecsekalja (!) — D: Kölked (!)

1436. *Mycelis muralis* (L) Wallr. (Kakicsvirág)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — O: Siklós, Páprád „Bükkhát” (Horv. É. 16, 15), Marócsa (!)

1437. *Sonchus arvensis* L. (Mezei csorbóka)

Vulgaris. Közönséges. — *b. levipes* Koch — SZ: Szekszárd „Sötét-cölgy” (Hollós MBL 1914 59)

1438. *S. paluster* L. (Semlyéki csorbóka)

Baranya (Nendtv. 32, Maj. 37, Maj. K., Janka 1. c. 261) — SZ: Szekszárd (Hollós 100)

1439. *S. oleraceus* L. (Szelíd csorbóka)

Vulgaris. Közönséges.

1440. *S. asper* (L) Hill. (Szúrós csorbóka)

J: (!) — T: Pécs (!Maj.! 37) — V: Villány (Simk. 196) — SZ: Szekszárd „Csatár” (Hollós 100) — O: Czinderybogád (!) — D: Püspökpuszta (Boros MBL 1922 71)

1441. *Lactuca viminea* (L) Presl. (Gatyás saláta)

T: Pécs „Mecsek” (!Maj.! 37, Simk. 194, Kit. apud N I 135) — Z: Hosszúhetény (1. c.) — V: Harsány (!1. c.), Máriagyüd (Simk. 194) — O: Siklós (Horv. É. 16)

1442. *L. quercina* L. (Cserlevelű saláta)

J: Vöröshegy (!) — Ma: Nagynyárád (Janka apud N II 40)

1443. *L. Chaixii* Vill. (Nyilas saláta)

T: Pécs „Mecsek” (Nendtv. 25), „Lapis” (K.-Nendtv. 571) — Ma: Borjád (Horv. É. 11)

1444. *L. saligna* L. (Szálasselevelű saláta)

J: (Kit. 1. 8) — T: Pécs „Mecsek” (!Simk. 194, Kit. 1. 6), „Daindol” (1. c. 8) — V: Villány (Simk. 194) — Ma: Túrony (Kit. 1. 15) — SZ: Szekszárd, Belac (Hollós 100) — O: Szigetvár (Kit. 1. 4) — D: Mohács (Knapp)

1445. *L. serriola* L. (Keszeg saláta)

Vulgaris. Közönséges. — *b. integrifolia* Bogenh. — T: Pécs (Simk. 194, Maj.! apud Horv. Borbásia II 31) — Ma: Hercegtöttös (Simk. 194)

L. virosa L. — Pécs „környéke” (Nendtv. 25, Maj. 37) = (secundum Maj.) *serriola b.* (Horv. PM2 9)

? *L. perennis* L. — Pécs „környéke” (Maj. 37)

1446. *Crepis rhoëadifolia* M. B. (Büdös zörgőfű)

Vulgaris. Közönséges.

1447. *C. setosa* Hall. f. (Sertés zörgőfű)

Vulgaris. Közönséges.

1448. *C. pannonica* (Jacq.) C. Koch (Magyar zörgőfű)

T: Pécs (NV! apud Horv. PM2 4)

1449. *C. tectorum* L. (Hamvas zörgőfű)

Vulgaris. Közönséges.

1450. *C. biennis* L. (Réti zörgőfű)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges. — *b. runcinata* Koch — J: Kővágószőlős (Simk. 193) — T: Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 567) — V: Villány, Harsány (Simk. 193) — SZ: Szekszárd „Petre” (Hollós 100)

1451. *C. pulchra* L. (Csinos zörgőfű)

J: Magyarürög (RK 564) — T: Pécs „Mecsek” (Maj. 37), „Daindol” (*b. glandulosa* Zersi), Mecsekszentkút-Magyarürög (Kit. 1. 24, Simk. 193) — V: Harsány (L. c.)

1452. *C. capillaris* (L) Wallr. (Vékonyka zörgőfű)

J: (*b. agrestis* W. et K. Kit. 1. 8) — T: Pécs (Simk. 193, Maj.!) — Z: (*b. Kit. 1. 18*), Püspöknádasd (Simk. 193) — V: Harsány, Máriagyűd (1. c.) — H: Megyefa, Bükkösd (*b. Kit. 1. 15*) — SZ: Szekszárd „Bat” (Hollós 100) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14), Somogyhárság-Toponár (*b. 1. c. 15*)

1453. *C. praemorsa* (L) Tausch. (Csonkagyökerű zörgőfű)

M: (Nendtv. 14, Maj. K.) — Z: Pécsvárad (Horv. PM4 18) — SZ: Szekszárd „Remetekápolna” (Bartal 40), „Gurovica”, „Óriás-h.” (Bs.)

1454. *C. paludosa* (L) Mnch. (Mocsári zörgőfű)

Baranya (Maj. 37)

C. foetida L. — Baranya (Nendtv. 18, Simk. 193) = (secundum Simk.!) *rhoëadifolia* (Horv. PM4 18)

C. mollis (Jacq.) Aschers. — M: (Nendtv. 24) = *Hieracium sabaudum* (K.-Nendtv. 565)

C. conyzifolia (Gouan) Dalla Torre — M: (BK 25) erroneo publicata (Horv. PM4 18)

1455. *Prenanthes purpurea* L. (Nyúlsaláta)

M: (Maj. 37, cf. Simk. 195)

1456. *Hieracium Hoppeanum* Schult. (Zömök hölgymál)

b. csepelense Lengy. et Z. — T: Pécs „Mecsek” (!) — *c. pomázinum* Z. — T: Pécs „Mecsek” (!) — Z: (!), Pécsvárad, Hosszúhetény (!) — Ma: Hercegszabar (!) — H: Högyész (!) — *d. leucolepioides* Deg. et Z. — T: Pécs (apud Zahn AMNH 1910 135) — Z: (!), Pécsvárad, Hosszúhetény (!)

1457. *H. pilosella* L. (Ezüstös hölgymál)

Vulgaris. Közönséges. — *b. amauroleucum* N. P. — Ma: Erdős-mecske (!) — *c. bruennense* N. P. — V: Harsány (!) — ZS: Kardosfapusz. (!) — *d. crassipes* N. P. — T: Pécs „Mecsek” (Soó) — *e. latiusculum* N. P. — J: Mecsekalja (!) — H: Nagytrecsény (!) — *f. rigidipilum* N. P. — Z: Szászvár „Dobogó” (!) — Ma: Hercegszabar (!) — *g. pseudomelanops* N. P. — H: Högyész (!) — *h. stenobium* N. P. — Z: Pécsvárad (Soó) — *i. subcanescens* N. P. f. *pilosiceps* N. P. — SZ: Szekszárd „Sötétvölgy”

(Bartal 40) — **j. trichadenium** N. P. — V: Máriagyüd (!) — **k. tricholepium** N. P. — T: Pécs „Mecsek” (Soó) — **l. trichophorum** N. P. — O: Kákics (!) — **m. trichosphaericum** N. P. — J: Mecsekalja (!) — Ma: Geresd (!) — ZS: Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — **n. trichoscapum** N. P. — T: Pécs „Mecsek” (Soó) — **o. vulgare** N. P. f. *subparviflorum* Z. — Pécs (Holuby! apud Zahn 1. c. 136)

1458. **H. auricula** Lam. et DC. (Füles hölgymál)

Baranya (Nendtv. 24, Maj. 37, Maj. K.) — **b. magnauricula** N. P. — ZS: Cserénfa (!)

1459. **H. bifurcum** M. B. (**echioides** — **pilosella**)

T: Pécs (Maj. 37, Maj. K., Simk. 194) — V: Harsány (1. c.) — O: Harkány (1. c.)

1460. **H. brachiatum** Bertol. (**Bauhini** — **pilosella**)

T: Pécs (NT, Maj. 37, Maj. K, NV!, K.-Nendtv. 567), „Dömörkapu-Kisrét” (1. c.) — **b. pseudobrachiatum** (Čelak.) N. P. — T: Pécs (NV!)

1461. **H. pratense** Tausch. (Réti hölgymál)

T: Pécs (Balek ÖBW 1852 14, K.-Nendtv. 567, Ballay!, Maj. K.)

1462. **H. Bauhini** Schult. (Magas hölgymál)

In regione montana collinaque vulgaris. Hegy- és dombvidéken közönséges.

ssp. magyaricum N. P. — J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (Horv. PM4 13)

b. filiferum Tausch. — T: Pécs „Mecsek” (Soó) — V: Harsány (Soó), Máriagyüd (!) — Ma: Hercegszabar (!) — H: Högyész (!) — **c. heothinum** N. P. — J: Magyarürög „Égervölgy” (!) — V: Máriagyüd, Villánykövesd (!) — **d. pseudauriculoides** N. P. — Baranya (Zahn 1. c. 328) — **e. pseudo-**

Kernerii Z. — J: (!) — T: Pécs „Mecsek”, „Bányatelep” (!), „Makár” (Maj.!) — Z: Zobák (!) — H: Baranyajenő (!) — **f. tephrops** N. P. — T: Pécs „Mecsek” (!)

ssp. Bauhini (Besser) Z. — **g. cymanthum** N. P. — Baranya (Zahn A. et G. Syn. XII 1. 333) — T: Pécs „Mecsek” (Soó) — **h. fastigiatum** N. P. — Baranya (Zahn 1. c. 331) — T: Pécs „Mecsek” (!) — **i. plicatum** Z. — T: Pécs (Zahn 1. c. 338)

1463. **H. cymosum** L. (Bogernyös hölgymál)

T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 24), „Lapis” (K.-Nendtv. 571) — **a. eu-cymosum** Z. — T: Pécs (!) — **b. eu-Sabinum** Z. — T: Pécs „Mecsek” (!) — V: Harsány (!) — **c. odontophyllum** Borb. — J: Magyarürög (Richter ! apud Borbás; A Balaton flórája 355)

1464. **H. Tauschii** Z. (**Bauhini-cymosum**)

b. acrosciadium N. P. — T: Pécs „Mecsek” (Zahn 1. c. 449) — **c. baubiniifolium** N. P. — T: Pécs „Mecsek” (Zahn 1. c. 448)

1465. **H. subcymiflorum** Oborny et Z. (**Bauhini** — **Laschii**)

b. mecsekense Z. — T: Pécs „Mecsek” (Maly ! apud Zahn 1. c. 464)

1466. **H. echiodies** Lumn. (Szúrós hölgymál)

Pécs „környéke” (K.-Nendtv. 567) — V: Harsány (Simk. 194) — Ma: Újpetre (Maj. K. apud Horv. PM2 11) — **b. Freynii** N. P. — V: Harsány (!) — **c. eu-echioides** Z. — V: Harsány (!)

1467. **H. pallidum** Biv.-Bernh. (Sápadt hölgymál)

T: Pécs „Mecsek” (Simk. 194)

1468. **H. praecox** Schlitz.-Bip. (**pallidum-murorum**)
b. eu-cinerascens Z. — T: Pécs, Vágot (!) — Z: (!) — H: Bakóca (Horv. É. 13, ut species tantum, !) — (**c. cinerascens** Jord. — Pécs (apud Jávorka: Magyar Flora 1252 = 1469 secundum Zahn)
1469. **H. praecurrens** Vukot. (**transsilvanicum-murorum**)
b. subserratifolium Z. — J: (Zahn 1. c. 2. 772)
1470. **H. bifidum** Kit. (Villás hölgymál)
T: Pécs „Mecsek” (!)
1471. **H. caesium** Fr. (Deres hölgymál)
J: (Simk. 194) — T: Pécs „Mecsek” (1. c.) — H: Baranyajenő (!)
1472. **H. murorum** L. (Erdei hölgymál)
J: Hetvehely (!) — T: Pécs „Mecsek” (!Nendtv. 24), „Árpádtető” (!), „Kantavár” (Kit. 1. 9) — **b. atripaniculatum** Z. — ZS: Kaposvár „Tótfalui erdő” (!) — **c. calvifrons** Z. f. *semioblongum* Z. — J: Pellérd (Zahn 1. c. 2. 392) — **d. gentile** Jord. — J: (!) — T: Pécs, Mánfa (Soó) — Z: Pécs-várad (Soó) — **e. malacophyes** Lengy. et Z. — T: Pécs „Mecsek” (Maj.!) — **f. micropsilon** Jord. — J: (!), Orfű (!) — Z: (!), Szászvár „Dobogó” (!) — **h. pseudogrypetes** Lengy. et Z. — T: Pécs „Mecsek” (Soó) — **i. subnemo-rense** Z. — Z: Pécsvárad (!)
1473. **H. Lachenalii** Gmel. (Közönséges hölgymál)
b. anfractum Fr. — T: Pécs „Mecsek” (!) — **c. argillaceum** Jord. — Ma: Erdősmecske (Horv. É. 12 tantum, ut species, !) — **d. irriguum** (Fr.) Dahlst. f. *lepidulum* Stensr. — T: Pécs „Mecsek” (Zahn 1. c. 2. 568) — **e. megalogonium** Z. — H: Baranyajenő (!) — H: Nagytetecsény (!) — **f. oblongum** Jord. — Ma: Erdősmecske (!) — **g. pinnatifidum** Loennr. — T: Orfű (!) — H: Högyész (!)
1474. **H. maculatum** Sm. (**praecox** — **vulgatum**) **b. eu-maculatum** Z.
J: (Horv. Borbásia II 26)
1475. **H. umbellatum** L. (Ernyős hölgymál)
T: Pécs „Mecsek” (!Maj. 37, Kit. 1. 6, **b. eu-umbellatum** Z.), „Havi-hegy” (!Simk. 194, b.), „Kisrét” (!Maj. K. apud Horv. PM2 11) — V: Siklós, Beremend (Kit. 1. 14, 28) — SZ: Szekszárd „Éleshát” (Hollós MBL 1914 59)
1476. **H. sabaudum** L. (Olasz hölgymál)
T: Pécs (!Nendtv. 24), „Daindol”, „Kantavár” (Kit. 1. 8., 9) — Ma: Göröcsöny (!), Feked (Horv. É. 12) — H: Nagytetecsény, Baranyajenő, Högyész (!) — SZ: Szekszárd „Bat”, „Csatár” (Hollós 100) — ZS: Szigetvár-Kishárság „Szenttamás” (Kit. 2. 14), Kardosfa-psz. „Rapol”, Kaposvár „Nádasdi erdő” (!) — O: Sósvertike (!) — **b. lugdunense** Rouy — Baranya (Zahn 1. c. 3. 543) — **c. praticolum** Sudre — T: Pécs „Mecsek” (!) — **d. vagum** (Jord.) Z. — J: (!) — T: Pécs „Mecsek” (!) — Z: Pécsvárad (!) — **e. sublactucaceum** Z. — **ee. f. longidens** Z. et **f. pulviferum** Z. — H: Lengyel „Annafürdő” (Zahn 1. c. 3. 558) — **ef. f. mediodensum** Z. — T: Pécs „Kantavár” (1. c.)
1477. **H. racemosum** W. et K. (Fürtös hölgymál)
O: Sellye (Simk. 194) — **b. Waldsteinianum** Z. **bb. eu-racemosum** Z. **f. dentatum** Z. — T: Pécs (Zahn 1. c. 3. 612) — **c. stiriacum** Kern. — J: (Bs.)



Fontosabb pótlások és javítások. — Addenda et corrigenda.

12. l. alulról a 14. sor végén , helyett . irandó.
12. l. alulról a 13. sorban: . A *Cyclamen* szavakat törölni kell.
20. l. alulról a 9. sorban keverékfajtából helyett keverékfajából
23. l. felülről a 8. sor után: Békefi R.: Majer Móric. Magyar Allam. 1904. ápr. 15.
23. l. felülről a 23. sorban TTK. után: 1925.
26. l. a 22. sor után: Zsák Z.: Florisztikai adatok a hazai . . . BK. 1941. 12.
31. l. alulról a 18. sorban „Bertalan szikla” (után: Horv.
32. l. felülről a 9. sorban Pécs (után: Horv.
34. l. felülről a 22. sorban békabuzogány helyett békaszőlő
39. l. felülről a 17. és 18. sorban a. és b. helyett b. és c.
45. l. alulról a 16. sorban Töröcske „Rapol” után: (!)
46. l. alulról a 2. sorban Zobák után: (!)
47. l. felülről az 1. sorban Vaszar helyett Kisvaszar
51. l. felülről a 22. sorban „Bertalan szikla” (után: Horv.
59. l. a 324. fajhoz pótlás: Z: Hosszúhetény (!) —
60. l. felülről a 25. sor után: Z: Pécsvárad, Erdősmecske (!) —
62. l. felülről a 6. sorban 345 helyett 354
67. l. felülről a 19. illetve a 20. sorban: Alkőrmösfélék helyett Alkőrmösfélék, (Alkőrmös) helyett (Álkőrmös)
68. l. alulról az 5. sorban Anzavour helyett Aznavour
80. l. alulról a 10. sor után: v. *arcuata* Op. — O: Siklós „Poroszló” (Zsák 1. c. 31)
89. l. alulról a 6. és 8. és a 90. l. felülről a 4., 5., 7. sorban, valamint a 106. l. alulról a 15—18. sorban a. b. c. (d.) helyett b. c. d. (e.)
90. l. felülről a 24. sorban b. elé: *ascita* Déségl. — V: Harsány (Zsák 1. c. 32)
90. l. alulról a 16. sorban h. helyett k. A 18. sorban k. helyett h.
105. l. felülről a 18. sorban 858 helyett 838.
119. l. alulról a 9. sorban ! Maj. helyett Maj.!
125. l. felülről a 4. sorban FEA helyett FEH
127. l. alulról az 1. sorban Maj. helyett Maj. K.,
131. l. felülről a 14. sorban Mill. után: (Ördögcérna)
151. l. felülről a 16. sorban Tapolca helyett Kistapolca
155. l. alulról a 2. sorban 1. c. helyett Kit. 1.

műút
vasút

} - mely összeesik a növényföldrajzi határral

----- = növényföldrajzi határ.

(részben ez is domb-illetve patakhatár)

Mérték = 1:385.000.



A mecseki flórajárás
(Mecsekicum)
és a déli síksága.
Cserna Pál.

- T = Tüzes
- J = Jakabhegy
- Z = Zengővár
- V = Villányi hegység a Báni hegygyel
- MA = Mecsek alja
- H = Hegyhát
- SZ = Szekszárdi dombvidék
- ZS = Zselic
- O = Ormánság
- D = Dravaköz a Mohácsi szigettel.

Patacs neve 1930 óta Mecsek-alja. (Magyarürög mellett a Jakabhegyen.)

