

2083/8

~~4328/8.~~

**FLORISZTIKAI ADATOK.** (phan.)

**FLORISTISCHE DATEN.** (phan.)

Szerző kiadása.

Megjelent { 1942. V. 1.  
Editum }

Ára belföldön { Pengő 0.60  
Inlandpreis }

Ára külföldön { Pengő 0.90  
Auslandpreis }

Kapható a követ- | Erhältlich auf der  
kező címen: | folgenden Adresse:

K ö f a r a g ó - G y e l n i k V.  
Budapest, I., Csap-utca 4. III. 20.

Megrendelésnél | Bei Bestellung bitte  
hivatkozzék a | sich auf die fol-  
következő jel- | gende Bezeichnung  
zésre: | berufen:

**BORBÁSIA NOVA 8.**


AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM  
KERT- ÉS SZŐLŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR  
KÖNYVTÁRA  
NAPLÓSZAM: ~~4328/8.~~

Dunántúl Universitätsdruckerei  
und Verlagsanstalt A. G. Pécs.

2083/p

KERTÉSZETI ÉS  
SZŐLÉSZETI FŐISKOLA  
KÖNYVTÁRA  
Folyóirat lelt. sz. 3575

évt. 1989.



**FLORISZTIKAI ADATOK.** (phan.)  
**FLORISTISCHE DATEN.** (phan.)

*Phyllitis scolopendrium* (L.) New m. — Vas vm.: Oladon és Herényben, kutakban.

JEANPLONG J.

*Colchicum arenarium* W. et K. lus. **albiflorum** Mercz lus. n. — A typo differt floribus albis. — Hab. in graminosis „Tétényi Fennsík“ pr. Budatétény, 1941. IX. 20., leg. A. Mercz. — Typus in herb. Acad. Horticult. Budapest. — Meglehetősen nagy számban fordult elő a tőlakkal együtt (copiose cum typo).

MERCZ Á.

x *Corylus malurna* Tóth = *C. colurna* x *maxima* nova hybr. — In vico „Gerendástanya“ prope pag. Oroszáza (com. Békés), in horto agricolae St. Paulovits inter *C. colurnam* et *C. maximam* var. „Piros Lambert“ hybrida arte facta.

TÓTH E.

x *Corylus avellima* Tóth = *C. avellana* x *maxima* nova hybr. — Pars *Corylarum* in hortis cultarum (i. e. hybridae inter *C. avellanam* et *maximam*) in literatura (Goeschke: Haselnusstab. 65—70, Rehder: Manual of cultivated trees and shrubs, 1934) commemoratur, sine autem nomine speciali. Hae pro utilitate faciliore ac unitate systematis nomine supra dicto a me significatae.

TÓTH E.

*Macleya cordata* R. Br. — Budapesten, a Déliwasút töltése mentén elvadulva.

ifj. PRISZTER SZ.

*Potentilla pedata* Willd. — Pest vm.: Szentendre mellett a Sztelin patak torkolata és a Határcsárda közötti keleti fekvésű Dunára néző andezittufa lejtőkön (1941. VI. 22.).

UHERKOVICH G.

*Lupinus polyphyllus* Lindl. — Máramaros vm.: Kőrösmező felett a Hoverla alján elvadulva.

ifj. PRISZTER SZ.

*Sarothamnus scoparius* (L.) Wim m. — Baranya vm.: a Mecsekben a „Hárság“-nál.

ifj. PRISZTER SZ.

*Lathyrus sphaericus* Retz. — Pest vm.: Szentendre mellett a Sztelin patak torkolata és a Határcsárda közötti keleti fekvésű, Dunára néző füves andezittufa lejtőkön (1941. V. 20.).

UHERKOVICH G.

*Polygala amarum* L. var. *balatonicum* Borb. lus. **albiflorum** Mercz lus. n. — A typo differt floribus albis. — Hab. in valle „Fánivölgy“ prope Vérteskozma, 1941. V. 4., leg. A. Mercz. — Typus in herb. Acad. Horticult. Budapest. — Egy példány a typusos példányok között.

MERCZ Á.

*Impatiens Roylei* Walpers. — Ezt a szép keletázsiai nebántsvirágot 1937-ben Ruszskabánya mellett találtam, ahol az alsó-ruszskabánya—ruszkicai országút mentén kanyargó patakot kíséri több kilométer távolságban. — Mult év szeptemberében Gombos Erzsébet kisasszony gyűjtötte és hozott szárított példányt a Kelemen havasokból Ratosnya és Palotailva mellől. Ott is nagy tömegben a patakpartokon fordul elő, azonban kizárólag rózsaszínvirágú példányokban.

DOMOKOS J.

*Primula vulgaris* Huds. — A közönséges kankalin Jávoroka szerint Erdély északi és nyugati részein él csak, holott az Erdély legkeletibb pontja közelében is található. Így p. o. szedtem a Barcaságban, Keresztvár felett (az 1222 m magas Piliske és a 952 m magas Kisvontató között levő) 1094 m magas Feketehegyen. — Érdekes, hogy Rómer Gyula a „Barcasági hegyek növényvilágá"-ban nemcsak ugyanazt mondja — mint Jávoroka —, hogy Erdélynek csak északi és nyugati részén él, hanem azt is hozzáteszi, hogy délen hiányzik...

PAPP J.

*Centaurium uliginosum* (W. et K.) Beck. — Vas vm.: Kemeneskápolna mellett lápos helyen szórványosan.

JEANPLONG J.

*Gentiana asclepiadea* L. — A fecsketárnics virága Jávoroka szerint sötét azurkék pártájú, belül sötét petytyekkel. Nem említi, hogy egyes helyen gyakori a más színárnyalatú is. A Bucsecs északnyugati oldalán, a Barca-

rozsnyóra vivő patak völgyében élő töméntelen sok fecsketárnics közt a sötét azurkéktől a hófehérig a színek egész skálája fellelhető. Sötét azurkék sötétebb pettyekkel, pettyek nélkül, világosabb kékek pettyekkel, s azok nélkül, liláskékek, fehéresek, fehérsávósak és hófehérek...

PAPP J.

*Sicyos angulatus* L. — Beszterce-Naszód vm.: Beszterce mellett elvadulva.

ifj. PRISZTER SZ.


*Leontopodium alpinum* Cass. — A havasi gyopár velebiti előfordulását Jávoroka csak kérdőjellel veszi fel, holott a horvát turisták kedvenc „runolist”-je az Észak-velebitben, az 1638 m magas Gornji Zavižan csúcsa alatt levő kis platón, a Krajačeva kuća nevű menedékház közelében (attól keletre) tömegesen él, egy helyt 100 m<sup>2</sup>-nél nagyobb területen zárt gyepet is alkot. — Degen Árpád a „Velebit flórája” c. művében két helyről is említi a havasi gyopárt, melyek az általam lelt helyek közelében vannak, de nem azonosak vele. 1. A Zavižan és a tőle délre 6—7 km-nyire levő Rožanski Vrh között egy sziklagerincen, s 2. Kraszno felett a Nadak Bilo 1318 m magas Krečelj csúcsának szikláin.

PAPP J.

*Petasites hybridus* (L.) G. M. Sch. — Pest vm.: Szentendre mellett a Bucsina-(Bükkös)-patak völgyében közvetlenül a város szélén egy forrás lefolyó mellett.

UHERKOVICH G.

2083/8  
3575



Felelős kiadó: Kőfaragó-Gyelnik V.

---

DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R. T. PÉCSETT.

A nyomdai felelős: Mészáros József igazgató.



